

**沈降破傷風トキソイドの
副反応報告状況について**

○沈降破傷風トキソイド

商 品 名 : ①沈降破傷風トキソイド“化血研”
 ②破トキ「ビケンF」
 ③沈降破傷風トキソイド「北里第一三共」シリンジ
 ④沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」
 ⑤沈降破傷風トキソイド「生研」

製 造 販 売 業 者 : ①一般財団法人 化学及血清療法研究所
 ②一般財団法人 阪大微生物病研究会
 ③北里第一三共ワクチン株式会社
 ④武田薬品工業株式会社
 ⑤デンカ生研株式会社

販 売 開 始 : ①平成8年4月
 ②平成18年11月
 ③平成18年8月
 ④平成14年3月
 ⑤昭和42年11月

効 能 ・ 効 果 : 破傷風の予防

**副反応報告数
(平成27年11月1日から平成28年2月29日まで報告分まで：報告日での集計)**

平成27年11月1日から平成28年2月29日までの医療機関への納入数量を接種可能なべ人数とし、副反応報告頻度を計算したものは以下のとおり。
 ※報告日での集計のため、以下の件数には接種日や発生日が対象期間以前の症例も含まれている。

(単位:例(人))

	接種可能なべ人数 (回数) ※	製造販売業者からの報告		医療機関からの報告	
		報告数 () : 接種日が左記期間内の症例		報告数 () : 接種日が左記間内の症例	
		報告頻度	報告頻度	うち 重篤	
平成27年11月1日 ～平成28年2月29日	201, 432	3 (2)	0	0	0
		0.001% (0.001%)	0%	0%	0%
(参考) 平成25年4月1日 ～平成28年2月29日	1, 871, 581	12	11	1	
		0.001%	0.001%	0.0001%	

※1人あたり0.5mL接種されたと仮定した。

平成27年11月1日から平成28年2月29日報告分の重篤例の転帰

(単位:例(人))

	製造販売業者からの報告						医療機関からの報告					
	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計
重篤例数	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
うち同時接種あり	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注意点)

※ 副反応報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め、製造販売業者又は医療機関から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。

※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。

※ 非重篤症例には、重篤度が不明の症例も含まれている。

※ 製造販売業者からの副反応報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。

※ 製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

沈降破傷風トキシイドの副反応報告状況の副反応報告状況

平成25年4月1日から平成28年2月29日までの報告数及び症状種類別報告件数は以下のとおり。医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～平成27年10月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成27年11月～平成28年2月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
報告数	1	9	10		3	3
症状別総件数	2	11	13		3	3
症状名の種類	症状の種類別件数					
胃腸障害						
* 嘔吐		1	1			
一般・全身障害および投与部位の状態						
倦怠感	1		1			
注射部位硬結		1	1			
発熱	1	2	3			
肝胆道系障害						
* 肝炎		1	1			
* 肝障害		1	1			
筋骨格系および結合組織障害						
* 筋痙攣					1	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害						
* 口腔咽頭痛		1	1			
神経系障害						
* グラン・バレー症候群					1	1
* 急性散在性脳脊髄炎		1	1			
* 四肢麻痺		1	1			
* 痙攣発作					1	1
免疫系障害						
アナフィラキシーショック		1	1			
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)						
* 結腸癌		1	1			

*未知の事象

沈降破傷風トキシイドの副反応報告状況

予防接種後副反応報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く)について、副反応報告状況をもとに集計を行った。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～平成27年10月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成27年11月～平成28年2月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
アナフィラキシー*1			1			
脳炎・脳症						
けいれん*2						1
血小板減少性紫斑病						

*1 アナフィラキシーショック

*2 痙攣発作

沈降破傷風トキソイド 重篤症例一覧

(平成27年11月1日から平成28年2月29日までの報告分)

製造販売業者からの報告

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名 (ロット番号)	同時接種	同時接種 ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	企業 重篤度	転帰日	転帰内容
1	31歳	男	平成27年8月20日	沈降破傷風トキソイド*武田薬品	なし		なし	ギラン・バレー症候群	平成27年8月25日	重篤	不明	軽快
2	小児	不明	平成27年10月26日	沈降破傷風トキソイド*武田薬品	なし		なし	痙攣発作	平成27年10月28日	重篤	不明	不明
3	74歳	男	不明	沈降破傷風トキソイド*化血研	なし		破傷風	筋痙縮	不明	重篤	不明	不明

※複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

沈降破傷風トキソイド接種後のアナフィラキシー※が疑われる症例まとめ(重篤症例)

※【選択基準】

症状名が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」、「アナフィラキシー様ショック」として報告された症例。

報告期間	症例数	専門家の評価によりアナフィラキシーのブライトン分類評価が3以上とされた症例	推定接種人数
平成25年4月～平成25年6月	0	0	19万人
平成25年7月～平成26年2月	1	1	35万人
平成26年3月～平成26年9月	0	0	44万人
平成26年10月～平成26年12月	0	0	17万人
平成27年1月～平成27年10月	0	0	52万人
平成27年11月～平成28年2月	0	0	20万人