

新冠疫苗接種說明書

關於接種新冠疫苗

本疫苗接種已被列入中央及地方政府針對新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)的疫苗接種計畫，其接種由公費負擔，有接種意願者可免費接種，適用接種年齡為 12 歲以上。

疫苗效果及接種方法

本疫苗由武田 / Moderna 公司生產，可預防感染新冠病毒發病。

研究結果發現，與未接種本疫苗者相比，接種本疫苗者較少感染新冠病毒。(報告稱，預防發病的效果約為 94%。)

產品名稱	COVID-19 疫苗 Moderna 肌肉注射®
保護效果	預防由新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)引起的感染性致病
接種劑次及間隔	2 劑 (通常間隔 4 週) *肌肉注射
接種對象	12 歲以上 (本疫苗針對未滿 12 歲的有效性和安全性尚不明確。)
接種劑量	每劑 0.5mL，共 2 劑

- 兩劑疫苗之間的接種間隔時間通常為四週。(如果接種第一劑後已超過四週，請儘速接種第二劑。)
- 如已接種本疫苗第一劑，原則上第二劑也請接種本疫苗。
- 臨床試驗結果顯示，接種第二劑疫苗 14 天後，才可獲得充分的免疫力。此外，並非接種疫苗就能完全預防感染。無論是否接種本疫苗，都需採取適當的防疫措施。

接種禁忌

下列對象不宜接種本疫苗。如果符合以下任一情形，請務必在接種前的問診中明確告知醫師。

- 明顯發燒症狀 (*1)
- 患有急性重度疾病
- 對本疫苗任一成分曾出現嚴重過敏症狀 (*2)
- 除上述明顯情形外其他不宜接種者

(*1)明顯發燒症狀通常指體溫超過 37.5°C。但是即使體溫低於 37.5°C，與平常體溫相比會被診斷為發燒者不在此限。

(*2)過敏反應或疑似過敏反應的多種症狀，包括全身性皮膚和黏膜症狀、出現氣喘、呼吸困難、心跳過快或血壓過低。

接種注意事項

符合下列任一情形者，須對疫苗接種持謹慎態度。如遇到下列情形，請務必在接種前的問診中明確告知醫師。

- 正在進行抗凝血治療、患血小板減少症或凝血功能障礙症
- 曾被診斷為免疫缺陷、或近親患有先天性免疫缺陷
- 患有心臟、腎臟、肝臟、血液疾病或發育障礙等基礎疾病
- 曾接種過疫苗並在接種兩天內出現發燒、全身紅疹等過敏症狀
- 曾出現痙攣症狀
- 可能對本疫苗成分過敏

已懷孕或可能懷孕、或處於哺乳期，請務必在接種前的問診中明確告知醫師。

本疫苗產品含有未在其他疫苗中使用過的添加成分。如果曾對藥物有過敏症狀或過敏，請務必在接種前的問診中明確告知醫師。

(續背面)

接種後注意事項

- 接種疫苗後請在接種地點至少停留 15 分鐘 (如果曾出現包括過敏休克在內的嚴重過敏反應，或出現噁心、昏迷等症狀，請至少停留 30 分鐘)。如果接種疫苗後感到不適，請立即聯繫醫師。(可處理突發性不良反應。)
- 接種部位需保持乾淨。雖然接種疫苗當天可以沐浴，但請勿揉擦接種部位。
- 日常生活並無影響，但接種疫苗當天應避免劇烈運動以及過度飲酒。

不良反應

- 主要的不良反應為接種部位疼痛 (*1)、頭痛、關節和肌肉疼痛、疲勞感、畏寒以及發燒等。罕見的嚴重不良反應包括休克及過敏症。由於本疫苗屬於新型疫苗，有可能引起一些目前尚未發現的症狀。如果在疫苗接種後察覺到任何相關症狀，請聯繫接種醫師或經常就醫的醫師。
(*1) 許多人第二天而非接種後立即感到疼痛。接種後約一週可能會出現疼痛和腫脹。
- 有報告顯示，極少數人在接種疫苗後出現輕度的心肌炎或心包膜炎症狀 (※2)。如果接種疫苗後幾天內出現胸痛、心悸、氣喘、浮腫等症狀，請儘快就醫。
(*2) 與第一劑相比，這種症狀多出現於接種第二劑疫苗後，年輕人、尤其是男性更多見。

關於接種疫苗引起的健康損害保障機制

接種疫苗可能會引起一些健康損害 (例如疾病或身體障礙)。儘管屬於罕見個案，但由於無法完全避免，所以已設有保障制度。

如果因接種新冠疫苗而引起健康損害，根據「預防接種法」的規定獲得保障 (領取醫療費、傷殘年金等)。關於必要的申請程序等，請洽詢住民票所在地的地方政府。

關於新冠病毒的感染症狀

感染新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)後，患者會出現發燒、咳嗽等極感冒的症狀。儘管多數輕症患者能治癒，但仍仍有重症感染者會患有呼吸困難及嚴重肺炎症狀，嚴重者可能會致死。

此次接種的新冠疫苗 (武田 / Moderna 公司生產) 的特點

本疫苗屬於 mRNA 疫苗。配方中的 mRNA 會嵌入脂膜，它是新冠病毒(SARS-CoV-2)刺突蛋白 (病毒入侵人體細胞時所需的蛋白) 的“藍圖”。當 mRNA 透過疫苗接種進入人體後，病毒性刺突蛋白會按照 mRNA 在人體細胞內生成，由此誘發對抗刺突蛋白的中和抗體和細胞免疫反應，後者能預防感染新冠病毒。

本疫苗包含以下成分：

有效成分	◇CX-024414(mRNA · 編碼附著在人體細胞膜的全長刺突蛋白)
添加成分	◇SM-102：十七烷-9-基 8- ((2-羥乙基) (6-氧代-6- (十一烷氧基) 己基) 氨基) 辛酸酯 ◇膽固醇 ◇DSPC：1,2-二硬脂酰基-sn-甘油-3-磷酸膽鹼 ◇1,2-二肉豆蔻醯-rac-甘油-3-甲氧基聚乙二醇 (PEG2000-DMG) ◇氨丁三醇 ◇鹽酸氨丁三醇 ◇冰醋酸 ◇醋酸鈉水合物 ◇蔗糖

更多關於新冠疫苗的資訊，請上厚生勞動省網站。

厚生勞動省 新型冠狀病毒 疫苗

檢 索

如無法瀏覽該網站，請洽詢所在地的地方政府。

