

新冠疫苗接種說明書

- ◎ 除必要情形外，原則上本疫苗適用接種年齡為 40 歲以上。
- ◎ 但是，由於對其他新冠疫苗所含成分過敏而無法接種等原因，特別希望接種阿斯特捷利康公司的疫苗時，接種年齡可破例放寬至 18 歲以上。
- ◎ 國外有報告顯示，有極少數人出現了伴有血小板減少症的血栓症狀、毛細血管滲漏症候群、格林巴利症候群等脫髓鞘疾病。請在了解並接受接種疫苗的風險與效益後，再接種疫苗。

關於接種新冠疫苗

本疫苗已被列入中央及地方政府針對新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)的疫苗接種計畫，其接種由公費負擔，有接種意願者免費接種。

疫苗效果及接種方法

本疫苗由阿斯特捷利康公司生產，可預防感染新冠病毒發病。

研究結果發現，與未接種本疫苗者相比，接種本疫苗者較少感染新冠病毒。(臨床試驗結果顯示，預防發病的效果約為 70%)

產品名稱	VAXZEVRIA [®] 肌肉注射
保護效果	預防由新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)引起的感染性疾病
接種劑次及間隔	2 劑 (通常間隔 4~12 週) *肌肉注射
接種對象	原則上為 40 歲以上
接種劑量	每劑 0.5mL，共 2 劑

- 藥事批准內容為，接種第一劑後，間隔四到十二週接種第二劑。但是，為了獲得最佳效果，最好間隔八週以上再接種第二劑。另外，如果接種第一劑已超過十二週，請儘快接種第二劑。
- 藥事批准內容中，雖然確認此疫苗對 18 歲以上之對象的效果及安全性，但根據各國的使用推薦情形及各年齡層的風險與效益相關報告等，目前原則上適用接種年齡為 40 歲以上。
- 如果第一劑接種本疫苗，原則上第二劑也請接種本疫苗。
- 臨床試驗結果證實，接種兩劑疫苗 15 天後，才可獲得充分的免疫力。此外，並非接種疫苗就能完全預防感染。無論是否接種本疫苗，都需要採取恰當的防疫措施。

接種禁忌

下列對象不宜接種本疫苗。如果符合以下任一情形，請務必在接種前的問診中明確告知醫師。

- 明顯發燒症狀(*1)
- 患有嚴重急性病
- 對本疫苗的任一成分出現過嚴重過敏症狀(*2)
- 接種 SARS-CoV-2 疫苗後出現伴有血小板減少症的靜脈或動脈血栓症狀
- 有毛細血管滲漏症候群病史
- 除上述明顯情形外其他不宜接種者

(*1) 明顯發燒症狀通常指體溫超過 37.5°C。但是即使體溫低於 37.5°C，與平常體溫相比被診斷為發燒者不在此限。

(*2) 過敏反應以或疑似過敏反應的多種症狀，包括全身性皮膚及黏膜症狀、出現喘氣、呼吸困難、心跳過快或血壓過低。

接種注意事項

符合下列任一情形者，應對接種疫苗持謹慎態度。如果遇到下列情形，請務必在接種前的問診中明確告知醫師。

- 正在進行抗凝血治療、患血小板減少症或凝血功能障礙症
- 曾被診斷為免疫缺陷、或近親患有先天性免疫缺陷
- 患有心臟、腎臟、肝臟、血液疾病或發育障礙等基礎疾病
- 曾接種過疫苗並在接種兩天內出現發燒、全身紅疹等過敏症狀
- 曾出現痙攣症狀
- 可能對本疫苗成分過敏

(續背面)

已懷孕或可能懷孕、或處於哺乳期，請務必在接種前的問診中明確告知醫師。

本疫苗產品含有未在其它疫苗中使用過的添加成分。如果曾對藥物有過敏症狀或過敏，請務必在接種前的問診中明確告知醫師。

接種後注意事項

- 接種疫苗後請在接種地點至少停留 15 分鐘(如果曾出現過包括過敏休克在內的嚴重過敏反應，或出現噁心、昏迷等症狀，請至少停留 30 分鐘)。如果接種疫苗後感到不適，請立即聯繫醫師。(可處理突發性不良反應。)
- 接種部位需保持乾淨。雖然接種疫苗當天可以沐浴，但請勿揉擦接種部位。
- 日常生活並無影響，但接種疫苗當天應避免劇烈運動或過度飲酒。

不良反應

- 主要的不良反應為接種部位疼痛、頭痛、關節及肌肉疼痛、倦怠感、疲勞感、畏冷及發燒等。此外，在臨床試驗中，與第一劑相比，接種第二劑時出現這些症狀的頻率更高。尚有罕見的嚴重不良反應包括休克及過敏性反應。由於本疫苗屬於新型疫苗，有可能引起一些目前尚未發現的症狀。如果您在疫苗接種後察覺到任何相關症狀，請聯繫接種醫師或經常就診的醫師。
- 國外有報告顯示，有極少數人出現了伴有血小板減少症的血栓症狀(※1)、毛細血管滲漏症候群(※2)、格林巴利症候群等脫髓鞘疾病(※3)。如果接種疫苗後出現以下症狀，請儘快就醫。
 - (※1) 持續劇烈頭痛、視力模糊、氣喘、精神錯亂、痙攣、胸痛、腳部浮腫和疼痛、持續腹痛、接種部位以外的內出血(瘀血)等症狀。此外，這些症狀幾乎都出現在接種後 28 天內，而且與第二劑相比，多發生於接種完第一劑疫苗後。
 - (※2) 手腳浮腫、低血壓等症狀
 - (※3) 手腳無力等運動障礙、麻木等感覺障礙、排尿、排便障礙、視力模糊等視力障礙。

關於接種疫苗引起的健康損害保障機制

接種疫苗可能會引起一些健康損害(例如疾病或身體障礙)。儘管屬於罕見個案，但由於無法完全避免，所以已設有保障機制。

如果因接種新冠疫苗而引起健康損害，根據「預防接種法」的規定獲得保障(領取醫療費、傷殘年金等)。關於必要的申請程序等，請洽詢住民票所在地的地方政府。

關於新冠病毒的感染症狀

感染新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)後，患者會出現發燒、咳嗽等類似普通感冒的症狀。儘管多數輕症患者能癒，但仍有重症感染者會患有呼吸困難及嚴重肺炎症狀，嚴重者可能會致死。

此次接種的新冠疫苗(阿斯特捷利康公司生產)的特點

本疫苗屬於腺病毒載體疫苗，是將 SARS-CoV-2 棘蛋白(病毒入侵人體細胞時所需的蛋白質)的氨基酸序列之基因嵌入猴腺病毒(對腺病毒這種感冒病毒進行繁殖抑制處理)的製劑。接種本疫苗後，基因會進入人體細胞，然後在此基因的基礎上，細胞內會產生病毒的棘蛋白，並誘發針對棘蛋白的中和抗體產生和細胞免疫反應，由此可預防因 SARS-CoV-2 引發之傳染病。

本疫苗包含以下成分:

有效成分	◇ 新冠病毒(SARS-CoV-2)疫苗(基因重組猴腺病毒載體) (註:將編碼了 SARS-CoV-2 棘蛋白的氨基酸序列之基因嵌入猴腺病毒)	
添加成分	◇ L-組氨酸 ◇ 氯化鈉 ◇ 乙二胺四乙酸鈉鹽水合物 ◇ 無水乙醇	◇ L-組氨酸鹽酸鹽水合物 ◇ 氯化鎂 ◇ 蔗糖 ◇ 聚山梨醇酯 80

更多關於新冠疫苗有效性及安全性的資訊，請上“厚生勞動省”網站。

厚生勞動省 新型冠狀病毒疫苗

檢 索



如果無法瀏覽該網站，請聯繫所在地的地方政府。