

إرشادات خاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد (التطعيم الأول (الجرعتان الأولى والثانية))

- يجب استخدام هذا اللقاح عمومًا لتلقيح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا إلا إذا اقتضى الأمر غير ذلك.
- ولكن إذا كنت تعاني من حساسية ضد المكونات الموجودة في لقاحات فيروس كورونا المستجد الأخرى مما يحول دون تلقيحك بها، أو إذا كنت ترغب بلقاح أسترازينيكا خصيصًا، فإنه يمكن تلقيحك به بشكل استثنائي حتى ما إذا كان عمرك ما بين 18 و 40 عامًا.
- لقد تم الإبلاغ عن حالات نادرة في الخارج حدثت فيها أمراض مزيلة للميالين مثل تجلط الدم المصحوب بقلة الصفيحات ومتلازمة التسرب الشعيري ومتلازمة غيلان باريه. لذا يرجى فهم مخاطر وفوائد هذا اللقاح قبل تلقيه.

نبذة عن لقاح فيروس كورونا المستجد

يدخل هذا اللقاح في إطار برنامج الحكومات الوطنية والمحلية الخاص بمحاربة فيروس كورونا (السارس-كوف-2)، بحيث تتكفل الصناديق العمومية بتمويل هذا اللقاح، وهو متاح مجانًا لجميع الأشخاص الذين يرغبون في التلقيح به.

الأثار الجانبية لهذا اللقاح وطريقة تدبيره

اللقاح المستخدم هذه المرة هو لقاح من صنع شركة أسترازينيكا. وهو يمنع ظهور أعراض عدوى فيروس كورونا المستجد. لقد تبين بأن أعداد من يصابون بأعراض عدوى فيروس كورونا المستجد ممن تم تلقيحهم بهذا اللقاح هي أقل ممن لم يتم تلقيحهم. (أكدت التجارب السريرية أن نسبة تأثير الوقاية من ظهور أعراض العدوى تبلغ حوالي 70%).

اسم المنتج	فاكسزيفريا TM للحقن العضلي
الفعالية والآثار الجانبية 2	الوقاية من الأمراض المعدية التي يتسبب فيها السارس-كوف-2
تكرار التلقيح والفواصل الزمنية	مرتان (بفاصل زمني يبلغ من 4~12 أسبوعًا عادةً) *حقن عضلي
الفئات المستهدفة بالتلقيح	الأشخاص البالغين من العمر 40 سنة فما فوق عمومًا
مقدار الجرعة	0.5 مل لكل جرعة بإجمالي جرعتين

- تتص الموافقة الدوائية على وجوب تلقي الجرعة الثانية بعد 4~12 أسبوعًا من الجرعة الأولى عادةً. إلا أنه يستحسن ترك فاصل زمني يبلغ 8 أسابيع على الأقل بين الجرعتين الأولى والثانية للاستفادة من اللقاح إلى أقصى حد ممكن. يرجى تلقي الجرعة الثانية في أسرع وقت ممكن عند مرور أكثر من 12 أسبوعًا على تلقي الجرعة الأولى.
- لقد تم التأكد من أن العمر المستهدف لتلقيح فعال وأمن ينطبق على الأشخاص البالغين 18 عامًا فما فوق بموجب الموافقة الدوائية، إلا أن هذا اللقاح يعطى عمومًا للأشخاص البالغين 40 عامًا فما فوق في هذه المرحلة بناءً على حالات الاستخدام الموصى بها في البلدان الأخرى وتقارير المخاطر والفوائد لكل فئة عمرية.
- في حال تلقيت هذا اللقاح في المرة الأولى، يكون عليك عادةً تلقي نفس اللقاح في المرة الثانية.
- أظهرت التجارب السريرية تشكل مناعة كافية بعد 15 يومًا من تلقي الجرعة الثانية من هذا اللقاح. إلا أنه لا يمكن الوقاية من العدوى بشكل تام. لذا عليكم اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة سواء تلقيتم اللقاح أم لا.

الأشخاص الذين لا يستطيعون تلقي اللقاح

يستثنى من التلقيح الأشخاص المشار إليهم أسفله، لذا يرجى التأكد من استشارة الطبيب إن كانت لديكم إحدى الحالات التالية قبل عملية التلقيح:

- أشخاص لديهم حمى واضحة (*1)
- أشخاص يعانون من أمراض حادة
- أشخاص لهم تاريخ مرضي مع الحساسية المفرطة تجاه أي عنصر مكون لهذا اللقاح (*2)
- الأشخاص الذين عانوا من تجلط وريدي أو شرياني مصحوب بقلة الصفيحات بعد تطعيمهم بلقاح سارس-كوف-2
- الأشخاص الذين يعانون من سوابق الإصابة بمتلازمة التسرب الشعيري
- أشخاص بحالات أخرى لم تنتظر إليها أعلاه، والتي تجعل تلقي هذا اللقاح غير مناسب
- (*1) تُعرّف الحمى الواضحة بأنها 37.5 د أو أعلى. ومع ذلك فهذا لا ينطبق على الحالات التي يُحكم فيها على أنها حمى بالنسبة لدرجة حرارة الجسم العادية حتى ولو كانت تحت 37.5 درجة مئوية
- (*2) الحساسية المفرطة والأعراض المشيرة إليها، بما في ذلك من أعراض التهاب الغشاء المخاطي، والصغير، وضيق التنفس، وانعدام انتظام دقات القلب، وضغط الدم المنخفض.

الأشخاص الذين عليهم توخي الحذر بشأن تلقي اللقاح

يجب على الأشخاص الذين لديهم أي من الحالات التالية توخي الحذر بشأن تلقي هذا اللقاح. إن كنت تعتقد أن إحدى الحالات تنطبق عليك، فتأكد من إطلاع الطبيب على حالتك أثناء استشارة ما قبل التلقيح

- أشخاص يخضعون للعلاج المضاد للتخثر، الأشخاص الذين يعانون من قلة الصفيحات أو اضطرابات التخثر
- أشخاص تم تشخيص إصابتهم بنقص المناعة في الماضي، أو أشخاص لهم أقارب مصابين بنقص المناعة الخلقي
- أشخاص مصابون بأمراض رئيسية أو مزمنة، مثل القلب أو الكلى أو الكبد أو اضطرابات دموية أو اضطرابات في النمو
- أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحساسية مثل الحمى أو الطفح الجلدي المعمم في غضون يومين من تلقيهم لقاحات في الماضي
- أشخاص عانوا من تشنجات في الماضي
- أشخاص يحتمل أن تكون لديهم حساسية من مكونات هذا اللقاح

(يُتبع على الوجه الخلفي)

في حالة الحمل أو احتمالية الحمل أو الرضاعة، يرجى التأكد من إبلاغ الطبيب أثناء استشارة ما قبل التلقيح. يحتوي هذا المنتج على مادة مضافة لم يسبق استخدامها من قبل في إنتاج اللقاحات. في حالة ظهور حساسية مفرطة أو كانت لديكم حساسية تجاه الأدوية في الماضي، تأكدوا من إبلاغ الطبيب أثناء استشارة ما قبل التلقيح.

ما يجب القيام به بعد تلقي التلقيح

- بعد التلقيح، يرجى الانتظار في نفس المكان لمدة 15 دقيقة على الأقل (30 دقيقة على الأقل لأشخاص ظهرت عليهم أعراض الحساسية الشديدة بما في ذلك الحساسية المفرطة في الماضي، أو أشخاص ظهر عليهم المرض، أو أصيبوا بالإغماء، إلخ.)، وفي حالة الإصابة بتوَعَك، يرجى إبلاغ الطبيب فوراً. (هذا يفسح المجال أمام الاستجابة السريعة للأثار الجانبية المفاجئة)
- يجب المحافظة على نظافة المنطقة المحقونة. بينما لا يشكل الاستحمام أي عائق في نفس يوم التلقيح، يرجى تفادي فرك أو حك المنطقة المحقونة
- يمكنك متابعة حياتك اليومية بشكل طبيعي، ولكن يرجى الامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة أو الإفراط في تناول المشروبات الكحولية في يوم التلقيح.

الآثار الجانبية

- تشمل الأعراض الجانبية الرئيسية على ألم في منطقة الحقن والصداع وآلام المفاصل والعضلات والإنهاك والإرهاق والقشعريرة والحمى وغيرها. تبين التجارب السريرية ميل هذه الأعراض إلى الحدوث بتواتر أكبر بعد الجرعة الأولى مقارنة بالجرعة الثانية. وتشمل الأعراض الجانبية النادرة والخطيرة على الصدمة والحساسية المفرطة. بما أن هذا اللقاح هو نوع جديد من اللقاحات، فهناك احتمال ظهور أعراض لم يتم توضيحها حتى الآن. في حالة ملاحظة أي أعراض مقلقة بعد التلقيح، ينصح استشارة الطبيب الذي أجرى التلقيح، أو طبيب الأسرة
- لقد تم الإبلاغ عن حالات نادرة في الخارج حدث فيها تجلط الدم المصحوب بقلة الصفائح (1*) ومتلازمة التسرب الشعيري (2*) وأمراض مزيلة للميالين مثل متلازمة غيلان باريه (3*) بعد التطعيم باللقاح. إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية بعد التلقيح، فيرجى استشارة إحدى المؤسسات الطبية على الفور.
- (1*) أعراض مثل الصداع الشديد المستمر، وعدم وضوح الرؤية، وضيق التنفس، والتشوش، والتشنج، وآلام الصدر، وتورم وآلام الساقين، وآلم البطن المستمر، والنزيف الداخلي (الكدمات) في غير موضع التلقيح. تحدث معظم هذه الأعراض غالباً في غضون 28 يوماً من التلقيح، كما تحدث غالباً بعد الجرعة الأولى أكثر من حدوثها بعد الجرعة الثانية.
- (2*) أعراض مثل تورم الأطراف وانخفاض ضغط الدم.
- (3*) الاضطرابات الحركية مثل وهن الأطراف وضعف التحكم فيها، والاضطرابات الحسية مثل التتميل، وعسر التبول/عسر التغوط والاضطرابات البصرية مثل عدم وضوح الرؤية.

معلومات حول نظام الإغاثة الخاص بالحالات المرضية الناجمة عن التلقيح

يمكن للتطعيمات أن تسبب مشاكل صحية (مرض أو إعاقة). رغم أن مثل هذه المشاكل الصحية نادرة للغاية، إلا أنه يستحيل وضع حدٍ للمخاطر المصاحبة، ولهذا السبب قد تم إنشاء نظام إغاثة للتعاطي مع أي أمر طارئ في حالة حدوث أضرار صحية ناجمة عن لقاح فيروس كورونا، فالإعانة متاحة أيضاً بموجب قانون التحصين الخاص بالمناعة (وتشمل هذه الإعانة، النفقات الطبية، تعويضات معاش العجز، وما شابه). للاستفسار أكثر عن الإجراءات اللازمة لتقديم الطلب، يرجى استشارة بلدية مكان إقامتكم

معلومات حول عدوى فيروس كورونا المستجد

حين تتقدم عدوى ناجمة عن فيروس السارس-كوف-2، تظهر أعراض مشابهة لأعراض نزلات البرد، كالحمى والسعال. بينما يتعافى العديد من الأشخاص ذوي الأعراض الخفيفة من المرض، تتفاقم أوضاع الأشخاص ذوي الأعراض الشديدة بظهور أعراض الالتهاب الرئوي، التي تتجلى في صعوبة التنفس، وقد تؤدي حتى إلى الوفاة

خصائص لقاح فيروس كورونا المستجد (لقاح من صنع شركة أسترازينيكا) الذي سيستعمل هذه المرة

هذا الدواء هو لقاح نو ناقل فيروسي تم فيه دمج الجين الذي يشفر تسلسل الأحماض الأمينية للبروتين الشوكي لفيروس سارس-كوف-2 (وهو بروتين ضروري لدخول الفيروس إلى الخلايا البشرية) في فيروس غدي قروي (تمت معالجة الفيروس الغدي -وهو من فيروسات الزكام- لمنع من التكاثر). عندما يدخل الجين إلى الخلايا البشرية بعد التطعيم بهذا اللقاح، يتم إنتاج البروتين الشوكي الخاص بالفيروس داخل الخلايا استناداً إلى الجين ويتم تحفيز إنتاج الأجسام المضادة المعدلة والاستجابة المناعية الخلوية ضد البروتين الشوكي، وبهذا يعتبر بأنه بقي من الإصابة بعدوى فيروس سارس-كوف-2.

يحتوي هذا الدواء على العناصر المكونة التالية

العنصر النشط	لقاح فيروس كورونا (سارس-كوف-2) (ناقل فيروس غدي قروي معدل وراثياً)
المواد المضافة	(ملاحظة: فيروس غدي قروي تم فيه دمج الجين الذي يشفر تسلسل الأحماض الأمينية للبروتين الشوكي لفيروس سارس-كوف-2)
	إل-هستيدين
	هيدروكلوريد هيدرات إل-هستيدين
	كلوريد الصوديوم
	كلوريد المغنيسيوم
	هيدرات إديتات الصوديوم
	سكروز منقى
	إيثانول مطلق
	بوليسوربات 80

لمزيد من المعلومات حول فعالية وسلامة لقاح فيروس كورونا، يرجى زيارة صفحة لقاحات فيروس كورونا المستجد على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والعمل والرفاهية

وزارة الصحة والعمل والرفاهية لقاحات فيروس كورونا المستجد

Search



إذا كنت لا تستطيع تصفح الموقع، يرجى الاتصال بمقر بلدتك.