

لقاح تاكيدا/مودرنا
(أغسطس/آب 2021)
(يناير/كانون الثاني 2022)

إرشادات حول التطعيم الوقائي بلقاح فيروس كورونا المستجد (الجرعة التنشيطية (الثالثة))

نبذة عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد

يتم التطعيم بهذا اللقاح كجزء من مشروع التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) الذي تجريه الحكومة الوطنية والحكومات المحلية. يتم توفير هذا اللقاح على نفقة الدولة ويتم تطعيم الراغبين به مجاناً. الجرعة التنشيطية (الثالثة) من هذا اللقاح مخصصة للأشخاص الذين يبلغون 18 عاماً فما فوق.

تأثير اللقاح وطريقة إعطائه

اللقاح المستخدم هذه المرة هو لقاح تاكيدا/مودرنا. وهو يمنع ظهور أعراض عدوى فيروس كورونا المستجد. إن عيار الأجسام المضادة بعد 28 يوماً من تلقي الجرعة التنشيطية من هذا اللقاح هو أعلى من عيار الأجسام المضادة بعد 28 يوماً من الجرعة الثانية حسب التقارير.

الاسم التجاري	سبايكفاكس TM للحقن العضلي
الفعالية والتأثير	الوقاية من عدوى فيروس SARS-CoV-2
عدد الجرعات والفواصل الزمني بينها	مرة واحدة (بعد مرور فترة زمنية محددة على تلقي الجرعة الثانية) *حقن عضلي
الأشخاص الذين يمكن تطعيمهم	البالغون 18 عاماً فما فوق (لم تتضح بعدُ فعالية وسلامة الجرعة التنشيطية لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً).
مقدار الجرعة	جرعة واحدة 0.25 مل (مرة واحدة)

- تختلف الفترة الفاصلة قبل الجرعة التنشيطية بموجب قانون التطعيم الوقائي من شخص إلى آخر (تبلغ الفترة من 6 إلى 8 أشهر حالياً). الرجاء مراجعة إشعارات بلديتك.
- يمكن إعطاء هذا اللقاح بغض النظر عن نوع اللقاح المستخدم في الجرعتين الأولى والثانية.
- إن تلقي الجرعة التنشيطية من هذا اللقاح لا يحول دون الإصابة بالعدوى بشكل تام. عليكم متابعة اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة سواء تلقيتم اللقاح أم لا.

الأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم

لا يمكن تطعيم الأشخاص التالية بهذا اللقاح. إذا كنت تظن بأن أحد البنود التالية تنطبق عليك، فاحرص على إخبار الطبيب بذلك في الاستشارة السابقة للتطعيم.

- الأشخاص الذين يعانون من حمى واضحة (*1)
- الأشخاص المصابون بأمراض حادة خطيرة
- الأشخاص الذين يعانون من سوابق فرط الحساسية الشديدة (*2) تجاه مكونات هذا اللقاح
- الأشخاص الذين يعانون من حالات أخرى بخلاف ما سبق تجعل تلقي اللقاح غير مناسب لهم
- (*1) الحمى الواضحة تشير عادةً إلى درجة حرارة 37.5°م أو أعلى. إلا أن الأمر لا يقتصر على ذلك إذا تم تشخيص الحالة على أنها حمى بالمقارنة بدرجة حرارة الجسم الطبيعية، حتى لو كانت درجة الحرارة أقل من 37.5°م.
- (*2) الحساسية المفرطة أو الأعراض المتعددة التي تشير إليها مثل أعراض التهاب الجلد والأغشية المخاطية المختلفة أو الصفير عند التنفس أو ضيق النَّفس أو تسارع ضربات القلب أو انخفاض ضغط الدم، إلى آخره.
- لا يمكن لمن ظهرت عليهم هذه الأعراض بعد الجرعة الأولى أو الثانية أن يتلقوا الجرعة التنشيطية من نفس اللقاح.

الأشخاص الذين يتوجب عليهم الحذر عند التطعيم

على الأشخاص الذين تنطبق عليهم الأمور التالية أن يتوخوا الحذر عند تلقي التطعيم. إذا كنت تظن بأن أحد البنود التالية تنطبق عليك، فاحرص على إخبار الطبيب بذلك في الاستشارة السابقة للتطعيم.

- الأشخاص الذين يخضعون لعلاج مضاد لتخثر الدم، والأشخاص الذين يعانون من نقص صفيحات الدم أو الاعتلال الخثري
- الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بنقص المناعة في الماضي، والأشخاص الذين لديهم أقارب يعانون من نقص المناعة الخلقي
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض أساسية أو مزمنة مثل أمراض القلب أو الكلى أو الكبد أو اضطرابات الدم أو اضطرابات النمو
- الأشخاص الذين أدى تطعيمهم في الماضي إلى ظهور أعراض حساسية مثل الحمى أو الطفح الجلدي الشامل في غضون يومين من التطعيم
- الأشخاص الذين أصيبوا بتشنجات في الماضي
- الأشخاص الذين قد يعانون من حساسية تجاه مكونات هذا اللقاح
- على الحوامل والنساء اللاتي يحتمل أن يكن حوامل والمرضعات الحرس على إخبار الطبيب بذلك في الاستشارة السابقة للتطعيم. وفي حالة تعذر استشارة طبيب النسائية والتوليد فإن التطعيم يكون ممكناً إذا رأى طبيب الفحص الطبي المسبق إمكانية ذلك.
- يحتوي هذا الدواء على مواد مضافة لم يسبق استخدامها في اللقاحات من قبل. على الأشخاص الذين سبق لهم التعرض لحساسية مفرطة أو تحسس من الدواء في الماضي الحرس على إخبار الطبيب بذلك في الاستشارة السابقة للتطعيم.

(يُتبع على الوجه الخلفي)

الاحتياطات اللازمة بعد التطعيم

- بعد تلقي التطعيم بهذا اللقاح، يرجى الانتظار في مركز التطعيم لمدة 15 دقيقة (30 دقيقة للأشخاص الذين سبق لهم التعرض لأعراض حساسية شديدة بما فيها الحساسية المفرطة والأشخاص الذين سبق لهم الشعور بالتوعك أو الإصابة بالإغماء) وإعلام الطبيب على الفور عند الشعور بأي توعك. (هذا الأمر يسمح بالاستجابة للأعراض الجانبية المفاجئة).
- حافظ على نظافة منطقة الحقن ولا تفركها إذا قمت بالاستحمام في يوم التطعيم.
- يمكنك متابعة حياتك بشكل طبيعي، ولكن يرجى الامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة أو الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

الأعراض الجانبية

- تشمل الأعراض الجانبية الرئيسية على ألم في موقع الحقن (1*) والصداع وآلام المفاصل والعضلات والإرهاق والتشعريرة والحمى وما إلى ذلك. تشمل الأعراض الجانبية الخطيرة نادرة الحدوث على الصدمات وفط الحساسية. ونظرًا لأن هذا اللقاح هو نوع جديد من اللقاحات، فإنه من المحتمل ظهور أعراض لم يتم تأكيدها بعد. إذا لاحظت أية أعراض مقلقة بعد التطعيم، فيرجى استشارة الطبيب المسؤول عن التطعيم أو طبيب الأسرة.
- (1*) يشعر الكثير من الأشخاص بالألم في اليوم التالي للتطعيم الأول (الجرعتان الأولى والثانية) وليس بعد التطعيم مباشرة. كما قد يحدث ألم وتورم بعد حوالي أسبوع أو أكثر من التطعيم وفقًا للتقارير.
- تم الإبلاغ عن حالات يشبه فيها بالإصابة بالتهاب في عضلة القلب والتامور بعد التطعيم بالجرعة الأولى وذلك في بعض الحالات النادرة (2*). إذا عانيت من أعراض مثل آلام الصدر أو الخفقان أو ضيق التنفس أو التورم في غضون بضعة أيام من التطعيم، فيرجى استشارة إحدى المؤسسات الطبية على الفور.
- (2*) تكون أكثر شيوعًا بين الشباب وخاصة الرجال بعد الجرعة الثانية من اللقاح أكثر من الجرعة الأولى.
- تم الإبلاغ عن أن الجرعة التنشيطية تؤدي إلى كثير من حالات التورم في الغدد المفوية في الإبطن (حوالي 20%) مقارنة بالجرعتين الأولى والثانية. يرجى استشارة الطبيب إذا كانت الأعراض شديدة أو استمرت لفترة طويلة.

حول نظام إغاثة الأضرار الصحية الناتجة عن التطعيم الوقائي

قد يتسبب التطعيم الوقائي في وقوع مشاكل صحية (الإصابة بمرض أو التعرض لإعاقة). تم تأسيس نظام الإغاثة لأنه لا يمكن الحد من هذه المشاكل، على الرغم من شدة ندرة حدوثها. إذا تعرضت لأضرار صحية نتيجة التطعيم الوقائي بلقاح فيروس كورونا المستجد، فبإمكانك تلقي المساعدة (كالنفقات الطبية ومعاش الإعاقة وإلى آخره) بناءً على قانون التطعيم الوقائي. فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لتقديم الطلب، يرجى استشارة البلدية التي تضم شهادة إقامتك.

حول عدوى فيروس كورونا المستجد

الإصابة بعدوى فيروس SARS-CoV-2 تؤدي إلى ظهور أعراض مشابهة لأعراض الزكام كالحمى والسعال. يشفى العديد من الناس بعد ظهور أعراض خفيفة فقط، ولكن زيادة شدة المرض تؤدي إلى تفاقم أعراض الالتهاب الرئوي كضيق التنفس كما قد تؤدي إلى الوفاة.

خصائص لقاح فيروس كورونا المستجد (لقاح تاكيدا/مودرنا) الذي سيتم تطعيمك به هذه المرة

هذا الدواء هو لقاح حمض نووي ريبوبي مرسل (رنا مرسل) يضم غشاءً دهنيًا يحتوي على الرنا المرسل الذي يشكل البروتين الشوكي (البروتين الذي يحتاجه الفيروس ليغزو الخلايا البشرية) في فيروس SARS-CoV-2. عندما يدخل الرنا المرسل إلى الخلايا البشرية بعد التطعيم بهذا اللقاح، يتم إنتاج البروتين الشوكي الخاص بالفيروس داخل الخلايا استنادًا إلى الرنا المرسل ويتم تحفيز إنتاج الأجسام المضادة المعدلة والاستجابة المناعية الخلوية ضد البروتين الشوكي، وبهذا يعتبر بأنه يقي من الإصابة بعدوى فيروس SARS-CoV-2.

يحتوي هذا الدواء على المكونات التالية.

المكونات الفعالة	✧
إيلاسوميران (الرنا المرسل الذي يقوم بترميز كامل البروتين الشوكي الذي يرتبط بأغشية الخلايا البشرية)	
المواد المضافة	✧ SM-102: هيبثايدكان-9-إيل-8 ((2-هيدروكسيثيل) (6-أو إكس أو-6-أنديسيلوكسي) هيكسيل) أمينو) إستر أمينو أوكتانوت ✧ كولسترول ✧ DSPC: 2.1-ديستيريول-سن-جليسرو-3-فوسفوكولين ✧ 2.1-ديميرستويل-راك-جليسرو-3-ميثوكسي بولي إيثيلين جلايكول-2000 (PEG2000 DMG) ✧ تروميتامول ✧ هيدروكلوريد التروميتامول ✧ حمض الخليك ✧ أسيتات الصوديوم ثلاثي الهيدرات ✧ السكروز المنقى

لمزيد من المعلومات حول لقاح فيروس كورونا المستجد، يرجى زيارة موقع وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية
لقاح كورونا

بحث



يرجى استشارة بلديتك المحلية إذا لم تتمكن من زيارة موقع الوزارة.