

សេចក្តីណែនាំអំពីវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូរ៉ូណា (សម្រាប់ការចាក់ដូសជំរុញ(លើកទី3))

អំពីវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូរ៉ូណា

វ៉ាក់សាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ និងតាមមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបង្ការមេរោគកូរ៉ូណា (SARS-CoV-2)។ វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយថវិកាសាធារណៈ ហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងមិនគិតថ្លៃឡើយ។ ការចាក់ដូសជំរុញ(លើកទី3) នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី 12 ឆ្នាំឡើងទៅ។

ប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំង និងវិធីសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំង

វ៉ាក់សាំងដែលនឹងផ្តល់ជូនលើកនេះគឺបានផលិតឡើងដោយ Pfizer។ វ៉ាក់សាំងនេះ នឹងបង្ការការចេញរោគសញ្ញានៃជំងឺឆ្លងកូរ៉ូណា 19 គេបានរាយការណ៍មកថា ចំនួនអង់ទីករនឹងកើនឡើងច្រើនជាង បន្ទាប់ពីបានចាក់ដូសជំរុញនេះរួចក្នុងរយៈពេល 1 ខែក្រោយ បើធៀបនឹងចំនួនអង់ទីករដែលបានកើនឡើងនោះរយៈពេលដូចគ្នាបន្ទាប់ពីចាក់ដូសទី 2 ។

| | |
|---|--|
| ឈ្មោះវ៉ាក់សាំង | ថ្នាំចាក់សាច់ដុំ Comirnaty |
| ប្រសិទ្ធផល និងប្រសិទ្ធភាព | ការបង្ការជំងឺឆ្លងដែលបង្កឡើងដោយវីរុស SARS-CoV-2 |
| ភាពញឹកញាប់ និងចន្លោះពេលវេលានៃការចាក់វ៉ាក់សាំង | 1 ដង (ក្រោយចន្លោះពេលកំណត់ណាមួយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការចាក់លើកទី 2) *ការចាក់សាច់ដុំ |
| បុគ្គលដែលអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន | អ្នកដែលអាយុចាប់ពី 12 ឆ្នាំឡើង |
| បរិមាណវ៉ាក់សាំង | 1 ដង = 0.3 ml (ចាក់ 1 ដង) |

- ដោយផ្អែកតាមច្បាប់ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ រយៈពេលនៃការចាក់ដូសជំរុញគឺមានគម្លាតខុសគ្នាទៅតាមបុគ្គលនីមួយៗ (បច្ចុប្បន្នគឺចន្លោះពី 6-8 ខែ)។ សូមពិនិត្យមើល សេចក្តីជូនដំណឹងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់ដែលអ្នករស់នៅ។
- វ៉ាក់សាំងនេះអាចចាក់បានដោយ មិនគិតពីប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលបានចាក់នៅលើកទី 1 ឬលើកទី 2 ឡើយ។
- ទោះបីជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដោយមិនគិតថ្លៃក៏ដោយ ក៏មិនប្រាកដថាអាចការពារការឆ្លងបានទាំងស្រុងឡើយ។ ការបន្តអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងដែលសមស្រប គឺជាវិធីដាច់ខាតចំពោះបីជានិច្ច មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយ។ ម្យ៉ាងទៀត ការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងសមស្របជាបន្តទៀត គឺជាវិធីដាច់ខាតចំពោះបីជានិច្ចបានចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយ។

បុគ្គលដែលមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន

វ៉ាក់សាំងនេះមិនអាចផ្តល់ជូនបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមឡើយ។ សូមផ្តល់ដំណឹងដល់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនៅក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះយោបល់មុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រសិនបើអ្នកគិតថាខ្លួនខ្លួនឯងមានលក្ខណៈណាមួយត្រូវនឹងស្ថានភាពរបស់អ្នក។

- បុគ្គលដែលមានគ្រុនក្តៅ (*1)
 - បុគ្គលដែលមានជំងឺស្រួចស្រាវជ្រាវធ្ងន់ធ្ងរ
 - បុគ្គលដែលធ្លាប់មានប្រតិកម្មប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ (*2) ជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំនៃវ៉ាក់សាំងនេះ។
 - បុគ្គលដែលមានលក្ខណៈដទៃក្រៅពីលក្ខណៈខាងលើដែលមានលក្ខណៈមិនសមស្របក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះ។
- (*1) គ្រុនក្តៅជាទូទៅមានសីតុណ្ហភាពចាប់ពី 37.5 អង្សារសេ ឡើងទៅ។ ប៉ុន្តែ លក្ខណៈនេះមិនសមស្របសម្រាប់ការវាយតម្លៃដំណឹងនៃវ៉ាក់សាំងនេះ រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដោយពិចារណាលើសីតុណ្ហភាពរាងកាយធម្មតាឡើយ ទោះបីជាវាងាយស្រួលសម្រាប់ការវាយតម្លៃសីតុណ្ហភាពរាងកាយជាង 37.5 អង្សារក៏ដោយ។
- (*2) ជំងឺប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរទាន់ហាន និងរោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីជំងឺប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ រួមមានដូចជា រកស្បែក និងរោគសញ្ញាមានគ្នាសរសើរ ពិបាកដកដង្ហើម ដង្ហើមខ្លី បេះដូងលោតញាប់ និងសម្ពាធឈាមខ្សោយ ជាដើម។ អ្នកដែលបានចេញរោគសញ្ញាដូចរៀបរាប់ខាងលើនេះបន្ទាប់ពីពេលចាក់លើកទី 1 គឺមិនអាចចាក់ដូសជំរុញដោយប្រើវ៉ាក់សាំងដូចគ្នាឡើយ។

បុគ្គលដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង

បុគ្គលដែលមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាខ្លួនមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមនេះ សូមផ្តល់ដំណឹងដល់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនៅក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះមុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំង។

- បុគ្គលដែលកំពុងព្យាបាលការកកឈាម បុគ្គលដែលមានប្រតិកម្មធាតុចល័ត ឬជំងឺកកឈាម។
- បុគ្គលដែលធ្លាប់ពិនិត្យឃើញថាខ្លះភាពស្អុំ ឬបុគ្គលដែលមានសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធខ្លះភាពស្អុំពិបាក។
- បុគ្គលដែលមានជំងឺជាប់ខ្លួនស្រាប់ដូចជា ជំងឺបេះដូង តម្រងនោម ថ្លើម ជំងឺឈាម ឬ ជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងការលូតលាស់ ជាដើម។
- បុគ្គលដែលធ្លាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងពីមុនមក ហើយកើតមានរោគសញ្ញាអាឡាក់ស៊ី ដូចជា គ្រុនក្តៅ ឬរមាស់ស្បែកនៅក្នុងអំឡុងពេល 2
- ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំង។
- បុគ្គលដែលធ្លាប់មានជំងឺប្រកាច់កាលពីមុន
- បុគ្គលដែលអាចនឹងអាឡាក់ស៊ីជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំនៃវ៉ាក់សាំងនេះ។

ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះ ឬអាចមានផ្ទៃពោះ ឬកំពុងបំបៅកូនដោយទឹកដោះ សូមផ្តល់ដំណឹងជូនដល់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនៅក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះយោបល់មុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំង។ យ៉ាងណាមិញ ក្នុងករណីអ្នកមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសម្រាប់ប្រចាំខ្លួន អ្នកអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបាន ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានវិនិច្ឆ័យអនុញ្ញាតដោយគ្រូពេទ្យគ្រូពិនិត្យពិនិត្យស្រាវជ្រាវ។

វ៉ាក់សាំងនេះមានផ្ទុកសារធាតុបន្ថែមដែលមិនធ្លាប់មានប្រើនៅក្នុងវ៉ាក់សាំងពីមុនឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ ឬអាឡាក់ស៊ី ជាមួយនឹងថ្នាំព្យាបាលមួយចំនួន សូមផ្តល់ដំណឹងជូនដល់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនៅក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះយោបល់មុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំង។

សកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីទទួលបានវ៉ាក់សាំង

- បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរួច សូមរង់ចាំនៅទីកន្លែងដែលអ្នកចាក់ថ្នាំនោះឱ្យបានយ៉ាងហោច 15 នាទី (យ៉ាងហោច 30 នាទីសម្រាប់បុគ្គលដែលធ្លាប់មានរោគសញ្ញាអាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាជំងឺប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ ឬបុគ្គលដែលមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន ឬស្លាប់ ជាដើម) ប្រសិនបើអ្នក មានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន សូមទាក់ទងទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកភ្លាមៗ។ (ធ្វើបែបនេះអាចជួយឱ្យអ្នកអាចឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងភ្លាមៗនោះ)
- កន្លែងដែលចាក់ថ្នាំត្រូវតែរក្សាឱ្យស្អាត។ ទោះបីជាការអ្នកអាចដកទឹកនៅថ្ងៃដែលចាក់ថ្នាំនោះបានក៏ដោយ ក៏អ្នកមិនត្រូវដុសកន្លែងដែលចាក់ថ្នាំនោះដែរ។
- សូមកុំធ្វើការហាត់ប្រាណខ្លាំងនៅថ្ងៃចាក់ថ្នាំនោះ។

(បន្តទៅខាងក្រោយ)

ផលប៉ះពាល់

- ផលប៉ះពាល់ចម្បងមានដូចជា ការឈឺចាប់នៅកន្លែងដែលចាក់ថ្នាំនោះ ឈឺក្បាល ឈឺសន្ទាក់ និងឈឺសាច់ដុំ អស់កម្លាំង រងារ និងគ្រុនក្តៅ។ ផលប៉ះពាល់ដែលកម្រនឹងកើតឡើង ហើយមានភាពធ្ងន់ធ្ងរមានដូចជា ជំងឺចុះសម្ពាធឈាម (shock) ឬប្រតិកម្មថ្នាំ។ ដោយសារវ៉ាក់សាំងនេះគឺជារ៉ាក់សាំងប្រភេទថ្មី ទើបថ្នាំនេះអាចនឹងបង្កឱ្យមានរោគសញ្ញាដែលមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ច្បាស់ រហូតមកដល់ពេលនេះ។ ប្រសិនបើអ្នក កត់សម្គាល់ឃើញមានរោគសញ្ញាណាមួយបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងរួច សូមពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតដែលចាក់វ៉ាក់សាំងនោះ ឬ វេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសាររបស់អ្នក។
- គ្យូតជាករណីកម្រខ្លាំង ក៏មានការរាយការណ៍ពីករណីសង្ស័យ ពីការរលាកសាច់ដុំបេះដូងនិង រលាកស្រាមបេះដូងក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំង ដូចមូលដ្ឋាននេះ(លើកទី1/លើកទី2 នេះផងដែរ(លើកទី1/លើកទី2) (*)។ បើមានលេចចេញរោគសញ្ញាដូចជា ឈឺទ្រូងឬបេះដូងលោតខ្លាំង ដង្ហើមខ្លី ការហើម ជាដើម ក្នុងរង្វង់ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយចាក់ សូមទៅទទួលការពិនិត្យពីស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រឱ្យបានឆាប់រហ័ស។ (*) ករណីនេះមានទំនោរកើតឡើងនៅក្រោយការចាក់លើកទី 2 ច្រើនជាងការចាក់លើកទី 1 ហើយភាគច្រើនកើតចំពោះមនុស្សវ័យក្មេង ជាពិសេសគឺបុរស។
- បើនៅក្នុងការចាក់ដូងដុំនេះ រោគសញ្ញាបានបង្ហាញថា ជាទូទៅមានការឡើងកូនកណ្តុរក្រោមក្រៀមច្រើន (ប្រមាណ5%) បើធៀបទៅនឹងការចាក់លើកទី1 ឬទី2។ រោគសញ្ញាភាគច្រើនគឺស្រាល នឹងបាត់ទៅវិញក្នុងរង្វង់ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយ ប៉ុន្តែបើនៅឡើងហើមខ្លាំង ឬបន្តយូរ សូមទៅពិនិត្យនៅស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រ។

អំពីប្រព័ន្ធដំនួយសម្រាប់ការរងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយសារការចាក់វ៉ាក់សាំង

ការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចបង្កឱ្យមានបញ្ហាសុខភាព (ជំងឺផ្សេងៗ ឬពិការភាព)។ ទោះបីជាករណីកម្រ ប៉ុន្តែក៏មិនអាចសន្មតថាគ្មានទាំងស្រុងបានឡើយ ហេតុនេះទើបប្រព័ន្ធដំនួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង។ នៅក្នុងករណីដែលមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយសារតែការចាក់វ៉ាក់សាំង ជំនួយ (ចំណាយលើការព្យាបាល ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ជនពិការ ជាដើម) ក៏មានផ្តល់ជូនផងដែរនៅក្រោមច្បាប់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំង។ សូមពិគ្រោះជាមួយនិងភូមិ សង្កាត់ ក្រុងរដ្ឋបាលស្រុកអំពីនីតិវិធីចាំបាច់សម្រាប់ការបំពេញបែបបទ។

អំពីការឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណា


នៅពេលដែលឆ្លងវីរុស SARS-CoV-2 អ្នកអាចនឹងមានរោគសញ្ញាស្រដៀងនឹងជំងឺផ្តាសាយ ដូចជា គ្រុនក្តៅ និងក្អក ជាដើម។ ទោះបីជាមានមនុស្ស ជាច្រើនបានធូរស្រាលពីជំងឺនេះដោយមានរោគសញ្ញាតិចតួចក្តី នៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួន រោគសញ្ញារលាកសួត ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមខ្លាំងទៅៗ ហើយថែមទាំងអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតថែមទៀត។

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វ៉ាក់សាំងមេរោគកូរ៉ូណា (វ៉ាក់សាំងផលិតដោយ Pfizer) ដែលនឹងយកមកប្រើប្រាស់នៅលើកនេះ

ថ្នាំនេះគឺជារ៉ាក់សាំង RNA នាំសារ (mRNA) ហើយជាការផ្សំ ដែល mRNA ដែលជាផែនការសម្រាប់ប្រូតេអ៊ីនសំខាន់នៃវីរុស SARS-CoV-2 (ប្រូតេអ៊ីនដែលមេរោគកូរ៉ូណាប្រើប្រាស់ដើម្បីចូលទៅក្នុងកោសិកាដទៃទៀត) មានព័ន្ធជុំវិញនៅក្នុងភ្នាសលីពីត។ នៅពេលដែល mRNA ចូលទៅដល់កោសិកា របស់មនុស្សតាមរយៈវ៉ាក់សាំងដែលមាននៅក្នុងថ្នាំនេះ ប្រូតេអ៊ីនបន្លាមេរោគ (viral spike proteins) នឹងកើតឡើងនៅក្នុងកោសិកាអាស្រ័យទៅតាម mRNA ហើយធ្វើឱ្យអង្គការរបស់ប្រព័ន្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងនឹងប្រូតេអ៊ីនបន្លា ថែមទាំងបង្កើតឱ្យមានការឆ្លើយតបការពារកោសិកា ដែលគេបានធ្វើជាអាចបង្ការការឆ្លងជំងឺដែលបណ្តាលមកពីវីរុស SARS-CoV-2 បាន។

ថ្នាំនេះមានផ្សំឡើងពីគ្រឿងដូចខាងក្រោម៖

| | | |
|------------------|---|------------------------------|
| សារធាតុផ្សំសកម្ម | ◆ Tozinameran (mRNA បង្កើតឱ្យមានប្រូតេអ៊ីនបន្លាពេញលក្ខណៈដែលភ្ជាប់ជាមួយនិងភ្នាសកោសិការបស់មនុស្ស) | |
| ធាតុផ្សំបន្ថែម | ◆ សមាសធាតុ ALC-0315: [(4-hydroxybutyl)azanediyl]bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) | |
| | ◆ សមាសធាតុ ALC-0159: 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide | |
| | ◆ សមាសធាតុ DSPC: 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | |
| | ◆ កូលេស្តេរ៉ូល | |
| | ◆ ប៉ូតាស្យូម ក្លរីត | ◆ ផ្លូវ៉ូម៉ូណូត្រូប៉ូតាស្យូម |
| | ◆ ស្ករ | |

| | | | |
|---|---|----------------|---|
| <p>សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់មេរោគកូរ៉ូណា សូមចូលទៅកាន់ទំព័រវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មេរោគកូរ៉ូណានៅលើវេបសាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុមាលភាព។</p> | <p>ក្រសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុមាលភាព វ៉ាក់សាំងមេរោគកូរ៉ូណា</p> | <p>ស្វែងរក</p> |  |
| <p>ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបើកវេបសាយនោះបានទេ សូមទាក់ទងទៅកាន់សាលាក្រុងក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។</p> | | | |