

การป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ

แม้ได้รับวัคซีนแล้ว กรุณา "สวมหน้ากาก" และ "ล้างมือ" รวมทั้ง "หลีกเลี่ยง 3-Mitsu (3 ปัจจัย) (สัมผัสใกล้ชิด-พื้นที่แออัด-พื้นที่ปิด)" อย่างเคร่งครัด

สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง!





1 ปรับหน้ากากอนามัยให้ แนบสนิทตามรูปทรงจมูก



2 ดึงลงไปถึงใต้คาง และให้ พอดีกับใบหน้าโดยไม่ให้มี ช่องว่าง

สวมทุกครั้งขณะ พูดคุยกัน!



- สวมหน้ากากอนามัยเปิดจมูก 🗙 สวมหน้ากากอนามัยใต้คาง 🗙
- เมื่อสวมแล้วไม่จับที่ด้านนอก
- จับสายคล้องหูและถอดออก
- หากเป็นไปได้ ใช้หน้ากากอนามัยทำจากใย สังเคราะห์ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้



หมั่นล้างมือและใช้ เจลฆ่าเชื้อที่มือ!

ล้างทุกครั้งในสถานการณ์ดังนี้!

- หลังจากสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน
- ก่อนและหลังทานอาหาร
- หลังจากใช้ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น



อย่าลืมล้างทำความสะอาดตรงปลาย นิ้ว ซอกเล็บ ซอกนิ้ว และข้อมือ!

ตั้งเป้าเป็น <mark>ใกล้ชิดมิดหน</mark>า

หลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงแม้จะเป็นเพียงข้อเดียว!!





สัมผัสใกล้ชิด ไม่สวมหน้ากากอนามัย× พูดเสียงดัง×



พื้นที่แออัด คนจำนวนมาก× อยู่ใกล้กัน×



พื้นที่ปิด คนจำนวนมากx คยู่ใกล้กันx

▶ เมื่อมีอาการไม่สบาย กรุณางดไปทำงานหรือไปเรียน

🕨 ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน กรุณาไปรับวัคซีน









