

ចំពោះកុមារអាយុ 5-11 ឆ្នាំ



សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-19



ហេតុអ្វីត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ?

បើមេរោគកូវីដចូលក្នុងខ្លួនមនុស្ស ហើយគ្មារកើនឡើងច្រើន វានឹងធ្វើឲ្យ ក្តៅខ្លួន អស់កម្លាំង ក្អក ពិបាកដកដង្ហើម ឈឺក្បាល ប្រែប្រួល ការភ្នក់ដឹងរសជាតិជាដើម ហើយនឹងធ្វើឲ្យមិនស្រួលខ្លួន។

បើចាក់វ៉ាក់សាំង ខ្លួនយើងនឹងអាចត្រៀមខ្លួនវាយជាមួយមេរោគកូវីដ ដូច្នោះ ទោះមេរោគឆ្លងចូលក្នុងខ្លួនក៏ដោយ ក៏មិនងាយធ្វើឲ្យទៅជាមិនស្រួលខ្លួនដែរ។



ពេលចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ តើគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ននឹងអ្វីខ្លះ?

<p>មុន ចាក់</p>	<p>បើក្តៅខ្លួនចាប់ពី 37.5°C ឡើងទៅ ឬបើមិនស្រួលខ្លួន គឺមិនអាចចាក់បានទេ ដូច្នោះសូមប្រាប់អ្នកផ្ទះ។</p>
<p>ពេល ចាក់</p>	<p>វ៉ាក់សាំងនេះគឺចាក់នៅក្បែរស្មៅ។ សូមទៅចាក់ដោយពាក់អាវដែលងាយស្រួលលាត់ចេញស្មៅ។</p>
<p>ក្រោយ ចាក់ រួច</p>	<p> <input type="checkbox"/> ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងរួច សូមអង្គុយ ចាំអោយបាន 15នាទីឡើងទៅ ដើម្បី តាមដានអាការៈផ្សេងៗ។ (ពេលខ្លះក៏អាចដល់ទៅ ៣០នាទីផង ដែរ) <input type="checkbox"/> នៅថ្ងៃចាក់ អាចធ្វើសកម្មភាពដូច ធម្មតាបាន ដូចជាដូតទឹកជាដើម ប៉ុន្តែសូមកុំហាត់ប្រាណខ្លាំង។ </p> <p> <input type="checkbox"/> នៅពេលចាក់វ៉ាក់សាំង អាចនឹងចេញអាការៈមិនស្រួលខ្លួនដូចខាងក្រោម ប៉ុន្តែគេ រកឃើញថាវានឹងបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯង ក្នុងពេល2-3ថ្ងៃ។ <input type="checkbox"/> ក្តៅខ្លួន <input type="checkbox"/> មិនស្រួលខ្លួន <input type="checkbox"/> អស់កម្លាំង <input type="checkbox"/> រាក <input type="checkbox"/> ឈឺក្បាល <input type="checkbox"/> រងាមិនស្រួលខ្លួន </p>

បើមានអាការៈមិនស្រួលដូចខាងក្រោមនេះ សូមប្រាប់អ្នកផ្ទះឬមនុស្សធំ ដែលនៅជុំវិញ។

- **ពេលចាក់ហើយភ្លាម**
 - រមាស់ខ្លួន
 - ក្អក
- **នៅថ្ងៃចាក់ប្រយៈពេលប្រហែល4ថ្ងៃក្រោយចាក់ហើយ**
 - ក្តៅខ្លួន
 - ឈឺក្បាល
 - ឈឺទ្រូង
 - ពិបាកដកដង្ហើម
 - អស់កម្លាំង
 - រងាមិនស្រួលខ្លួន
 - ក្នុងទ្រូងឧកឌាក់ៗ

សូមចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ 2លើក ដោយទុកគម្លាត 3 សប្តាហ៍។

រឿងសំខាន់ដែលចង់ឲ្យប្អូនៗធ្វើ។

មនុស្សមានផ្សេងៗគ្នា អ្នកខ្លះបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបាន លឿន ចំណែកអ្នកខ្លះក៏មានមូលហេតុផ្សេងៗដែលមិនអាចចាក់ វ៉ាក់សាំងបានជាដើម។ សូមកុំយកហេតុផលនេះ ជាមូលហេតុក្នុង ការនិយាយអាក្រក់ ឬធ្វើបាបអ្នកនៅជុំវិញជាដាច់ខាត។

