

لقاح ثنائي التكافؤ من مودرنا  
(BA.4-5/BA.1)  
(أيار/مايو 2023)

## إرشادات حول التطعيم الوقائي بلقاح فيروس كورونا المستجد (الجرعة التنشيطية (بدأ التطعيم في ربيع عام 2023))

### نبذة عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد

يتم التطعيم بهذا اللقاح كجزء من مشروع التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) الذي تجريه الحكومة الوطنية والحكومات المحلية. يتم توفير هذا اللقاح على نفقة الدولة ويتم تطعيم الراغبين به مجاناً. الجرعة التنشيطية (الثالثة) من هذا اللقاح مخصصة للأشخاص الذين يبلغون 18 عاماً فما فوق.

### تأثير اللقاح وطريقة إعطائه

اللقاح المستخدم هذه المرة هو لقاح ثنائي التكافؤ خاص بسلسلة أوميكرون (السلسلة الأساسية) (السلسلة الأصلية) وسلسلة أوميكرون BA.1 أو BA.4-5) من صناعة شركة مودرنا. ويتم التطعيم به بهدف الوقاية من تفاقم المرض عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد والوقاية من العدوى به والوقاية من ظهور المرض. في تجارب سريرية أجريت على أشخاص يبلغ عمرهم 18 عاماً أو أكثر، توضح بأن عيار الأجسام المضادة للجرعة التنشيطية من اللقاح ثنائي التكافؤ الخاص بسلسلة BA.1 بعد 28 يوماً من تلقي التطعيم مساوٍ أو أعلى منه في الجرعات التنشيطية من اللقاح الأساسي أحادي التكافؤ (السلسلة الأصلية)، ولذلك فإنه يمكن توقع درجة معينة من التأثير الوقائي من ظهور المرض وتفاقمه. كما توضح في تجارب غير سريرية أن الجرعات التنشيطية من اللقاح ثنائي التكافؤ الخاص بسلسلة BA.4-5 تعزز الاستمناح والتأثير الوقائي ضد العدوى بالسلاسل المتحورة، ومن المتوقع أن يكون له مجموعة واسعة من الآثار الوقائية ضد السلالات المتحورة بما فيها BA.5. بالإضافة إلى ذلك فقد تم توسيع نطاق الجرعات التنشيطية من اللقاح الأساسي أحادي التكافؤ لتشمل الأشخاص الذين يبلغ عمرهم 12 عاماً أو أكثر بناءً على نتائج التجارب السريرية للجرعات التنشيطية بين عمر 12 و 17 عاماً، ولذلك فقد تم أيضاً توسيع نطاق الجرعات التنشيطية من اللقاح ثنائي التكافؤ الخاص بسلسلة أوميكرون بنفس الشكل.

الاسم التجاري	سبايكفاكس TM للحقن العضلي (ثنائي التكافؤ: السلسلة الأصلية / سلسلة أوميكرون BA.1 أو السلسلة الأصلية / سلسلة أوميكرون BA.4-5)
الفعالية والتأثير	الوقاية من عدوى فيروس SARS-CoV-2
عدد الجرعات والفواصل الزمني بينها	مرة واحدة (بعد مرور ثلاثة أشهر أو أكثر على تلقي الجرعة السابقة) *حقن عضلي
الأشخاص الذين يمكن تطعيمهم	الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولية (الجرعة الأولى / الثانية) ① ممن يبلغون 65 عاماً فما فوق، ② ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 65 عاماً ممن يعانون من أمراض كامنة أو الذين رأى الطبيب بأنهم معرضون لخطر تفاقم المرض بشكل كبير، ③ الكوادر الطبية والعاملون في المرافق الطبية الخاصة بالمسنين وسوى ذلك
مقدار الجرعة	جرعة واحدة 0.5 مل (مرة واحدة)

- يمكن إعطاء هذا اللقاح بغض النظر عن نوع اللقاح المستخدم في الجرعات السابقة، إلا أنه لا يمكن استخدامه في الجرعة الأولى.
- إن تلقي هذا اللقاح لا يحول دون ظهور أعراض المرض بشكل تام، ولذلك يتوجب عليكم متابعة اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

### الأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم

لا يمكن تطعيم الأشخاص التالية بهذا اللقاح. إذا كنت تظن بأن أحد البنود التالية تنطبق عليك، فاحرص على إخبار الطبيب بذلك في الاستشارة السابقة للتطعيم.

- الأشخاص الذين يعانون من حمى واضحة (\*1)
  - الأشخاص المصابون بأمراض حادة خطيرة
  - الأشخاص الذين يعانون من سوابق فرط الحساسية الشديدة (\*2) تجاه مكونات هذا اللقاح
  - الأشخاص الذين يعانون من حالات أخرى بخلاف ما سبق تجعل تلقي اللقاح غير مناسب لهم
  - (\*1) الحمى الواضحة تشير عادة إلى درجة حرارة  $37.5^{\circ}\text{C}$  أو أعلى. إلا أن الأمر لا يقتصر على ذلك إذا تم تشخيص الحالة على أنها حمى بالمقارنة بدرجة حرارة الجسم الطبيعية، حتى لو كانت درجة الحرارة أقل من  $37.5^{\circ}\text{C}$ .
  - (\*2) الحساسية المفرطة أو الأعراض المتعددة التي تشير إليها مثل أعراض التهاب الجلد والأغشية المخاطية المختلفة أو الصفير عند التنفس أو ضيق النفس أو تسارع ضربات القلب أو انخفاض ضغط الدم، إلى آخره.
- لا يمكن لمن ظهرت عليهم هذه الأعراض بعد الجرعات السابقة أن يتلقوا الجرعة التنشيطية من اللقاح الذي يتضمن نفس المكونات.

### الأشخاص الذين يتوجب عليهم الحذر عند التطعيم

على الأشخاص الذين تنطبق عليهم الأمور التالية أن يتوخوا الحذر عند تلقي التطعيم. إذا كنت تظن بأن أحد البنود التالية تنطبق عليك، فاحرص على إخبار الطبيب بذلك في الاستشارة السابقة للتطعيم.

- الأشخاص الذين يخضعون لعلاج مضاد لتخثر الدم، والأشخاص الذين يعانون من نقص صفيحات الدم أو الاعتلال الخثري
- الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بنقص المناعة في الماضي، والأشخاص الذين لديهم أقارب يعانون من نقص المناعة الخلقي
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض أساسية أو مزمنة مثل أمراض القلب أو الكلى أو الكبد أو اضطرابات الدم أو اضطرابات النمو
- الأشخاص الذين أدى تطعيمهم في الماضي إلى ظهور أعراض حساسية مثل الحمى أو الطفح الجلدي الشامل في غضون يومين من التطعيم
- الأشخاص الذين أصيبوا بتشنجات في الماضي
- الأشخاص الذين قد يعانون من حساسية تجاه مكونات هذا اللقاح

(يُتبع على الوجه الخلفي)

على الحوامل والنساء اللاتي يحتمل أن يكن حوامل والمرضعات الحرس على إخبار الطبيب بذلك في الاستشارة السابقة للتطعيم. ولكن في حالة تعذر استشارة طبيب النسائية والتوليد فإن التطعيم يكون ممكناً إذا رأى طبيب الفحص الطبي المسبق إمكانية ذلك.

على الأشخاص الذين سبق لهم التعرض لحساسية مفرطة أو تحسس من الدواء في الماضي الحرس على إخبار الطبيب بذلك في الاستشارة السابقة للتطعيم.

#### الاحتياطات اللازمة بعد التطعيم

- بعد تلقي التطعيم بهذا اللقاح، يرجى الانتظار في مركز التطعيم لمدة 15 دقيقة (30 دقيقة للأشخاص الذين سبق لهم التعرض لأعراض حساسية شديدة بما فيها الحساسية المفرطة والأشخاص الذين سبق لهم الشعور بالتوعك أو الإصابة بالإغماء) وإعلام الطبيب على الفور عند الشعور بأي توعك. (هذا الأمر يسمح بالاستجابة للأعراض الجانبية المفاجئة).
- حافظ على نظافة منطقة الحقن ولا تفركها إذا قمت بالاستحمام في يوم التطعيم. وإذا شعرت بتوعك بعد التطعيم فإنه يرجى عدم إجهاد نفسك والامتناع عن الاستحمام وما إلى ذلك ومراقبة الوضع.
- يمكنك متابعة حياتك بشكل طبيعي، ولكن يرجى الامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة أو الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

#### الأعراض الجانبية

- تشمل الأعراض الجانبية الرئيسية على ألم في موقع الحقن والصداع وآلام المفاصل والعضلات والإرهاق والقشعريرة والحمى وما إلى ذلك. تشمل الأعراض الجانبية الخطيرة نادرة الحدوث على الصددمات وفرط الحساسية. ونظراً لأن هذا اللقاح هو نوع جديد من اللقاحات، فإنه من المحتمل ظهور أعراض لم يتم تأكيدها بعد. إذا لاحظت أية أعراض مقلقة بعد التطعيم، فيرجى استشارة الطبيب المسؤول عن التطعيم أو طبيب الأسرة.
- تم الإبلاغ عن حالات يشتبه فيها بالإصابة بالتهاب في عضلة القلب والتامور بعد التطعيم وذلك في بعض الحالات النادرة. إذا عانيت من أعراض مثل آلام الصدر أو الخفقان أو ضيق التنفس أو التورم في غضون بضعة أيام من التطعيم، فيرجى استشارة إحدى المؤسسات الطبية على الفور.
- تم الإبلاغ عن الإصابة بمتلازمة غيلان باريه بعد التطعيم بلقاح الرنا المرسل في بعض الحالات النادرة. إذا ظهرت أعراض مثل ضعف الأطراف أو التتميل بعد التطعيم، فيرجى استشارة إحدى المؤسسات الطبية على الفور.

#### حول نظام إغاثة الأضرار الصحية الناتجة عن التطعيم الوقائي

قد يتسبب التطعيم الوقائي في وقوع مشاكل صحية (الإصابة بمرض أو التعرض لإعاقة). تم تأسيس نظام الإغاثة لأنه لا يمكن الحد من هذه المشاكل، على الرغم من شدة ندرة حدوثها. إذا تعرضت لأضرار صحية نتيجة التطعيم الوقائي بلقاح فيروس كورونا المستجد، فيمكنك تلقي المساعدة (كالنفقات الطبية ومعاش الإعاقة وإلى آخره) بناءً على قانون التطعيم الوقائي. فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لتقديم الطلب، يرجى استشارة البلدية التي تضم شهادة إقامتك.

#### حول عدوى فيروس كورونا المستجد

الإصابة بعدوى فيروس SARS-CoV-2 تؤدي إلى ظهور أعراض مشابهة لأعراض الزكام كالحُمى والسعال. يشفى العديد من الناس بعد ظهور أعراض خفيفة فقط، ولكن زيادة شدة المرض تؤدي إلى تفاقم أعراض الالتهاب الرئوي كضيق التنفس كما قد تؤدي إلى الوفاة.

#### خصائص لقاح فيروس كورونا المستجد (لقاح ثنائي التكافؤ خاص بسلسلة أوميكرون (BA.1/BA.4-5) من صنع شركة مودرنا) الذي سيتم تطعيمك به هذه المرة

هذا الدواء هو لقاح حمض نووي ريبوي مرسل (رنا مرسل) يضم غشاءً دهنيًا يحتوي على الرنا المرسل الذي يشكل البروتين الشوكي (البروتين الذي يحتاجه الفيروس ليفزو الخلايا البشرية) في فيروس SARS-CoV-2 (السلسلة الأساسية (السلسلة الأصلية) وسلسلة أوميكرون BA.1 أو BA.4-5). عندما يدخل الرنا المرسل إلى الخلايا البشرية بعد التطعيم بهذا اللقاح، يتم إنتاج البروتين الشوكي الخاص بالفيروس داخل الخلايا استناداً إلى الرنا المرسل ويتم تحفيز إنتاج الأجسام المضادة المعدلة والاستجابة المناعية الخلوية ضد البروتين الشوكي، وبهذا يعتبر بأنه يقي من الإصابة بعدوى فيروس SARS-CoV-2.

يحتوي هذا الدواء على المكونات التالية.

إيلاسوميران (الرنا المرسل الذي يقوم بترميز كامل البروتين الشوكي في السلسلة الأساسية (السلسلة الأصلية))	المكونات الفعالة
إيميلاسوميران أو دافيسوميران (كلاهما رنا مرسل يشفر الجسم الكامل لبروتين سبائك في سلسلة أوميكرون BA.1 أو BA.4-5)	
SM-102: هيبتابديكان-9-إيل-8-(2-هيدروكسيثيل) (6-أو إكس-أو-6-أنديسيلوكسي) هيكسيل) أمينو) إستر أمينو أوكتانوت	المواد المضافة
كولسترول	
DSPC: 2.1-ديستيريول-سن-جليسرو-3-فسفوكولين	
2.1-ديميرستول-ر-ك-جليسرو-3-ميثوكسي بولي إيثيلين جلايكول-2000 (PEG2000 DMG)	
تروميثامول	
هيدروكلوريد التروميثامول	
حمض الخليك	
أسيتات الصوديوم ثلاثي الهيدرات	
السكروز المنقى	

لمزيد من المعلومات حول لقاح فيروس كورونا المستجد، يرجى زيارة موقع وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية  
لقاح كورونا

بحث



يرجى استشارة بلديتك المحلية إذا لم تتمكن من زيارة موقع الوزارة.