


U/mL



3回目接種前、接種1か月後、接種3か月後の抗スパイクタンパク質抗体価を測定した151人の集計。抗ヌクレオカプシドタンパク質抗体の値にかかわらず集計していません。

	人数	接種前	N抗体	1か月後	N抗体	3か月後	N抗体	6か月後	N抗体
全体	151	1,275 (1,067 - 1,524)	14	20,168 (18,107 - 22,464)	17	10,269 (9,080 - 11,613)	18	8,286 (6,979 - 9,838)	40
20歳代	10	2,017 (818 - 4,973)	1	19,003 (10,384 - 34,773)	1	8,374 (4,127 - 16,990)	1	6,527 (2,492 - 17,100)	3
30歳代	40	1,437 (1,071 - 1,927)	4	20,168 (16,430 - 24,757)	4	11,642 (9,208 - 14,720)	5	12,861 (9,071 - 18,235)	17
40歳代	65	1,076 (811 - 1,428)	5	19,656 (16,758 - 23,055)	7	9,601 (8,079 - 11,408)	7	6,989 (5,465 - 8,936)	13
50歳以上	36	1,335 (894 - 1,994)	4	21,479 (16,820 - 27,427)	5	10,674 (7,991 - 14,258)	5	7,389 (5,282 - 10,336)	7
抗N抗体陽性者割合			9.3%		11.3%		11.9%		26.5%

N抗体：抗N抗体陽性者数(人)
 抗S抗体価(U/mL)

