

■ 調査概要

■ 調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目

II. 症状別


19-2.症状_性別（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=1495 男性:821 女性:671 その他:3

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=551 男性:291 女性:260 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=1395 男性:767 女性:625 その他:3


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=514 男性:281 女性:233 その他:0


19-3.症状_性別（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=856 男性:461 女性:394 その他:1


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=834 男性:434 女性:400 その他:0


19-4.症状_性別（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=304 男性:169 女性:135 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=313 男性:173 女性:139 その他:1


19-5.症状_性別（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=55 男性:39 女性:16 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=54 男性:38 女性:16 その他:0

19-6.症状_性別（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-7.症状_性別：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=1 男性:0 女性:1 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=1 男性:0 女性:1 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=1 男性:0 女性:1 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=1 男性:0 女性:1 その他:0

19-8.症状_性別：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-9.症状_性別：小児（5~11歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=49 男性:23 女性:26 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=8 男性:4 女性:4 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=50 男性:22 女性:28 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=7 男性:3 女性:4 その他:0

19-10.症状_性別：小児（5~11歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-11.症状_性別：10代（12～19歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=222 男性:111 女性:109 その他:2

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=62 男性:27 女性:35 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=190 男性:93 女性:95 その他:2


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=63 男性:29 女性:34 その他:0


19-12.症状_性別：10代（12～19歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=34 男性:22 女性:11 その他:1


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=24 男性:16 女性:8 その他:0

19-13.症状_性別：10代（12～19歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-14.症状_性別：10代（12～19歳）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-15.症状_性別：10代（12～19歳）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-16.症状_性別：20代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=268 男性:155 女性:112 その他:1

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=105 男性:62 女性:43 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=237 男性:143 女性:93 その他:1


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=91 男性:56 女性:35 その他:0


19-17.症状_性別：20代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=120 男性:64 女性:56 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=106 男性:49 女性:57 その他:0


19-18.症状_性別：20代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=16 男性:9 女性:7 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=13 男性:6 女性:7 その他:0


19-19.症状_性別：20代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0

19-20.症状_性別：20代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-21.症状_性別：30代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=353 男性:180 女性:173 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=150 男性:67 女性:83 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=333 男性:164 女性:169 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=133 男性:62 女性:71 その他:0


19-22.症状_性別：30代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=198 男性:102 女性:96 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=188 男性:97 女性:91 その他:0


19-23.症状_性別：30代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=40 男性:24 女性:16 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=36 男性:22 女性:14 その他:0


19-24.症状_性別：30代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=7 男性:4 女性:3 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=5 男性:3 女性:2 その他:0

19-25.症状_性別：30代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-26.症状_性別：40代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=322 男性:187 女性:135 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=119 男性:66 女性:53 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=308 男性:184 女性:124 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=111 男性:64 女性:47 その他:0


19-27.症状_性別：40代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=267 男性:148 女性:119 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=267 男性:139 女性:128 その他:0


19-28.症状_性別：40代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=61 男性:24 女性:37 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=66 男性:28 女性:38 その他:0


19-29.症状_性別：40代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=8 男性:5 女性:3 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=9 男性:5 女性:4 その他:0

19-30.症状_性別：40代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-31.症状_性別：50代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=210 男性:119 女性:91 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=78 男性:47 女性:31 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=207 男性:116 女性:91 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=81 男性:49 女性:32 その他:0


19-32.症状_性別：50代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=202 男性:108 女性:94 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=218 男性:116 女性:102 その他:0


19-33.症状_性別：50代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=68 男性:34 女性:34 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=76 男性:38 女性:37 その他:1


19-34.症状_性別：50代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=11 男性:9 女性:2 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=12 男性:9 女性:3 その他:0


19-35.症状_性別：50代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=4 男性:1 女性:3 その他:0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=3 男性:1 女性:2 その他:0


19-36.症状_性別：60代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=63 男性:42 女性:21 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=28 男性:18 女性:10 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=64 男性:42 女性:22 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=27 男性:18 女性:9 その他:0


19-37.症状_性別：60代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=33 男性:17 女性:16 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=29 男性:16 女性:13 その他:0


19-38.症状_性別：60代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=104 男性:66 女性:38 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=107 男性:66 女性:41 その他:0


19-39.症状_性別：60代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=23 男性:17 女性:6 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=24 男性:18 女性:6 その他:0

19-40.症状_性別：60代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-41.症状_性別：70代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=5 男性:4 女性:1 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=3 男性:3 女性:0 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0

19-42.症状_性別：70代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-43.症状_性別：70代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=11 男性:9 女性:2 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=13 男性:11 女性:2 その他:0


19-44.症状_性別：70代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=4 男性:3 女性:1 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=3 男性:2 女性:1 その他:0

19-45.症状_性別：70代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-46.症状_性別：80代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-47.症状_性別：80代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-48.症状_性別：80代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-49.症状_性別：80代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-50.症状_性別：80代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-51.症状_メーカー別①（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体: N=1495 ファイザー社1価ワクチン(起源株): 1300 モデルナ社1価ワクチン(起源株): 136 アストラゼネカ: 2 武田(ノババックス): 56 その他: 1

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体: N=551 ファイザー社1価ワクチン(起源株): 487 モデルナ社1価ワクチン(起源株): 40 アストラゼネカ: 1 武田(ノババックス): 23 その他: 0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体: N=1395 ファイザー社1価ワクチン(起源株): 1219 モデルナ社1価ワクチン(起源株): 119 アストラゼネカ: 2 武田(ノババックス): 55 その他: 0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体: N=514 ファイザー社1価ワクチン(起源株): 453 モデルナ社1価ワクチン(起源株): 39 アストラゼネカ: 1 武田(ノババックス): 21 その他: 0


19-52.症状_メーカー別②（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体: N=1495 ファイザー社1価ワクチン(起源株): 1300 モデルナ社1価ワクチン(起源株): 136 アストラゼネカ: 2 武田(ノババックス): 56 その他: 1

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体: N=551 ファイザー社1価ワクチン(起源株): 487 モデルナ社1価ワクチン(起源株): 40 アストラゼネカ: 1 武田(ノババックス): 23 その他: 0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体: N=1395 ファイザー社1価ワクチン(起源株): 1219 モデルナ社1価ワクチン(起源株): 119 アストラゼネカ: 2 武田(ノババックス): 55 その他: 0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体: N=514 ファイザー社1価ワクチン(起源株): 453 モデルナ社1価ワクチン(起源株): 39 アストラゼネカ: 1 武田(ノババックス): 21 その他: 0

19-53.症状_メーカー別①（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-54.症状_メーカー別②（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-55.症状_メーカー別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=304 ファイザー社1価ワクチン(起源株):26 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):16 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):43 モデルナ社1価ワクチン(起源株):158 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):48 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):12 武田(ノババックス):1


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=313 ファイザー社1価ワクチン(起源株):26 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):20 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):42 モデルナ社1価ワクチン(起源株):163 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):51 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):9 武田(ノババックス):2


19-56.症状_メーカー別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=304 ファイザー社1価ワクチン(起源株):26 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):16 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):43 モデルナ社1価ワクチン(起源株):158 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):48 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):12 武田(ノババックス):1


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=313 ファイザー社1価ワクチン(起源株):26 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):20 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):42 モデルナ社1価ワクチン(起源株):163 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):51 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):9 武田(ノババックス):2

19-57.症状_メーカー別①（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



19-58.症状_メーカー別②（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5)
 ■ モデルナ社2価ワクチン (BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=55 ファイザー社2価ワクチン (BA.1):4 ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5):32 モデルナ社2価ワクチン (BA.1):11 モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5):8 武田(ノババックス):0

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5)
 ■ モデルナ社2価ワクチン (BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=54 ファイザー社2価ワクチン (BA.1):4 ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5):32 モデルナ社2価ワクチン (BA.1):10 モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5):8 武田(ノババックス):0

19-59.症状_メーカー別①（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



19-60.症状_メーカー別②（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=6 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):6 武田(ノババックス):0

接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）

■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=6 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):6 武田(ノババックス):0

19-61.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）

| 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|-------------------|----------------------|------|-------------|------------|----------|-----------|-------------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 95 | 46.3%(44人) | 42.1%(40人) | 1.1%(1人) | 8.4%(8人) | 46.3%(44人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 20 | 35%(7人) | 40%(8人) | 0%(0人) | 10%(2人) | 55%(11人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 262 | 67.9%(178人) | 42%(110人) | 1.5%(4人) | 9.5%(25人) | 62.2%(163人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 178 | 59.6%(106人) | 54.5%(97人) | 2.2%(4人) | 6.7%(12人) | 57.9%(103人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 68 | 7.4%(5人) | 32.4%(22人) | 2.9%(2人) | 10.3%(7人) | 33.8%(23人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 30 | 20%(6人) | 16.7%(5人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 20%(6人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0%(0人) | 0%(1人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0%(1人) | 0%(1人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(2人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0%(1人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0%(0人) | 0%(1人) | 0%(0人) | 0%(1人) | 0%(0人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0%(0人) | 0%(1人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |

19-62.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）

| 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|-------------------|----------------------|------|------------|-------------|----------|------------|------------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 95 | 18.9%(18人) | 32.6%(31人) | 2.1%(2人) | 11.6%(11人) | 12.6%(12人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 20 | 15%(3人) | 30%(6人) | 5%(1人) | 15%(3人) | 20%(4人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 262 | 19.5%(51人) | 48.1%(126人) | 2.7%(7人) | 9.2%(24人) | 10.7%(28人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 178 | 18%(32人) | 47.2%(84人) | 1.1%(2人) | 6.2%(11人) | 7.3%(13人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 68 | 13.2%(9人) | 16.2%(11人) | 1.5%(1人) | 4.4%(3人) | 10.3%(7人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 30 | 13.3%(4人) | 10%(3人) | 0%(0人) | 3.3%(1人) | 6.7%(2人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0%(0人) | 0%(1人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(1人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0%(0人) | 0%(1人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(1人) | 0%(1人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |

19-63.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種3回目）

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）

| 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|-------------------|----------------------|------|------------|----------|----------|-----------|------------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 95 | 0%(0人) | 1.1%(1人) | 1.1%(1人) | 8.4%(8人) | 9.5%(9人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 20 | 5%(1人) | 5%(1人) | 5%(1人) | 10%(2人) | 10%(2人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 262 | 0.4%(1人) | 0.8%(2人) | 2.3%(6人) | 9.5%(25人) | 14.5%(38人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 178 | 1.1%(2人) | 1.1%(2人) | 1.1%(2人) | 6.7%(12人) | 10.1%(18人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 68 | 0%(0人) | 0%(0人) | 2.9%(2人) | 10.3%(7人) | 5.9%(4人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 30 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0%(0人) | 0%(1人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(1人) | 0%(0人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(1人) |

19-64.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種3回目）

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）

| 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|-------------------|----------------------|------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 95 | 3.2%(3人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 9.5%(9人) | 4.2%(4人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 20 | 0%(0人) | 5%(1人) | 0%(0人) | 10%(2人) | 5%(1人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 262 | 3.8%(10人) | 3.1%(8人) | 1.1%(3人) | 8%(21人) | 3.1%(8人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 178 | 1.7%(3人) | 3.4%(6人) | 0.6%(1人) | 3.9%(7人) | 6.2%(11人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 68 | 2.9%(2人) | 2.9%(2人) | 0%(0人) | 14.7%(10人) | 4.4%(3人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 30 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 6.7%(2人) | 0%(0人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(1人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(1人) | 0%(0人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(1人) |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |

19-65.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目ファイザー社1価ワクチン（起源株）

| 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|-------------------|----------------------|-------------------|------|------------|---------|-------|-------|-------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 8 | 37.5% | 37.5% | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 9 | 55.6% | 44.4% | 0.0% | 44.4% | 33.3% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 4 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-66.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目ファイザー社1価ワクチン（起源株）

| 接種1-2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|-------------------|----------------------|-------------------|------|---------|-------|------|-------|-------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 8 | 12.5% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 9 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 11.1% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 4 | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-67.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目モデルナ社1価ワクチン（起源株）

| 接種1-2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けいせき | 頭痛 |
|-------------------|----------------------|------------------|------|------------|---------|-------|-------|-------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 15 | 60.0% | 73.3% | 0.0% | 73.3% | 46.7% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 60 | 36.7% | 50.0% | 5.0% | 65.0% | 41.7% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 43 | 45.5% | 48.8% | 0.0% | 58.1% | 32.6% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-68.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目モデルナ社1価ワクチン（起源株）

| 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|-------------------|----------------------|------------------|------|---------|-------|------|-------|------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 15 | 26.7% | 26.7% | 0.0% | 6.7% | 6.7% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 60 | 6.7% | 26.7% | 0.0% | 11.7% | 1.7% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 43 | 4.7% | 18.6% | 0.0% | 2.3% | 4.7% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-69.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目武田（ノババックス）

| 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|-------------------|----------------------|------------|------|------------|---------|-------|--------|--------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-70.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目武田（ノババックス）

| 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|-------------------|----------------------|------------|------|---------|-------|------|--------|------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-71.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.1）

| 接種1-2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|-------------------|----------------------|--------------------|------|------------|---------|-------|-------|--------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 6 | 83.3% | 66.7% | 0.0% | 66.7% | 66.7% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 8 | 62.5% | 50.0% | 12.5% | 37.5% | 50.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-72.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.1）

| 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|-------------------|----------------------|--------------------|------|---------|-------|------|-------|-------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 6 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 8 | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-73.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）

| 接種1-2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|-------------------|----------------------|----------------------|------|------------|---------|-------|--------|--------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 6 | 16.7% | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 13 | 69.2% | 46.2% | 0.0% | 76.9% | 76.9% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 15 | 13.3% | 26.7% | 0.0% | 60.0% | 33.3% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-74.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）

| 接種1-2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|-------------------|----------------------|----------------------|------|---------|--------|------|-------|--------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 6 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 13 | 15.4% | 53.8% | 0.0% | 15.4% | 30.8% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 15 | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 6.7% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-75.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.1）

| 接種1-2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|-------------------|----------------------|-------------------|------|------------|---------|-------|-------|-------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 16 | 62.5% | 81.3% | 6.3% | 81.3% | 56.3% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 4 | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 50.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 21 | 52.4% | 38.1% | 4.8% | 81.0% | 57.1% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-76.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.1）

| 接種1-2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|-------------------|----------------------|-------------------|------|---------|-------|------|------|-------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 16 | 12.5% | 43.8% | 0.0% | 6.3% | 18.8% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 21 | 4.8% | 42.9% | 0.0% | 4.8% | 23.8% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-77.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）

| 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|-------------------|----------------------|---------------------|------|------------|---------|-------|--------|--------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 50.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 3 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-78.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）

| 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|-------------------|----------------------|---------------------|------|---------|-------|------|------|------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 3 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-79.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目ファイザー社1価ワクチン（起源株）

| 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|-------------------|----------------------|-------------------|------|------------|---------|-------|-------|-------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 9 | 11.1% | 11.1% | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-80.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目ファイザー社1価ワクチン（起源株）

| 接種1-2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|-------------------|----------------------|-------------------|------|---------|-------|------|-------|------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 8 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-81.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目モデルナ社1価ワクチン（起源株）

| 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|-------------------|----------------------|------------------|------|------------|---------|-------|------|------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 60 | 1.7% | 0.0% | 1.7% | 8.3% | 8.3% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 43 | 2.3% | 2.3% | 0.0% | 4.7% | 2.3% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-82.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目モデルナ社1価ワクチン（起源株）

| 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|-------------------|----------------------|------------------|------|---------|-------|------|------|------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 6.7% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 60 | 1.7% | 1.7% | 0.0% | 5.0% | 1.7% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 43 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-83.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目武田（ノババックス）

| 接種1-2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|-------------------|----------------------|------------|------|------------|---------|-------|------|------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-84.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目武田（ノババックス）

| 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|-------------------|----------------------|------------|------|---------|-------|------|--------|------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-85.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.1）

| 接種1-2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|-------------------|----------------------|--------------------|------|------------|---------|-------|-------|-------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 16.7% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-86.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.1）

| 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|-------------------|----------------------|--------------------|------|---------|-------|------|-------|-------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 6 | 16.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-87.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）

| 接種1-2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|-------------------|----------------------|----------------------|------|------------|---------|-------|--------|--------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 23.1% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 15 | 0.0% | 6.7% | 0.0% | 13.3% | 6.7% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-88.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）

| 接種1-2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|-------------------|----------------------|----------------------|------|---------|--------|------|-------|-------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 13 | 15.4% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 23.1% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.3% | 6.7% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-89.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.1）

| 接種1-2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|-------------------|----------------------|-------------------|------|------------|---------|-------|------|-------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 16 | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 18.8% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 14.3% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-90.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.1）

| 接種1-2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|-------------------|----------------------|-------------------|------|---------|-------|-------|------|------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.3% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-91.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）

| 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|-------------------|----------------------|---------------------|------|------------|---------|-------|------|------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-92.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）

| 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|-------------------|----------------------|---------------------|------|---------|-------|------|------|------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-93.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）

| 接種4回目 | 接種5回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|-------------------|----------------------|------|------------|---------|-------|-------|-------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 10 | 20.0% | 60.0% | 0.0% | 50.0% | 30.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 4 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 16 | 12.5% | 25.0% | 0.0% | 43.8% | 18.8% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 8 | 12.5% | 62.5% | 0.0% | 50.0% | 12.5% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 4 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-94.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）

| 接種4回目 | 接種5回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|-------------------|----------------------|------|---------|-------|------|--------|-------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 10 | 20.0% | 10.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 16 | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 8 | 12.5% | 25.0% | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 4 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-95.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種5回目）

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）

| 接種4回目 | 接種5回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|-------------------|----------------------|------|------------|---------|-------|-------|-------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.3% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 4 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-96.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種5回目）

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）

| 接種4回目 | 接種5回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|-------------------|----------------------|------|---------|-------|------|-------|------|
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社1価ワクチン(起源株) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社1価ワクチン(起源株) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-97.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）

| 接種5回目 | 接種6回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|----------------------|----------------------|------|------------|---------|-------|--------|------|
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 3 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-98.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）

| 接種5回目 | 接種6回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|----------------------|----------------------|------|---------|--------|------|-------|------|
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

19-99.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種6回目）

接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）

| 接種5回目 | 接種6回目 | 接種人数 | 37.5℃以上の発熱 | 注射部位の腫れ | じんましん | けん怠感 | 頭痛 |
|----------------------|----------------------|------|------------|---------|-------|------|------|
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |


19-100.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種6回目）

接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）

| 接種5回目 | 接種6回目 | 接種人数 | リンパ節の腫れ | 関節の痛み | おう吐 | 下痢 | 胸の痛み |
|----------------------|----------------------|------|---------|-------|------|------|------|
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 武田(ノババックス) | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 武田(ノババックス) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |


19-101.症状_メーカー別①：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(起源株):1

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(起源株):1

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(起源株):1

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(起源株):1

19-102.症状_メーカー別②：乳幼児（6ヶ月～4歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(起源株):1

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(起源株):1

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(起源株):1

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株)




全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(起源株):1

19-103.症状_メーカー別①：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-104.症状_メーカー別②：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-105.症状_メーカー別①：小児（5~11歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=49 ファイザー社1価ワクチン(起源株):49

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=8 ファイザー社1価ワクチン(起源株):8

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=50 ファイザー社1価ワクチン(起源株):50


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=7 ファイザー社1価ワクチン(起源株):7


19-106.症状_メーカー別②：小児（5~11歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=49 ファイザー社1価ワクチン(起源株):49

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=8 ファイザー社1価ワクチン(起源株):8

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=50 ファイザー社1価ワクチン(起源株):50


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=7 ファイザー社1価ワクチン(起源株):7

19-107.症状_メーカー別①：小児（5~11歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-108.症状_メーカー別②：小児（5~11歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-109.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=222 ファイザー社1価ワクチン(起源株):213 モデルナ社1価ワクチン(起源株):8 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:1

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=62 ファイザー社1価ワクチン(起源株):59 モデルナ社1価ワクチン(起源株):3 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=190 ファイザー社1価ワクチン(起源株):183 モデルナ社1価ワクチン(起源株):7 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=63 ファイザー社1価ワクチン(起源株):59 モデルナ社1価ワクチン(起源株):4 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0


19-110.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=222 ファイザー社1価ワクチン(起源株):213 モデルナ社1価ワクチン(起源株):8 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:1

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=62 ファイザー社1価ワクチン(起源株):59 モデルナ社1価ワクチン(起源株):3 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=190 ファイザー社1価ワクチン(起源株):183 モデルナ社1価ワクチン(起源株):7 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=63 ファイザー社1価ワクチン(起源株):59 モデルナ社1価ワクチン(起源株):4 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

19-111.症状_メーカー別① : 10代 (12~19歳) (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



19-112.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=34 ファイザー社1価ワクチン(起源株):22 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):10 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):2

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=24 ファイザー社1価ワクチン(起源株):19 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):3 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):2

19-113.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



19-114.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=3 ファイザー社1価ワクチン(起源株):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):1 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(起源株):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0

19-115.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



19-116.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

19-117.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



19-118.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0


19-119.症状_メーカー別①：20代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=268 ファイザー社1価ワクチン(起源株):233 モデルナ社1価ワクチン(起源株):31 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):3 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=105 ファイザー社1価ワクチン(起源株):92 モデルナ社1価ワクチン(起源株):13 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=237 ファイザー社1価ワクチン(起源株):207 モデルナ社1価ワクチン(起源株):25 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):4 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=91 ファイザー社1価ワクチン(起源株):78 モデルナ社1価ワクチン(起源株):13 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

19-120.症状_メーカー別②：20代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-121.症状_メーカー別①：20代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-122.症状_メーカー別②：20代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=120 ファイザー社1価ワクチン(起源株):15 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):1 モデルナ社1価ワクチン(起源株):99 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):5


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=106 ファイザー社1価ワクチン(起源株):12 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):1 モデルナ社1価ワクチン(起源株):88 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):5

19-123.症状_メーカー別① : 20代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




19-124.症状_メーカー別②：20代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=16 ファイザー社1価ワクチン(起源株):2 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):3 モデルナ社1価ワクチン(起源株):3 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):6 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=13 ファイザー社1価ワクチン(起源株):2 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):2 モデルナ社1価ワクチン(起源株):3 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):4 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0

19-125.症状_メーカー別① : 20代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



19-126.症状_メーカー別② : 20代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=1 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0

接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=1 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0

19-127.症状_メーカー別①：20代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



19-128.症状_メーカー別②：20代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0


19-129.症状_メーカー別① : 30代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=353 ファイザー社1価ワクチン(起源株):298 モデルナ社1価ワクチン(起源株):44 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):11 その他:0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=150 ファイザー社1価ワクチン(起源株):133 モデルナ社1価ワクチン(起源株):12 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):5 その他:0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=333 ファイザー社1価ワクチン(起源株):283 モデルナ社1価ワクチン(起源株):39 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):11 その他:0


接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=133 ファイザー社1価ワクチン(起源株):115 モデルナ社1価ワクチン(起源株):13 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):5 その他:0


19-130.症状_メーカー別② : 30代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=353 ファイザー社1価ワクチン(起源株):298 モデルナ社1価ワクチン(起源株):44 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):11 その他:0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=150 ファイザー社1価ワクチン(起源株):133 モデルナ社1価ワクチン(起源株):12 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):5 その他:0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=333 ファイザー社1価ワクチン(起源株):283 モデルナ社1価ワクチン(起源株):39 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):11 その他:0


接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=133 ファイザー社1価ワクチン(起源株):115 モデルナ社1価ワクチン(起源株):13 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):5 その他:0

19-131.症状_メーカー別① : 30代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



19-132.症状_メーカー別②：30代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=198 ファイザー社1価ワクチン(起源株):39 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):133 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):25

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=188 ファイザー社1価ワクチン(起源株):37 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):126 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):24

19-133.症状_メーカー別① : 30代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




19-134.症状_メーカー別②：30代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=40 ファイザー社1価ワクチン(起源株):3 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):4 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):13 モデルナ社1価ワクチン(起源株):7 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):11 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):2 武田(ノババックス):0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=36 ファイザー社1価ワクチン(起源株):2 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):5 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):11 モデルナ社1価ワクチン(起源株):6 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):11 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0


19-135.症状_メーカー別① : 30代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=7 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):4 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0

接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=5 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):3 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0

19-136.症状_メーカー別② : 30代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン (BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5) ■ 武田 (ノババックス)



全体:N=7 ファイザー社2価ワクチン (BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5):4 モデルナ社2価ワクチン (BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5):1 武田 (ノババックス):0

接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン (BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5) ■ 武田 (ノババックス)




全体:N=5 ファイザー社2価ワクチン (BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5):3 モデルナ社2価ワクチン (BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5):1 武田 (ノババックス):0

19-137.症状_メーカー別① : 30代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



19-138.症状_メーカー別② : 30代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン (BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5) ■ 武田 (ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社2価ワクチン (BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン (BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5):0 武田 (ノババックス):0

接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン (BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5) ■ 武田 (ノババックス)



全体:N=1 ファイザー社2価ワクチン (BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン (BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5):1 武田 (ノババックス):0


19-139.症状_メーカー別①：40代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=322 ファイザー社1価ワクチン(起源株):282 モデルナ社1価ワクチン(起源株):24 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):15 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=119 ファイザー社1価ワクチン(起源株):105 モデルナ社1価ワクチン(起源株):6 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):7 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=308 ファイザー社1価ワクチン(起源株):269 モデルナ社1価ワクチン(起源株):26 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):12 その他:0

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=111 ファイザー社1価ワクチン(起源株):101 モデルナ社1価ワクチン(起源株):4 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):5 その他:0

19-140.症状_メーカー別②：40代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)



全体:N=322 ファイザー社1価ワクチン(起源株):282 モデルナ社1価ワクチン(起源株):24 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):15 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)



全体:N=119 ファイザー社1価ワクチン(起源株):105 モデルナ社1価ワクチン(起源株):6 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):7 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)



全体:N=308 ファイザー社1価ワクチン(起源株):269 モデルナ社1価ワクチン(起源株):26 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):12 その他:0

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)




全体:N=111 ファイザー社1価ワクチン(起源株):101 モデルナ社1価ワクチン(起源株):4 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):5 その他:0

19-141.症状_メーカー別①：40代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



19-142.症状_メーカー別②：40代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=267 ファイザー社1価ワクチン(起源株):36 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):1 モデルナ社1価ワクチン(起源株):185 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):45

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=267 ファイザー社1価ワクチン(起源株):38 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):1 モデルナ社1価ワクチン(起源株):189 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):39

19-143.症状_メーカー別①：40代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-144.症状_メーカー別②：40代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=61 ファイザー社1価ワクチン(起源株):2 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):5 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):14 モデルナ社1価ワクチン(起源株):19 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):15 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):6 武田(ノババックス):0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=66 ファイザー社1価ワクチン(起源株):4 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):6 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):16 モデルナ社1価ワクチン(起源株):21 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):15 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):4 武田(ノババックス):0

19-145.症状_メーカー別①：40代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



19-146.症状_メーカー別②：40代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=8 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):3 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):3 武田(ノババックス):0

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=9 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):5 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):3 武田(ノババックス):0

19-147.症状_メーカー別①：40代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



19-148.症状_メーカー別②：40代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=1 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0

接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=1 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0

19-149.症状_メーカー別① : 50代 (接種1・2回目)


接種1回目1週間後 (接種日～7日目まで)




接種2回目1週間後 (接種日～7日目まで)



接種1回目2週間後 (8日目～14日目まで)




接種2回目2週間後 (8日目～14日目まで)




19-150.症状_メーカー別② : 50代 (接種1・2回目)


接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




19-151.症状_メーカー別① : 50代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



19-152.症状_メーカー別② : 50代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=202 ファイザー社1価ワクチン(起源株):26 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):138 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):36

接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=218 ファイザー社1価ワクチン(起源株):31 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):149 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):36

19-153.症状_メーカー別① : 50代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




19-154.症状_メーカー別② : 50代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=68 ファイザー社1価ワクチン(起源株):8 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):4 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):10 モデルナ社1価ワクチン(起源株):30 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):15 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0


接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=76 ファイザー社1価ワクチン(起源株):8 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):5 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):11 モデルナ社1価ワクチン(起源株):32 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):19 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0

19-155.症状_メーカー別① : 50代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



19-156.症状_メーカー別② : 50代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン (BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5) ■ 武田 (ノババックス)



全体: N=11 ファイザー社2価ワクチン (BA.1): 0 ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5): 5 モデルナ社2価ワクチン (BA.1): 4 モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5): 2 武田 (ノババックス): 0

接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン (BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5) ■ 武田 (ノババックス)




全体: N=12 ファイザー社2価ワクチン (BA.1): 0 ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5): 5 モデルナ社2価ワクチン (BA.1): 4 モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5): 3 武田 (ノババックス): 0

19-157.症状_メーカー別① : 50代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



19-158.症状_メーカー別② : 50代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン (BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5) ■ 武田 (ノババックス)



全体:N=4 ファイザー社2価ワクチン (BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン (BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5):4 武田 (ノババックス):0

接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン (BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5) ■ 武田 (ノババックス)



全体:N=3 ファイザー社2価ワクチン (BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン (BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5):3 武田 (ノババックス):0


19-159.症状_メーカー別①：60代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=63 ファイザー社1価ワクチン(起源株):44 モデルナ社1価ワクチン(起源株):4 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):15 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=28 ファイザー社1価ワクチン(起源株):18 モデルナ社1価ワクチン(起源株):2 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):8 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=64 ファイザー社1価ワクチン(起源株):45 モデルナ社1価ワクチン(起源株):5 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):14 その他:0

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=27 ファイザー社1価ワクチン(起源株):17 モデルナ社1価ワクチン(起源株):2 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):8 その他:0

19-160.症状_メーカー別② : 60代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)



全体:N=63 ファイザー社1価ワクチン(起源株):44 モデルナ社1価ワクチン(起源株):4 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):15 その他:0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)



全体:N=28 ファイザー社1価ワクチン(起源株):18 モデルナ社1価ワクチン(起源株):2 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):8 その他:0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)



全体:N=64 ファイザー社1価ワクチン(起源株):45 モデルナ社1価ワクチン(起源株):5 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):14 その他:0

接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)




全体:N=27 ファイザー社1価ワクチン(起源株):17 モデルナ社1価ワクチン(起源株):2 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):8 その他:0

19-161.症状_メーカー別①：60代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



19-162.症状_メーカー別② : 60代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=33 ファイザー社1価ワクチン(起源株):3 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):16 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):12

接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=29 ファイザー社1価ワクチン(起源株):5 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):12 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):10

19-163.症状_メーカー別①：60代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




19-164.症状_メーカー別②：60代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=104 ファイザー社1価ワクチン(起源株):9 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):2 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):2 モデルナ社1価ワクチン(起源株):89 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):1


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=107 ファイザー社1価ワクチン(起源株):9 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):3 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):2 モデルナ社1価ワクチン(起源株):89 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):2

19-165.症状_メーカー別①：60代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



19-166.症状_メーカー別② : 60代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=23 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):18 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):3 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0

接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=24 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):19 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):4 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

19-167.症状_メーカー別① : 60代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



19-168.症状_メーカー別②：60代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

19-169.症状_メーカー別① : 70代 (接種1・2回目)


接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




19-170.症状_メーカー別② : 70代 (接種1・2回目)


接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




19-171.症状_メーカー別① : 70代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



19-172.症状_メーカー別② : 70代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(起源株):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):1

接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(起源株):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):1

19-173.症状_メーカー別① : 70代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



19-174.症状_メーカー別② : 70代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=11 ファイザー社1価ワクチン(起源株):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):10 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=13 ファイザー社1価ワクチン(起源株):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):12 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

19-175.症状_メーカー別① : 70代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



19-176.症状_メーカー別② : 70代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=4 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):2 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=3 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):2 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

19-177.症状_メーカー別① : 70代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



19-178.症状_メーカー別② : 70代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン (BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5) ■ 武田 (ノババックス)



全体:N=1 ファイザー社2価ワクチン (BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン (BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5):1 武田 (ノババックス):0

接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン (BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5) ■ 武田 (ノババックス)




全体:N=1 ファイザー社2価ワクチン (BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン (BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5):1 武田 (ノババックス):0

19-179.症状_メーカー別① : 80代 (接種1・2回目)


接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



19-180.症状_メーカー別② : 80代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(起源株):2 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(起源株):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(起源株):2 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(起源株):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

19-181.症状_メーカー別① : 80代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



19-182.症状_メーカー別② : 80代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(起源株):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(起源株):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

19-183.症状_メーカー別① : 80代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




19-184.症状_メーカー別② : 80代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




19-185.症状_メーカー別① : 80代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



19-186.症状_メーカー別② : 80代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン (BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5) ■ 武田 (ノババックス)



全体:N=1 ファイザー社2価ワクチン (BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5):1 モデルナ社2価ワクチン (BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5):0 武田 (ノババックス):0

接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン (BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5) ■ 武田 (ノババックス)




全体:N=0 ファイザー社2価ワクチン (BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン (BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5):0 武田 (ノババックス):0

19-187.症状_メーカー別① : 80代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



19-188.症状_メーカー別②：80代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

19-189.症状別：発症日①（接種1・2回目）

接種1回目




接種2回目



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

19-190.症状別：発症日①（接種3回目）

接種3回目




接種3回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=680

* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

19-191.症状別：発症日①（接種4回目）

接種4回目



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

19-192.症状別：発症日①（接種5回目）

接種5回目



接種5回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=46

19-193.症状別：発症日①（接種6回目）


接種6回目




接種6回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=5

19-194.症状別：発症日②（接種1・2回目）

接種1回目



接種2回目



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。


19-195.症状別：発症日②（接種3回目）

接種3回目



接種3回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=680


19-196.症状別：発症日②（接種4回目）



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

19-197.症状別：発症日②（接種5回目）


接種5回目



接種5回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者): N=46

19-198.症状別：発症日②（接種6回目）


接種6回目



接種6回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=5


19-199.症状別：最も高い熱（37.5℃以上の発熱をした方のみ）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1495

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=551

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1395

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後アンケート回答者：N=514

* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


19-200.症状別：最も高い熱（37.5℃以上の発熱をした方のみ）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種3回目1週間後アンケート回答者：N=856


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種3回目2週間後アンケート回答者：N=834


19-201.症状別：最も高い熱（37.5℃以上の発熱をした方のみ）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種4回目1週間後アンケート回答者: N=304


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種4回目2週間後アンケート回答者: N=313


19-202.症状別：最も高い熱（37.5℃以上の発熱をした方のみ）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種5回目1週間後アンケート回答者：N=55


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種5回目2週間後アンケート回答者：N=54


19-203.症状別：最も高い熱（37.5℃以上の発熱をした方のみ）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種6回目1週間後アンケート回答者：N=6

接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種6回目2週間後アンケート回答者：N=6

19-204.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目



接種1回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=1157

接種2回目



接種2回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=478

* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみにについて集計の上、頻度を算出している。


* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

19-205.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種3回目）



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。
* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

19-206.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種4回目）



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

19-207.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種5回目）



接種5回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=46

* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。
* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

19-208.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種6回目）




接種6回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=5

* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


19-209.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1495

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=551

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1395


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種2回目2週間後アンケート回答者：N=514


19-210.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種3回目1週間後アンケート回答者：N=856


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種3回目2週間後アンケート回答者：N=834


19-211.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種4回目1週間後アンケート回答者：N=304


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種4回目2週間後アンケート回答者：N=313


19-212.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種5回目1週間後アンケート回答者：N=55


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種5回目2週間後アンケート回答者：N=54


19-213.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種6回目1週間後アンケート回答者：N=6


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種6回目2週間後アンケート回答者：N=6


19-214.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1495

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=551

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1395


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種2回目2週間後アンケート回答者：N=514


19-215.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種3回目1週間後アンケート回答者：N=856


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種3回目2週間後アンケート回答者：N=834


19-216.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種4回目1週間後アンケート回答者：N=304


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種4回目2週間後アンケート回答者：N=313

19-217.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種5回目1週間後アンケート回答者：N=55

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種5回目2週間後アンケート回答者：N=54


19-218.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種6回目1週間後アンケート回答者：N=6


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種6回目2週間後アンケート回答者：N=6


19-219.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1495

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=551

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1395


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種2回目2週間後アンケート回答者：N=514


19-220.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種3回目1週間後アンケート回答者：N=856


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種3回目2週間後アンケート回答者：N=834


19-221.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種4回目1週間後アンケート回答者：N=304


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種4回目2週間後アンケート回答者：N=313

19-222.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種5回目1週間後アンケート回答者：N=55

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種5回目2週間後アンケート回答者：N=54

19-223.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種6回目1週間後アンケート回答者：N=6


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種6回目2週間後アンケート回答者：N=6


19-224.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1495

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=551

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1395

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種2回目2週間後アンケート回答者：N=514


* 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能

* 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。

* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


19-225.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種3回目1週間後アンケート回答者：N=856

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種3回目2週間後アンケート回答者：N=834

- * 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能
- * 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。
- * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


19-226.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種4回目1週間後アンケート回答者：N=304

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種4回目2週間後アンケート回答者：N=313

- * 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能
- * 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。
- * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

19-227.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種5回目1週間後アンケート回答者：N=55

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）

該当者なし

接種5回目2週間後アンケート回答者：N=54

- * 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能
- * 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。
- * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


19-228.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）

該当者なし

接種6回目1週間後アンケート回答者：N=6

接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種6回目2週間後アンケート回答者：N=6

- * 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能
- * 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。
- * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

19-229.症状別：受診状況（接種1・2回目）


接種1回目



| | | |
|------|--------|-------|
| 接種当日 | 2人 | 0.1% |
| 接種翌日 | 2人 | 0.1% |
| 3日目 | 1人 | 0.1% |
| 4日目 | 4人 | 0.3% |
| 5日目 | 0人 | 0.0% |
| 6日目 | 3人 | 0.2% |
| 7日目 | 3人 | 0.2% |
| 8日目 | 3人 | 0.2% |
| 9日目 | 7人 | 0.5% |
| 10日目 | 4人 | 0.3% |
| 11日目 | 1人 | 0.1% |
| 12日目 | 3人 | 0.2% |
| 13日目 | 9人 | 0.6% |
| 14日目 | 4人 | 0.3% |
| 未受診 | 1,349人 | 96.7% |

接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1395

接種2回目




| | | |
|------|------|-------|
| 接種当日 | 0人 | 0.0% |
| 接種翌日 | 0人 | 0.0% |
| 3日目 | 1人 | 0.2% |
| 4日目 | 0人 | 0.0% |
| 5日目 | 2人 | 0.4% |
| 6日目 | 1人 | 0.2% |
| 7日目 | 1人 | 0.2% |
| 8日目 | 1人 | 0.2% |
| 9日目 | 0人 | 0.0% |
| 10日目 | 0人 | 0.0% |
| 11日目 | 0人 | 0.0% |
| 12日目 | 1人 | 0.2% |
| 13日目 | 1人 | 0.2% |
| 14日目 | 1人 | 0.2% |
| 未受診 | 505人 | 98.2% |

接種2回目2週間後アンケート回答者：N=514

19-230.症状別：受診状況（接種3回目）

接種3回目




| | | |
|------|------|-------|
| 接種当日 | 0人 | 0.0% |
| 接種翌日 | 1人 | 0.1% |
| 3日目 | 2人 | 0.2% |
| 4日目 | 0人 | 0.0% |
| 5日目 | 2人 | 0.2% |
| 6日目 | 1人 | 0.1% |
| 7日目 | 1人 | 0.1% |
| 8日目 | 2人 | 0.2% |
| 9日目 | 1人 | 0.1% |
| 10日目 | 2人 | 0.2% |
| 11日目 | 2人 | 0.2% |
| 12日目 | 2人 | 0.2% |
| 13日目 | 0人 | 0.0% |
| 14日目 | 0人 | 0.0% |
| 未受診 | 818人 | 98.1% |

接種3回目2週間後アンケート回答者：N=834

19-231.症状別：受診状況（接種4回目）

接種4回目



未受診(304人)
97.1%


11日目(3人)
1.0%

| | | |
|------|------|-------|
| 接種当日 | 0人 | 0.0% |
| 接種翌日 | 0人 | 0.0% |
| 3日目 | 1人 | 0.3% |
| 4日目 | 0人 | 0.0% |
| 5日目 | 0人 | 0.0% |
| 6日目 | 0人 | 0.0% |
| 7日目 | 0人 | 0.0% |
| 8日目 | 1人 | 0.3% |
| 9日目 | 0人 | 0.0% |
| 10日目 | 0人 | 0.0% |
| 11日目 | 3人 | 1.0% |
| 12日目 | 1人 | 0.3% |
| 13日目 | 0人 | 0.0% |
| 14日目 | 3人 | 1.0% |
| 未受診 | 304人 | 97.1% |

接種4回目2週間後アンケート回答者：N=313

19-232.症状別：受診状況（接種5回目）

接種5回目




| | | |
|------|-----|-------|
| 接種当日 | 1人 | 1.9% |
| 接種翌日 | 0人 | 0.0% |
| 3日目 | 0人 | 0.0% |
| 4日目 | 0人 | 0.0% |
| 5日目 | 0人 | 0.0% |
| 6日目 | 0人 | 0.0% |
| 7日目 | 0人 | 0.0% |
| 8日目 | 0人 | 0.0% |
| 9日目 | 0人 | 0.0% |
| 10日目 | 0人 | 0.0% |
| 11日目 | 0人 | 0.0% |
| 12日目 | 0人 | 0.0% |
| 13日目 | 0人 | 0.0% |
| 14日目 | 0人 | 0.0% |
| 未受診 | 53人 | 98.1% |

接種5回目2週間後アンケート回答者：N=54

19-233.症状別：受診状況（接種6回目）

接種6回目



| | | |
|------|----|--------|
| 接種当日 | 0人 | 0.0% |
| 接種翌日 | 0人 | 0.0% |
| 3日目 | 0人 | 0.0% |
| 4日目 | 0人 | 0.0% |
| 5日目 | 0人 | 0.0% |
| 6日目 | 0人 | 0.0% |
| 7日目 | 0人 | 0.0% |
| 8日目 | 0人 | 0.0% |
| 9日目 | 0人 | 0.0% |
| 10日目 | 0人 | 0.0% |
| 11日目 | 0人 | 0.0% |
| 12日目 | 0人 | 0.0% |
| 13日目 | 0人 | 0.0% |
| 14日目 | 0人 | 0.0% |
| 未受診 | 6人 | 100.0% |

接種6回目2週間後アンケート回答者：N=6

19-234.症状別：診断結果①（接種1回目）

診断結果

| | |
|--|----|
| 風邪 | 6人 |
| うつ病 | 2人 |
| 膀胱炎 | 1人 |
| 喘息 | 1人 |
| 腕の筋肉痛 | 1人 |
| 腹痛で受診。腸の動きが悪くなってる。すぐ治る | 1人 |
| 腹痛 | 1人 |
| 不正脈、頻脈、最低血圧105、最高血圧155 | 1人 |
| 病名なし、問題ないと診断 | 1人 |
| 鼻骨折 | 1人 |
| 半身痺れはワクチン後遺症 | 1人 |
| 特になし。ワクチンの刺激と考えられる。 | 1人 |
| 頭痛 | 1人 |
| 潰瘍性大腸炎の定期検診でした。 | 1人 |
| 椎間板ヘルニア | 1人 |
| 虫歯 | 1人 |
| 体調変化 | 1人 |
| 足の痛みがあり、整形外科を受診。コロナールを処方され、様子を見るようにと。病名は告げられず。 | 1人 |
| 整形受診してください。 | 1人 |
| 睡眠不足や過度のストレスにより、腕の痛みや息苦しさの増加。 | 1人 |

19-235.症状別：診断結果②（接種1回目）

診断結果

| | |
|------------------------------|--------|
| 腎結石の疑いだったが何もなかった | 1人 |
| 診断名は分かりませんが、口の中全体に口内炎が出来ました。 | 1人 |
| 診断なし | 1人 |
| 食道がん | 1人 |
| 痔 | 1人 |
| 歯肉の炎症 | 1人 |
| 腰痛 | 1人 |
| 喉が少し赤い | 1人 |
| 巻爪 | 1人 |
| 夏風邪 | 1人 |
| 咽頭炎 | 1人 |
| 胃腸炎 | 1人 |
| 異常なし 定期受診のため | 1人 |
| てんかんの定期検診 | 1人 |
| ただの勘違い | 1人 |
| ストレス性の胃炎 | 1人 |
| コロナ陽性でした | 1人 |
| アレルギー定期 | 1人 |
| ありません | 1人 |
| b型肝炎の検査の為 | 1人 |
| 未受診 | 1,349人 |

接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1395

19-236.症状別：診断結果（接種2回目）

診断結果

| | |
|------|------|
| 風邪 | 3人 |
| 胃腸炎 | 2人 |
| 扁桃腺炎 | 1人 |
| 不明 | 1人 |
| 咳喘息 | 1人 |
| 咳風邪 | 1人 |
| 未受診 | 505人 |

19-237.症状別：診断結果（接種3回目）

診断結果

| | |
|--|------|
| 蕁麻疹 | 2人 |
| 副反応や寒暖差による体調不良 | 1人 |
| 副作用に因る偏頭痛 | 1人 |
| 循環器内科：胸の圧迫感により受診。異常なし。泌尿器科：排尿時の痛みと残尿感により受診。膀胱炎の診断。 | 1人 |
| 検査中のためまだわかりません | 1人 |
| 健診が17日にあり、血液マーカー検査で炎症反応がでて、泌尿器科のかかりつけ医を予約受診待ち | 1人 |
| 緊張型頭痛 | 1人 |
| 筋肉痛 | 1人 |
| 気管支炎 | 1人 |
| 顔のかぶれ 腫れ | 1人 |
| 胃炎 | 1人 |
| ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌) | 1人 |
| なし | 1人 |
| コロナウイルス陽性 | 1人 |
| コリン性蕁麻疹 | 1人 |
| 未受診 | 818人 |

19-238.症状別：診断結果（接種4回目）

診断結果

| | |
|-------------------|------|
| 膀胱炎 | 2人 |
| 不明 | 1人 |
| 検査をしてもらいましたがわからない | 1人 |
| 経過観察 | 1人 |
| 群発頭痛 | 1人 |
| 一過性全健忘症 | 1人 |
| ストレス？ 聞くのを忘れた | 1人 |
| コロナ感染 | 1人 |
| 未受診 | 304人 |

19-239.症状別：診断結果（接種5回目）

診断結果

| | |
|-----|-----|
| 倦怠感 | 1人 |
| 未受診 | 53人 |

19-240.症状別：診断結果（接種6回目）

診断結果

| | |
|-----|----|
| 未受診 | 6人 |
|-----|----|

19-241.症状別：入院日（接種1・2回目）

接種1回目

| 入院日 | 人数 | 割合 |
|------|----|------|
| 接種当日 | 0 | 0.0% |
| 接種翌日 | 0 | 0.0% |
| 3日目 | 0 | 0.0% |
| 4日目 | 0 | 0.0% |
| 5日目 | 0 | 0.0% |
| 6日目 | 0 | 0.0% |
| 7日目 | 0 | 0.0% |
| 8日目 | 0 | 0.0% |
| 9日目 | 0 | 0.0% |
| 10日目 | 0 | 0.0% |
| 11日目 | 0 | 0.0% |
| 12日目 | 0 | 0.0% |
| 13日目 | 0 | 0.0% |
| 14日目 | 0 | 0.0% |

接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1395

接種2回目

| 入院日 | 人数 | 割合 |
|------|----|------|
| 接種当日 | 0 | 0.0% |
| 接種翌日 | 0 | 0.0% |
| 3日目 | 0 | 0.0% |
| 4日目 | 0 | 0.0% |
| 5日目 | 0 | 0.0% |
| 6日目 | 0 | 0.0% |
| 7日目 | 0 | 0.0% |
| 8日目 | 0 | 0.0% |
| 9日目 | 0 | 0.0% |
| 10日目 | 0 | 0.0% |
| 11日目 | 0 | 0.0% |
| 12日目 | 0 | 0.0% |
| 13日目 | 0 | 0.0% |
| 14日目 | 0 | 0.0% |

接種2回目2週間後アンケート回答者：N=514

19-242.症状別：入院日（接種3回目）

接種3回目

| 入院日 | 人数 | 割合 |
|------|----|------|
| 接種当日 | 0 | 0.0% |
| 接種翌日 | 0 | 0.0% |
| 3日目 | 0 | 0.0% |
| 4日目 | 0 | 0.0% |
| 5日目 | 0 | 0.0% |
| 6日目 | 0 | 0.0% |
| 7日目 | 0 | 0.0% |
| 8日目 | 0 | 0.0% |
| 9日目 | 0 | 0.0% |
| 10日目 | 0 | 0.0% |
| 11日目 | 0 | 0.0% |
| 12日目 | 0 | 0.0% |
| 13日目 | 0 | 0.0% |
| 14日目 | 0 | 0.0% |

接種3回目2週間後アンケート回答者:N=834

19-243.症状別：入院日（接種4回目）

接種4回目

| 入院日 | 人数 | 割合 |
|------|----|------|
| 接種当日 | 0 | 0.0% |
| 接種翌日 | 0 | 0.0% |
| 3日目 | 0 | 0.0% |
| 4日目 | 0 | 0.0% |
| 5日目 | 0 | 0.0% |
| 6日目 | 0 | 0.0% |
| 7日目 | 0 | 0.0% |
| 8日目 | 0 | 0.0% |
| 9日目 | 0 | 0.0% |
| 10日目 | 0 | 0.0% |
| 11日目 | 0 | 0.0% |
| 12日目 | 0 | 0.0% |
| 13日目 | 0 | 0.0% |
| 14日目 | 0 | 0.0% |

接種4回目2週間後アンケート回答者:N=313

19-244.症状別：入院日（接種5回目）

接種5回目

| 入院日 | 人数 | 割合 |
|------|----|------|
| 接種当日 | 0 | 0.0% |
| 接種翌日 | 0 | 0.0% |
| 3日目 | 0 | 0.0% |
| 4日目 | 0 | 0.0% |
| 5日目 | 0 | 0.0% |
| 6日目 | 0 | 0.0% |
| 7日目 | 0 | 0.0% |
| 8日目 | 0 | 0.0% |
| 9日目 | 0 | 0.0% |
| 10日目 | 0 | 0.0% |
| 11日目 | 0 | 0.0% |
| 12日目 | 0 | 0.0% |
| 13日目 | 0 | 0.0% |
| 14日目 | 0 | 0.0% |

接種5回目2週間後アンケート回答者：N=54

19-245.症状別：入院日（接種6回目）

接種6回目

| 入院日 | 人数 | 割合 |
|------|----|------|
| 接種当日 | 0 | 0.0% |
| 接種翌日 | 0 | 0.0% |
| 3日目 | 0 | 0.0% |
| 4日目 | 0 | 0.0% |
| 5日目 | 0 | 0.0% |
| 6日目 | 0 | 0.0% |
| 7日目 | 0 | 0.0% |
| 8日目 | 0 | 0.0% |
| 9日目 | 0 | 0.0% |
| 10日目 | 0 | 0.0% |
| 11日目 | 0 | 0.0% |
| 12日目 | 0 | 0.0% |
| 13日目 | 0 | 0.0% |
| 14日目 | 0 | 0.0% |

接種6回目2週間後アンケート回答者：N=6

19-246.症状別：3回目の体調（2回目に比べて）

| | 接種1・2回目 | 接種3回目 | 接種人数 | 楽だった | 変わらない | つらかった |
|----|-------------------|----------------------|------|------------|------------|-------------|
| 1 | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 114人 | 28.1%(32人) | 42.1%(48人) | 29.8%(34人) |
| 2 | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 27人 | 66.7%(18人) | 29.6%(8人) | 3.7%(1人) |
| 3 | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 319人 | 13.5%(43人) | 25.4%(81人) | 61.1%(195人) |
| 4 | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 237人 | 40.9%(97人) | 33.3%(79人) | 25.7%(61人) |
| 5 | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 74人 | 85.1%(63人) | 9.5%(7人) | 5.4%(4人) |
| 6 | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 33人 | 87.9%(29人) | 6.1%(2人) | 6.1%(2人) |
| 7 | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 2人 | 50%(1人) | 50%(1人) | 0%(0人) |
| 8 | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 9 | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 2人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 100%(2人) |
| 10 | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 11 | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 1人 | 100%(1人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 12 | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 1人 | 100%(1人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 13 | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 14 | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 1人 | 100%(1人) | 0%(0人) | 0%(0人) |

19-247.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目ファイザー社1価ワクチン（起源株）

| | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 楽だった | つらかった | 変わらない |
|---|----------------------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 9人 | 33.3%(3人) | 11.1%(1人) | 55.6%(5人) |
| 2 | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 17人 | 52.9%(9人) | 5.9%(1人) | 41.2%(7人) |
| 3 | 武田(ノババックス) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 4 | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 5 | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 6 | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 7 | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |

19-248.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目モデルナ社1価ワクチン（起源株）

| | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種回数 | | | |
|---|----------------------|------------------|------|------------|------------|------------|
| | | | 接種人数 | 楽だった | つらかった | 変わらない |
| 1 | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 19人 | 15.8%(3人) | 42.1%(8人) | 42.1%(8人) |
| 2 | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 144人 | 31.3%(45人) | 14.6%(21人) | 54.2%(78人) |
| 3 | 武田(ノババックス) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 4 | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 5 | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 6 | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 7 | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |

19-249.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目武田（ノババックス）

| 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 楽だった | つらかった | 変わらない |
|------------------------|------------|-----------|--------|--------|----------|
| 1 ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0人 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 2 モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 2人 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 100%(2人) |
| 3 武田(ノババックス) | 武田(ノババックス) | 0人 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 4 ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0人 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 5 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0人 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 6 モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0人 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 7 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0人 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |

19-250.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.1）

| 接種3回目 | | 接種4回目 | 接種人数 | 楽だった | つらかった | 変わらない |
|-------|----------------------|--------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 7人 | 14.3%(1人) | 42.9%(3人) | 42.9%(3人) |
| 2 | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 13人 | 61.5%(8人) | 15.4%(2人) | 23.1%(3人) |
| 3 | 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 4 | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 5 | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 6 | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 7 | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |

19-251.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）

| | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 楽だった | つらかった | 変わらない |
|---|----------------------|----------------------|------|------------|----------|------------|
| 1 | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 11人 | 45.5%(5人) | 9.1%(1人) | 45.5%(5人) |
| 2 | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 30人 | 56.7%(17人) | 10%(3人) | 33.3%(10人) |
| 3 | 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 1人 | 0%(0人) | 100%(1人) | 0%(0人) |
| 4 | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 5 | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 6 | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 7 | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |

19-252.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.1）

| | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 楽だった | つらかった | 変わらない |
|---|----------------------|-------------------|------|------------|-----------|------------|
| 1 | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 7人 | 28.6%(2人) | 57.1%(4人) | 14.3%(1人) |
| 2 | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 44人 | 38.6%(17人) | 25%(11人) | 36.4%(16人) |
| 3 | 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 4 | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 5 | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 6 | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 7 | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |

19-253.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）

| | 接種3回目 | 接種4回目 | 接種人数 | 楽だった | つらかった | 変わらない |
|---|----------------------|---------------------|------|---------|---------|---------|
| 1 | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 4人 | 0%(0人) | 75%(3人) | 25%(1人) |
| 2 | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 5人 | 20%(1人) | 0%(0人) | 80%(4人) |
| 3 | 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 4 | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 5 | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 6 | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 7 | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |

19-254.症状別：5回目の体調（4回目に比べて）


| | 接種4回目 | 接種5回目 | 接種人数 | 楽だった | つらかった | 変わらない |
|----|-------------------|----------------------|------|------------|-----------|-----------|
| 1 | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 2 | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 4人 | 50%(2人) | 0%(0人) | 50%(2人) |
| 3 | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 14人 | 57.1%(8人) | 7.1%(1人) | 35.7%(5人) |
| 4 | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 17人 | 58.8%(10人) | 0%(0人) | 41.2%(7人) |
| 5 | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 1人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 100%(1人) |
| 6 | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 9人 | 44.4%(4人) | 11.1%(1人) | 44.4%(4人) |
| 7 | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 2人 | 100%(2人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 8 | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 6人 | 66.7%(4人) | 0%(0人) | 33.3%(2人) |
| 9 | ファイザー社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 10 | モデルナ社1価ワクチン(起源株) | 武田(ノババックス) | 0人 | 0%(0人) | 0%(0人) | 0%(0人) |

19-255.症状別：6回目の体調（5回目に比べて）

| 接種5回目 | 接種6回目 | 接種人数 | 楽だった | つらかった | 変わらない |
|-------------------------|----------------------|-------------|------|--------|----------|
| 1 ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 2 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 3 モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 4 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 5 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 6 ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 7 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 8 モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 9 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 10 武田(ノババックス) | ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 11 ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 12 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 13 モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 14 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 15 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 16 ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 1人 0%(0人) | | 0%(0人) | 100%(1人) |
| 17 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 4人 25%(1人) | | 0%(0人) | 75%(3人) |
| 18 モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 1人 100%(1人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 19 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 20 武田(ノババックス) | モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 21 ファイザー社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 22 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 23 モデルナ社2価ワクチン(BA.1) | 武田(ノババックス) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 24 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) | 武田(ノババックス) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |
| 25 武田(ノババックス) | 武田(ノババックス) | 0人 0%(0人) | | 0%(0人) | 0%(0人) |

19-256.症状別：4回目のインフルエンザ同時接種状況


接種4回目



接種4回目当日アンケート回答者：N=730
接種4回目1週間後アンケート回答者：N=304
接種4回目2週間後アンケート回答者：N=313

19-257.症状別：5回目のインフルエンザ同時接種状況

接種5回目




接種5回目当日アンケート回答者：N=107

接種5回目1週間後アンケート回答者：N=55

接種5回目2週間後アンケート回答者：N=54

19-258.症状別：6回目のインフルエンザ同時接種状況

接種6回目



接種6回目当日アンケート回答者：N=14
接種6回目1週間後アンケート回答者：N=6
接種6回目2週間後アンケート回答者：N=6