

福岡県感染症発生動向調査感染症週報

令和6年第9週（令和6年2月26日～令和6年3月3日）

福岡県感染症情報センター

■ コメント

- 第9週は、今年県内1例目となる腸チフスの報告がありました。腸チフスは、チフス菌に汚染された食べ物や水を介して感染します。潜伏期間は7～14日で、39℃を超える高熱が1週間以上続き、バラ疹（胸腹部に現れる淡紅色の発疹）、徐脈（脈拍が遅い）、脾腫、下痢等の症状がみられます。腸チフスは南アジア、東南アジア、アフリカ、カリブ海、中央及び南アメリカなどの衛生水準が低い地域で多く見られる感染症です。予防のため、流行地域に行く際は、トイレの後や食事の前には石けんでよく手を洗い、十分に加熱された飲食物を摂取することが大切です。
- 福岡県感染症情報ホームページ(http://www.fiheh.pref.fukuoka.jp/~idsc_fukuoka/)では、感染症発生情報、病原体検出情報などがご覧になれます。

■ 全数把握疾患報告

| 病名 | 福岡県 | | 全国（前週） | |
|----------------|-----|-------|--------|-------|
| | 報告数 | 累積報告数 | 報告数 | 累積報告数 |
| 結核 | 17 | 111 | 190 | 1,882 |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | 8 | 12 | 162 |
| 腸チフス | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 3 | 16 | 26 | 378 |
| 後天性免疫不全症候群 | 2 | 10 | 9 | 144 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | 2 | 8 | 102 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | 21 | 37 | 462 |
| 水痘（入院例） | 2 | 5 | 8 | 52 |
| 梅毒 | 15 | 121 | 145 | 1,719 |
| 百日咳 | 2 | 9 | 7 | 78 |

■ 定点把握疾患報告数

: 警報レベル

: 注意報レベル

| 病名 | 福岡県 | | | 全国（前週） | |
|----------------------|-------|-------|------|--------|-------|
| | 報告数 | 定点当たり | 前週比 | 報告数 | 定点当たり |
| 新型コロナウイルス感染症 | 1,043 | 5.27 | 0.78 | 39,124 | 7.92 |
| インフルエンザ（警報レベル） | 3,167 | 15.99 | 0.66 | 82,741 | 16.76 |
| RSウイルス感染症 | 14 | 0.12 | 0.78 | 658 | 0.21 |
| 咽頭結膜熱 | 79 | 0.66 | 1.25 | 2,640 | 0.84 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（警報レベル） | 808 | 6.73 | 1.10 | 11,561 | 3.69 |
| 感染性胃腸炎 | 531 | 4.43 | 0.95 | 17,106 | 5.46 |
| 水痘 | 20 | 0.17 | 1.33 | 399 | 0.13 |
| 手足口病 | 38 | 0.32 | 1.41 | 591 | 0.19 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 0.03 | 0.75 | 55 | 0.02 |
| 突発性発しん | 29 | 0.24 | 0.94 | 591 | 0.19 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0.00 | 0.00 | 93 | 0.03 |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 0.02 | 1.00 | 88 | 0.03 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0.00 | - | 4 | 0.01 |
| 流行性角結膜炎 | 7 | 0.27 | 1.40 | 293 | 0.42 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0.00 | - | 5 | 0.01 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0.00 | - | 8 | 0.02 |
| マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0.07 | 1.00 | 26 | 0.05 |
| クラミジア肺炎 | 0 | 0.00 | - | - | - |
| 感染性胃腸炎（ロタウイルス） | 0 | 0.00 | - | 2 | 0.00 |

※新型コロナウイルス感染症について、現在、警報・注意報の基準値は設定されていません。