

ヲ取り混和シ製スヘシ  
本品ハ澄明無色全ク揮發性ノ液ニシテ中性ノ反應ヲ微シ異重ハ〇・八一ナリ之ニ同容量ノ醋酸加留謀  
溶液ヲ和シテ振盪スレハ本品半容量ニ當ル依的兒性液ヲ分離スヘシ  
塚中ニ容レ密栓シ冷處ニ貯フヘシ

○甘硝石精 亞硝酸依知爾精 *Spiritus Aethyl Nitritus. Spiritus Aethylis nitrosi.*

●甘硝石精ハ酒精ニ硝酸ノ作用ヲ受クルニ由テ生スル物質中最モ低溫ニ於テ沸騰スル部分ニシテ無色乃  
至微黃色澄明ノ液ヲ爲シ佳快微甘依的兒樣ノ香氣ヲ有シ異重ハ〇・八四〇乃至〇・八五〇ナリ同容量ノ  
嘔囉仿謨ニハ澄明ニ混和シ重湯煎ノ温ニ由テ全ク揮散スヘシ刺屈謨斯紙上ニハ中性或ハ弱酸性ノ反應  
ヲ微シ重炭酸加留謀ノ結晶片ヲ投加スルモ泡沸ス可カラズ  
本品ヲ半容量ノ加里瀘液ニ混和スレハ黃色ヲ呈スヘシト雖モ二十四時以內ニ於テ暗褐色ト爲ル可カラ  
ズ又硝酸銀ニ和シテ熱スルモ沈澱又ハ還元ヲ起ス可カラズ硫化水素ニ由テ有色ノ濁濁或ハ沈澱ヲ生ス  
可カラズ

本品ハ硫酸鐵溶液或ハ沃度化加留謀溶液ヲ以テ分解スルニ百分ニ付キ二乃至三分ノ亞硝酸依知爾(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>  
NO<sub>2</sub>)ヲ微スル所ノ酸化窒素ヲ生スヘシ  
塚中ニ容レ硝子栓ヲ以テ密閉シ貯フヘシ

芳香安母尼亞精 *Spiritus Ammoniae aromaticus.*

芳香安母尼亞精ハ

炭酸安母紐謨

安母尼亞水

枸橼油

丁香油

刺腎堇兒油

四十分

百分

八分

一分

一分

酒精

蒸餾水

六百五十分

二百分

ル取り先ツ蒸餾水ニ安母尼亞水ヲ加ヘテ炭酸安母紐謨ヲ溶解シ別ニ揮發油類ヲ酒精ニ溶解シ此兩液ヲ  
混和シ製スヘシ

本品ハ澄明微類黃色ノ液ニシテ芳香性安母尼亞樣ノ臭氣ヲ有シ異重ハ大約〇・九〇ナリ

本品十立方「センチメートル」ニ定規酸液ヲ和シテ揮發油ノ佳香ヲ有スル中性ノ乳狀液ヲ得ルニハ其酸  
液十乃至十一立方「センチメートル」ヲ費サ、ル可カラズ是レ百分中大約二分ノ安母尼亞ヲ微スルモノ  
トス

塚中ニ容レ硝子栓ヲ以テ密閉シ貯フヘシ

安母尼亞茴香精 *Spiritus Ammoniae foeniculatus.*

安母尼亞茴香精ハ

茴香油

ヲ取り

三分

酒精

八十分

ニ溶解シ之ニ

安母尼亞水

十七分

ヲ混和シ製スヘシ

本品ハ殆ト無色ナル澄明ノ液ニシテ異重ハ大約〇・八五ナリ

本品十五瓦蘭謨ニ定規酸液ヲ和シテ茴香油ノ佳香ヲ有スル中性ノ乳狀液ヲ得ルニハ其酸液十立方「セン  
チメートル」ヲ費サ、ル可カラズ是レ百分中大約一・七分ノ安母尼亞ヲ微スルモノトス  
塚中ニ容レ硝子栓ヲ以テ密閉シ貯フヘシ

芳香精 *Spiritus aromaticus.*

芳香精ハ

丁香

桂皮

肉荳蔻

縮砂

ヲ取り搗碎シ蒸餾器中ニ投シ之ニ

酒精

枸橼油

薄荷油

常水

ヲ注キ蒸餾シテ殆ト〇・九〇ノ異重ヲ有スル液大約千分ヲ餾取シ製スヘシ

本品ハ澄明ノ液ニシテ芳香性ノ香味ヲ有ス

壺中ニ容レ密栓シテ貯フヘシ

樟腦精 Spiritus Camphorae.

樟腦精ハ

樟腦

ヲ取り

稀酒精

ニ溶解シ製スヘシ

本品ハ澄明無色ノ液ニシテ異重ハ大約〇・九〇七ナリ

壺中ニ容レ密栓シテ貯フヘシ

呵囉仿謨精 Spiritus Chloroformi.

十五分

十五分

三十分

三十分

八百分

一分

二分

千二百分

十分

九十分

呵囉仿謨精ハ

呵囉仿謨

酒精

ヲ取り混和シ製スヘシ

本品ハ澄明無色ノ液ニシテ異重ハ大約〇・八七二ナリ

壺中ニ容レ密栓シテ貯フヘシ

桂皮精 Spiritus Cinnamomi.

桂皮精ハ

桂皮油

酒精

ヲ取り混和シ製スヘシ

本品ハ澄明ノ液ニシテ異重ハ大約〇・八四五ナリ

壺中ニ容レ密栓シテ貯フヘシ

稀酒精 Spiritus dilutus.

稀酒精ハ

酒精

蒸餾水

ヲ取り混和シ製スヘシ

本品ハ澄明無色ノ液ニシテ〇・八九二乃至〇・八九六ノ異重ヲ有スヘシ是レ百分中純亞爾箇保爾ノ重量

大約六十分ヲ微スルモノトス

壺中ニ容レ密栓シテ貯フヘシ

茴香精 Spiritus Foeniculi.

十分

九十分

五分

九十五分

七分

三分

茴香精ハ

茴香油

酒精

ヲ取り混和シ製スヘシ

本品ハ澄明無色ノ液ニシテ異重ハ大約〇・八四五ナリ

罎中ニ容レ密栓シテ貯フヘシ

杜松實精 *Spiritus Juniperi.*

杜松實精ハ

杜松實油

酒精

ヲ取り混和シ製スヘシ

本品ハ澄明無色ノ液ニシテ異重ハ大約〇・八三五ナリ

罎中ニ容レ密栓シテ貯フヘシ

刺賢坪爾精 *Spiritus Lavandulae.*

刺賢坪爾精ハ

刺賢坪爾油

酒精

ヲ取り混和シ製スヘシ

本品ハ澄明無色ノ液ニシテ異重ハ大約〇・八三七ナリ

罎中ニ容レ密栓シテ貯フヘシ

枸櫞精 *Spiritus Limonis.*

枸櫞精ハ

枸櫞油

十分

三分  
九十七分

三分  
九十七分

十分

酒精

ヲ取り混和シ製スヘシ

本品ハ澄明ノ液ニシテ異重ハ大約〇・八三五ナリ

罎中ニ容レ密栓シテ貯フヘシ

薄荷精 *Spiritus Menthae.*

薄荷精ハ

薄荷油

酒精

ヲ取り混和シ製スヘシ

本品ハ澄明無色ノ液ニシテ異重ハ大約〇・八四二ナリ

罎中ニ容レ密栓シテ貯フヘシ

○海綿 *Spongia.*

*Spongia officinalis Linn. Achilleum laciniatum Schweigg.*

海綿ハ孔隙微細ニシテ柔軟ナル坊間ノ品ヲ取り敲打シテ異物ヲ除去シ次ニ十分一重量ノ鹽酸ヲ附加セ

ル水ヲ注キテ二三日間冷浸シタル後水ヲ以テ充分ニ洗滌シ乾燥シテ貯フヘシ

壓搾海綿 *Spongia compressa.*

壓搾海綿ハ

淨清セル海綿

ヲ取り水ニ浸シテ柔軟ト爲シ手ヲ以テ強ク壓搾シタル後亞拉昆亞護謨漿ニ浸漬シ更ニ壓搾シ絲ニテ強

ク絞扼シツツ密ニ之ヲ纏絡シテ製シ乾燥シテ後絲ヲ以テ束縛シ貯フヘシ

本品ヲ製スルニハ絲ニテ纏絡スル後殆ト指大ノ圓搦形ヲ爲スヘキ長形ノ海綿ヲ撰取スヘシ

○吐酒石 *Sibii et Kali Tartas. Tartarus emeticus.*

九十分

十分  
九十分

吐酒石ハ漸次風化スル細小透映ノ結晶或ハ白色結晶性ノ粉末ニシテ七分ノ冷水及三分ノ沸湯ニ溶解ス又之ヲ熱スレハ燃燒スル砂糖ノ臭氣ヲ發シテ炭化シ亞爾加里性黑色ノ物質ヲ殘留スヘシ  
本品ノ水溶液ハ弱酸性ノ反應ヲ徵シ過剰ノ硫化安母紐謨ニ由テ沈澱ヲ生ス可カラス  
本品ノ水溶液ニ少量ノ酒石酸ヲ和シタルモノハ硝酸拔留謨、硝酸銀或ハ萘酸安母紐謨ニ由テ濁濁ス可カラス又黄色血滲鹽ニ由テ藍色ヲ呈ス可カラス

本品ノ粉末一瓦蘭謨ヲ鹽酸十立方「センチメートル」ニ溶解シ之ニ硫化水素水五滴ヲ加ヘ二時間ヲ經ルモ黄色ヲ呈セス或ハ黃澱ヲ生ス可カラス  
本品一瓦蘭謨ヲ取り少量ノ酒石酸ヲ加ヘタル水百瓦蘭謨ニ溶解シ硫化水素ヲ以テ飽和スレハ橙赤色ノ沈澱ヲ生スヘシ此沈澱ヲ洗滌乾燥セル後更ニ硫化炭素ヲ以テ洗滌シ百度ノ熱ニ於テ乾燥スルトキハ其量〇・五〇乃至〇・五二瓦蘭謨ヲラサル可カラス  
注意シテ貯フヘシ

酸化安母紐謨 Sibii Oxidum.

酸化安母紐謨ハ白色或ハ灰白色ノ重キ粉末ニシテ臭味ナク水及酒精ニ溶解セス紅熾熱ニ於テ容易ク熔融シ冷後固結シテ結晶様ノ塊ト爲ル

本品ハ加里滲液、鹽酸及酒石酸溶液ニハ熱ヲ與フレハ容易ク全溶スヘシ又過剰ノ酒石ヲ用テ得タル本品ノ稀薄溶液ハ硝酸銀或ハ硝酸拔留謨ニ由テ濁濁セス黄色血滲鹽ニ由テ沈澱ヲ生ス可カラス但シ硫化水素ニ由テ橙赤色ノ沈澱ヲ生スヘシ

本品〇・五瓦蘭謨ヲ鹽酸十立方「センチメートル」ニ溶解シ之ニ硫化水素水五滴ヲ加ヘ二時間ヲ經ルモ黄色ヲ呈シ或ハ黃澱ヲ生ス可カラス又本品ヲ加里滲液ニ溶解シタルモノハ硫化安母紐謨ニ由テ變化ス可カラス  
注意シテ貯フヘシ

〇硫化安母紐謨 金硫黃 Sibii Sulphidum aurantiacum. Sulphur auratum Antimonii.

硫化安母紐謨ハ橙赤色細緻ノ粉末ニシテ臭味ナク水及酒精ニ溶解セス小試験管中ニ熱スレハ硫黃ヲ昇華シテ黑變ス  
本品ハ鹽酸ヲ和シ熱ヲ與フレハ硫化水素ヲ發生シ少量ノ硫黃ヲ析出シ殆ト全ク溶解シ二百分ノ安母尼亞水ニ和シテ熱スルモ亦殆ト全溶シ亞爾加里滲液并ニ硫化安母紐謨ニハ全ク或ハ殆ト溶解スヘシ  
本品一瓦蘭謨ヲ加里滲液ニ溶解シテ後稀鹽酸ヲ加ヘテ酸性ト爲シ茲ニ得タル沈澱ヲ數回水ニテ洗滌シ其沈澱ノ尚ホ濕潤ナルニ乘シ炭酸安母紐謨一瓦蘭謨ヲ水二十立方「センチメートル」ニ溶解シタル液ニ和シテ振盪シ濾過スルニ其濾液ハ鹽酸ヲ加ヘテ酸性ト爲スモ黄色ヲ呈セス又ハ黄色ノ沈澱ヲ生ス可カラス之ニ少許ノ硫化水素水ヲ加フルモ亦然リ  
本品ヲ二十分ノ水ニ和シ振盪シ濾過シテ得タル液ハ硝酸銀并ニ萘酸安母紐謨ニ由テ變化ス可カラス又硝酸拔留謨ヲ加フルモ僅微ノ濁濁ヲ起スニ過ク可カラス  
光ヲ遮リ注意シテ貯フヘシ

番木髓 Strychni Semen. Nuc vomica. Strychnos Nuc vomica Zinn.

番木髓ハ圓形扁平ナル種子ニシテ多クハ反曲シ中央ニ臍點ヲ有シ直徑二十五「ミリメートル」ニ過キス厚サ五「ミリメートル」ニ至リ兩面ニハ中央ヨリ周邊ニ向テ偃伏セル灰白黄色絹絲様ノ光澤アル毛茸ヲ密被セリ  
本品ハ水ニ浸シ軟化スレハ多クハ稍、尖銳ナル所ノ邊緣ニ沿フテ破裂シ澱粉ヲ含有セサル二片ノ角質様子瓣ト爲ルヘシ本品ハ臭氣ナク味甚タ苦シ  
注意シテ貯フヘシ

硝酸斯篤里幾尼涅 Strychnini Niras.

硝酸斯篤里幾尼涅ハ無色中性ノ鍼狀結晶ニシテ九十分ノ冷水二分ノ沸湯及七十分ノ冷酒精ニ溶解シ依的兒ニハ溶解セス大ニ稀釋セル水溶液ト雖モ甚シキ苦味ヲ有ス白金板上ニ熱灼スレハ炭化シ終ニ固性

物ヲ殘留セスシテ全ク燃化スヘシ  
 本品ノ硫酸溶液ニ硫酸鐵溶液ヲ加フレハ褐色ヲ呈スヘシ本品ノ飽和水溶液ニ重格羅謨酸加留謨溶液ヲ加フレハ赤黄色ノ結晶ヲ沈澱スヘシ此結晶ヲ液分ヨリ別チ之ニ硫酸ヲ注ケハ深藍紫色ヲ呈スヘシ又本品ニ硝酸ヲ加ヘテ研和スルニ黄色ヲ呈スルモ赤色ヲ呈ス可カラス  
 本品ノ水溶液ニ少量ノ稀硝酸ヲ加ヘテ酸性ト爲シ之ニ硝酸拔留謨又ハ硝酸銀ヲ加フルモ濁濁ヲ生ス可カラス  
 最モ注意シテ貯フヘシ

○流動蘇合香 *Syrax liquidus*.

*Liquidambar orientalis Mill.*

流動蘇合香ハ本植物ノ内皮ヨリ煎出シ得タル拔爾撒謨ニシテ佳香ヲ有スル粘稠ノ液ヲ爲シ外面ハ褐色内部ハ灰色ヲ有シ其薄層ニ於テハ透映ナリ水中ニ沈ミ荊棘芳香性ノ味アリ  
 本品ハ等分ノ温酒精ニハ些少ナル植物ノ殘片其他偶然混入シタル不潔物ヲ除クノ外盡ク溶解シテ酸性暗褐色ノ液ト爲ルヘシ冷後濾過シテ蒸發スレハ褐色半流動ノ殘滓ヲ生ス其重量ハ本品百分ニ付キ少クモ七十分ニ達セサル可カラス又此殘滓ハ依的兒及硫化炭素ニハ殆ト全ク溶解スレトモ石油依的兒ニハ溶解ス可カラス

精製硫黃 *Sulphur depuratum.*

精製硫黃ハ

篩過セル昇華硫黃

百分

ヲ取り之ニ

蒸餾水

七十分

安母尼亞水

十分

ノ混和液ヲ加ヘテ研和シ屢攪拌シテ二日間放置シ更ニ

蒸餾水

百分

ヲ加ヘ濾過シ蒸餾水ヲ以テ充分ニ洗滌シ適宜ノ温ヲ與ヘテ乾燥シ篩過シ製スヘシ  
 本品ハ黄色乾燥微細ノ粉末ニシテ臭味ナク之ヲ熱スレハ熔融シ大氣中ニ燃燒スレハ藍色ノ火焰ヲ生シ亞硫酸ノ臭氣ヲ放チ極メテ僅微ノ固性物ヲ殘留スルニ過ク可カラス本品ハ水及酒精ニ溶解セス沸騰那篤倫瀘液ニ溶解ス

本品ノ水ニ濡ホセルモノハ藍色刺屈謨斯紙ヲ赤變ス可カラス又本品ニ二十分ノ安母尼亞ヲ加ヘ温浸シ濾過シテ得タル液ニ鹽酸ヲ加ヘテ酸性ト爲ストキハ更ニ硫化水素ヲ和スルノ後ト雖モ黄色ヲ呈セス又ハ黄色ノ沈澱ヲ生ス可カラス

沈降製硫黃 *Sulphur praecipitatum.*

沈降製硫黃ハ帶黄白色無晶形極メテ微細ノ粉末ニシテ乾燥シ臭味ナク大氣中ニ熱スレハ藍色ノ火焰ヲ生シ亞硫酸ノ臭氣ヲ放チ極メテ僅微ノ固性物ヲ殘留スルニ過ク可カラス其他試驗藥ニ對スル反應ハ精製硫黃ノ條ニ掲クル所ニ同シ

○昇華硫黃 *Sulphur sublimatum.*

昇華硫黃ハ枸橼黄色微細ノ粉末ニシテ大氣中ニ熱スレハ熔融シ終ニ藍色ノ火焰ヲ生シ亞硫酸ノ臭氣ヲ放チ極メテ僅微ノ固性物ヲ殘留スルニ過ク可カラス本品ハ沸騰那篤倫瀘液ニ溶解シ水及酒精ニ溶解セス

本品ノ水ニ濡ホセルモノハ藍色刺屈謨斯紙ヲ赤變スルコトアルモ僅微ニ過ク可カラス

獨葵舍利別 *Syrupus Althaeae.*

獨葵舍利別ハ

剉截セル獨葵根

三分

ヲ取り水ヲ以テ洗ヒ

常水

四十分

ヲ注キ十二時間冷浸シ壓ヲ加ヘスシテ絨布ヲ以テ濾過シ  
其濾液

三十分

白糖

四十分

ヲ溶解シ製スヘシ

本品ハ澄明微黃色粘滑ノ舍利別ナリ

橙皮舍利別 *Syrupus Aurantii Corticis.*

橙皮舍利別ハ

橙皮丁幾丟兒

十五分

八十五分

ヲ取り混和シ製スヘシ

本品ハ澄明帶黃褐色ノ舍利別ニシテ佳快芳香性ノ香氣ヲ有ス

橙花舍利別 *Syrupus Aurantii Florum.*

橙花舍利別ハ

白糖

九分

ヲ取り

橙花水

五分

ニ投シ温ヲ與ヘスシテ振盪溶解シ製スヘシ

本品ハ佳快ナル橙花ノ香氣ヲ有スル澄明ノ舍利別ナリ

○沃度化鐵舍利別 *Syrupus Ferri Iodidi.*

沃度化鐵舍利別ハ

沃度

八分

蒸餾水

四十分

ヲ取り硝子壺ニ容レ徐徐ニ

鐵粉

三分

ヲ加ヘテ微熱ヲ與ヘ輕ク振盪シテ其液類綠色ヲ呈スルニ至リ豫メ

白糖

百二十五分

ヲ盛リタル瓷皿中ニ其温液ヲ小濾器ニテ濾入シ後ホ濾器中ニ殘留セル鐵分ニ

温蒸餾水

三分

ヲ注キテ洗滌シ更ニ其濾液ニ

蒸餾水

大約二十分

ヲ加ヘ重湯煎上ニ熱シテ百九十五分ト爲シ製スヘシ

本品ハ殆ト無色或ハ微綠色乃至微黃色澄明ノ舍利別ナリ

本品二十五蘭謨ニ二部重量ノ蒸餾水ヲ加ヘテ稀釋シタル液ニ定規昇汞液ヲ滴入シテ復タ消失セサル洗

逆ヲ生スルニハ其昇汞液十六・一立方センチメートルヲ費ササル可カラス是レ百分中五分ノ沃度化鐵

ヲ徴スルモノトス

白硝子ノ小壺ニ容レ一片ノ純鐵線ヲ投シ最モ善ク栓塞シ日光ニ直露スル處ニ貯フヘシ

吐根舍利別 *Syrupus Ipecacuanhae.*

吐根舍利別ハ

吐根丁幾丟兒

一分

單舍利別

九分

ヲ取り混和シ製スヘシ

本品ハ澄明類黃色ノ舍利別ナリ其百分ハ吐根一分ニ符合スルモノトス

桑實舍利別 *Syrupus Mori.*

桑實舍利別ハ

新鮮ナル桑實

ヲ取り搗爛シ大約二十度ノ温ニ於テ屢攪拌シ其少許ヲ濾取シテ半容量ノ酒精ヲ加フルモ溷濁セスシ  
テ混和シ得ルニ至リ壓搾シ更ニ其搾液ヲ濾過シ  
澄明ナル濾液

ニ

白糖

三十五分  
六十五分

ヲ溶解シ製スヘシ

本品ハ澄明暗紫紅色ノ舍利別ナリ

阿片舍利別 *Syrupus Opii.*

阿片丁幾丟兒

單舍利別

一分  
四十九分

ヲ取り混和シ製スヘシ

本品五百分ハ阿片末一分ノ可溶成分ヲ含有スルモノトス  
本品ハ澄明類黃色ノ舍利別ニシテ微ニ阿片ノ臭味ヲ有ス

○大黃舍利別 *Syrupus Rhei.*

大黃舍利別ハ

剉截セル大黃

十分

ヲ取り

常水

三十分

ニ十二時間冷浸シ布濾シ其殘滓ニ

常水

大約十五分

ヲ加ヘテ六時間冷浸シタル後壓濾シ濾液ヲ合シ更ニ濾過シテ三十五分ト爲シ之ニ

白糖

六十五分

ヲ溶解シ製スヘシ

本品百分ハ大黃十分ノ可溶成分ヲ含有スルモノトス

本品ハ澄明褐黃色ノ舍利別ナリ

複方撒兒沙巴利刺舍利別 *Syrupus Sarsaparillae compositum.*

複方撒兒沙巴利刺舍利別ハ

剉截セル撒兒沙巴利刺

二十分

削片セル瘰癧木

十六分

剉截セル薩撒富拉斯

十六分

搗碎セル規那

十分

搗碎セル茴香

三分

ヲ取り

熱湯

二百五十分

ヲ注キ六時間弱ク温浸シテ壓搾シ其搾液ヲ濾過シ

佩里設林

三十分

ヲ混和シ重湯煎上ニ蒸發シテ其液九十分ト爲ルニ至リ

白糖

百十分

ヲ溶解シ製スヘシ

本品ハ澄明褐色ノ舍利別ナリ

攝涅瓦舍利別 *Syrupus Senegae.*

攝涅瓦舍利別ハ

剉截セル攝涅瓦

ヲ取り、

五分

常水

四十五分

酒精

五分

ヲ注キ二日間冷浸シ壓搾シ其搾液ヲ濾過シ

其濾液

四十分

白糖

六十分

ヲ溶解シ製スヘシ

本品ハ澄明類黄色ノ舍利別ナリ

旃那舍利別 *Syrupus Sennae.*

旃那舍利別

十分

ハ剉截セル旃那

ヲ取り

熱湯

四十分

ヲ注キ六時間冷浸シタル後壓濾シ靜定シテ涎滓ヲ除キ

其濾液

三十五分

白糖

六十五分

ヲ溶解シ製スヘシ

本品ハ澄明褐色ノ舍利別ナリ

單舍利別 *Syrupus simplex. Syrupus Sacchari.*

白糖

六十五分

ヲ取り

熱蒸餾水

三十五分

ニ溶解シ製スヘシ

本品ハ無色無臭澄明ノ舍利別ナリ

篤留拔爾撒謨舍利別 *Syrupus lolulani.*

篤留拔爾撒謨舍利別ハ

四分

白糖

六十五分

常水

三十五分

ヲ取り混和シ器中ニ盛り蓋覆シ八十度乃至九十度ノ温ニ於テ二時間温浸シ冷後布濾シ製スヘシ  
本品ハ微黄色芳香性ノ舍利別ナリ

生薑舍利別 *Syrupus zingiberis.*

生薑舍利別ハ

十分

生薑丁幾丟兒

單舍利別

九十分

ヲ取り混和シ製スヘシ

本品ハ微濁微黄色ノ舍利別ナリ

答滿林度 *Tamarindus.*

*Tamarindus indica Zinn.*

答滿林度ハ粘靱黑褐色ノ果泥ニシテ堅硬ナル栗褐色ノ種子、纖維様ノ脈管束、羊皮紙様ノ果房及果殼ノ碎片ヲ僅微ニ混有ス

本品ハ特異ノ微臭及強キ酸味ヲ有スヘシ少量ノ水ヲ以テ軟化シタル後磨光セル鐵板ヲ之ニ没入スルモ銅ヲ混有スルノ徵ヲ呈ス可カラス

其微菌ヲ帶ヒ或ハ酸酵ニ陥リタルモノハ供用ス可カラス

蒲公英 Taraxacum.

Taraxacum officinale Wigg.

蒲公英ハ春季開花前其根ヲ併セテ採集シ乾燥シタルモノナリ其葉ハ基立性ニシテ大鋸齒狀ニ開裂ス根ハ長サ一乃至二デシメートル「太サ半乃至二」センチメートル「半」ニシテ褐色ヲ有シ縱溝ヲ帶フ其橫截面ハ類黃色疎鬆ノ木心ヲ現ハシ厚キ外皮ニ因テ圍繞セラレ中ニハ同心性ノ圈輪ヲ爲シテ並列セル多數ノ乳液管アリ

的列並底 Terebinthina.

Abietinace 科ノ植物殊ニ Pinus 屬

的列並底ハ稠厚類黃色ノ樹脂液ニシテ特異ノ臭氣及苦味ヲ有シ間、結晶性ノ涎滓ヲ混有スレトモ之ヲ熱スレハ澄明ニ溶解ス

本品一分ヲ五分ノ酒精ニ和スレハ濕潤セル藍色刺屈謨斯紙ヲ紅變スル澄明ノ溶液ヲ得ヘシ

知母爾 Thymol.

知母爾ハ無色透明著大ノ結晶ニシテ芳香性ノ香味ヲ有シ大約五十度ノ温ニ於テ熔融シ二百三十度ノ熱ニ於テ沸騰シ重湯煎ノ温ニ逢フテ揮散ス本品ハ水中ニ沈降スレトモ其熔融シタルモノハ無色油狀ノ液トナリテ浮游ス本品ハ殆ト水ニ溶解セス酒精、依的兒、呀囉仿謨及冰醋酸ニハ極メテ容易ニ溶解ス

本品ノ飽和水溶液ハ中性ノ反應ヲ徵シ貌羅謨ノ蒸氣ニ觸レテ乳狀ノ濁濁ヲ生スヘシ又過格魯兒化鐵ヲ和スルモ染色ス可カラス

本品ノ結晶一碎片ヲ取り大約一立方「センチメートル」ノ冰醋酸ニ溶解シ硫酸五滴ヲ和スレハ無色ノ液

ヲ得ヘシ此液ニ一二滴ノ硝酸ヲ注意シテ滴入スレハ深藍色ヲ呈スヘシ  
注意シテ貯フヘシ

酸性芳香丁幾丟兒 芳香硫酸 Tinctura acida aromatica.

酸性芳香丁幾丟兒ハ

硫酸

十分

稀酒精

九十分

ヲ取り稀酒精ヲ攪拌シツツ徐徐ニ硫酸ヲ注加シ之ニ

桂皮粗末

五分

生薑粗末

五分

ヲ和シ五日間冷浸シ濾過シ製スヘシ

本品ハ澄明褐赤色ノ液ナリ

蘆薈丁幾丟兒 Tinctura Aloës.

蘆薈丁幾丟兒ハ

蘆薈粗末

一分

酒精

五分

ヲ取り冷浸シテ溶解スルニ至リ濾過シ製スヘシ

本品ハ暗褐色ノ液ニシテ甚シキ苦味ヲ有ス

複方蘆薈丁幾丟兒 Tinctura Aloës composita.

複方蘆薈丁幾丟兒ハ

蘆薈丁幾丟兒

密兒拉丁幾丟兒

泊芙蘭丁幾丟兒

各等分

ヲ取り混和シ製スヘシ  
本品ハ暗赤褐色ノ液ナリ

苦味丁幾丟兒 *Tinctura amara.*

苦味丁幾丟兒ハ

剉截セル橙皮

剉截セル龍膽

剉截セル菖蒲

稀酒精

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ

本品ハ澄明黃褐色ノ液ナリ

亞兒尼加丁幾丟兒 *Tinctura Arnicae.*

亞兒尼加丁幾丟兒ハ

剉截セル亞兒尼加花

稀酒精

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ

本品ハ澄明黃褐色ノ液ナリ

芳香丁幾丟兒 *Tinctura aromatica.*

芳香丁幾丟兒ハ

丁香

桂皮粗末

縮砂

剉截セル生薑

五分

五分

二分

百分

一分

十分

二分

十分

二分

五分

稀酒精

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ

本品ハ澄明赤褐色ノ液ナリ

阿魏丁幾丟兒 *Tinctura Asae foetidae.*

阿魏丁幾丟兒ハ

阿魏粗末

酒精

ヲ取り五日間冷浸シ濾過シ製スヘシ

本品ハ澄明帶黃褐赤色ノ液ナリ

橙皮丁幾丟兒 *Tinctura Aurantii.*

橙皮丁幾丟兒ハ

剉截セル橙皮

稀酒精

ヲ取り五日間冷浸シ濾過シ製スヘシ

本品ハ澄明類褐色ノ液ナリ

別刺敦那丁幾丟兒 *Tinctura Belladonnae.*

別刺敦那丁幾丟兒ハ

新タニ乾燥シ搗碎セル別刺敦那葉

稀酒精

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ

本品ハ澄明帶褐綠色ノ液ナリ

注意シテ貯フヘシ

百分

一分

五分

一分

五分

一分

五分

安息香丁幾丟兒 *Tinctura Benzoes.*

安息香粗末  
酒精

一分  
五分

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明帶黃赤褐色ノ液ナリ

羯答利斯丁幾丟兒 *Tinctura Cantharidis.*

羯答利斯粗末  
酒精

一分  
十分

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明黃褐色ノ液ナリ  
注意シテ貯フヘシ

葛斯加利刺丁幾丟兒 *Tinctura Cascariillae.*

葛斯加利刺末  
稀酒精

一分  
五分

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明赤褐色ノ液ナリ

阿仙藥丁幾丟兒 *Tinctura Calechu.*

阿仙藥末

一分

稀酒精

五分

ヲ取り五日間冷浸シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明暗褐色ノ液ナリ

規那丁幾丟兒 *Tinctura Cinchonae.*

規那末  
稀酒精

一分  
五分

ヲ取り十日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明赤褐色ノ液ナリ

桂皮丁幾丟兒 *Tinctura Cinnamomi.*

桂皮粗末  
稀酒精

一分  
五分

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明赤褐色ノ液ナリ

古爾矢屈謨丁幾丟兒 *Tinctura Colchici.*

古爾矢屈謨子粗末  
稀酒精

一分  
十分

ヲ取り十日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明黃色ノ液ナリ  
注意シテ貯フヘシ

古魯聖篤丁幾丟兒 *Tinctura Colocynthis.*

古魯聖篤丁幾丟兒ハ  
種子ヲ除キ剉截セル古魯聖篤  
稀酒精

一分  
十分

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明黄色ノ液ナリ  
注意シテ貯フヘシ

泊芙蘭丁幾丟兒 *Tinctura Croci.*

泊芙蘭丁幾丟兒ハ  
剉截セル泊芙蘭  
稀酒精

一分  
十分

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明暗橙黄色ノ液ナリ

實斐答利斯丁幾丟兒 *Tinctura Digitalis.*

實斐答利斯丁幾丟兒ハ

新タニ乾燥シ搗碎セル實斐答利斯  
稀酒精

一分  
十分

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明帶褐綠色ノ液ナリ  
注意シテ貯フヘシ

有加利布丟斯丁幾丟兒 *Tinctura Eucalypti.*

有加利布丟斯丁幾丟兒ハ

新タニ乾燥シ搗碎セル有加利布丟斯  
稀酒精

新タニ乾燥シ搗碎セル有加利布丟斯  
稀酒精

一分  
五分

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明帶褐綠色ノ液ナリ

依的兒性鐵丁幾丟兒 *Tinctura Ferri aetherae. Tinctura Nerviua Besluhegfti.*

依的兒性鐵丁幾丟兒ハ

過格魯兒化鐵液

依的兒

酒精

一分  
二分  
七分

ヲ取り混和シ圓筒形ノ白硝子壺ニ盛り密閉シ日光ニ曝シテ其褐黄色ノ全ク消失スルニ至リ陰處ニ移シ  
時時其蓋覆ヲ開キ更ニ鮮黄色ヲ呈スルヲ度トシ製スヘシ

本品ハ澄明鮮黄色ノ液ニシテ異重ハ〇・八五〇乃至〇・八五五ナリ其百分中一分ノ鐵ヲ含有ス

本品十立方「センチメートル」ニ醋酸加留誤溶液十立方「センチメートル」ヲ混和シ振盪シ靜置スレハ三立方「センチメートル」ノ依的兒性液ヲ析出スヘシ

五倍子丁幾丟兒 *Tinctura Gallae.*

五倍子丁幾丟兒ハ

五倍子粗末

稀酒精

一分  
五分

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明帶黄褐色ノ液ナリ

〇龍膽丁幾丟兒 *Tinctura Gentianae.*

龍膽丁幾丟兒ハ

剉截セル龍膽  
稀酒精

一分  
五分

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明帶黃赤褐色ノ液ナリ

癒瘡木丁幾丟兒 *Tinctura Guajaci.*

癒瘡木粗末

稀酒精

一分  
五分

ヲ取り五日間冷浸シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明暗赤褐色ノ液ナリ

葯刺巴丁幾丟兒 *Tinctura Jalapae.*

葯刺巴根末

稀酒精

一分  
十分

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明類褐色ノ液ナリ

沃度丁幾丟兒 *Tinctura Iodi.*

沃度

酒精

一分  
十分

ヲ取り壘中ニ容レ硝子栓ヲ以テ密閉シ沃度ノ全ク溶解スルニ至ル迄冷浸シ製スヘシ  
本品ハ澄明暗赤褐色ノ液ニシテ沃度ノ臭氣ヲ有シ熱ニ逢フテ全ク揮散ス異重ハ〇・八九五乃至〇・九〇

ナリ

本品ニ五蘭謨ニ沃度化加留謨〇・五五蘭謨水二十五立方センチメートルヲ混和セルモノヲ褪色スルニ  
ハ十分定規次亞硫酸那篤留謨液十二・五乃至十四・五立方センチメートルヲ費サ、ル可カラズ  
壘中ニ容レ硝子栓ヲ以テ密閉シ注意シテ貯フヘシ

〇吐根丁幾丟兒 *Tinctura Ipecacuanhae.*

吐根丁幾丟兒ハ

吐根末

一分  
十分

稀酒精

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明帶赤褐色ノ液ナリ

注意シテ貯フヘシ

複方刺賢堉爾丁幾丟兒 *Tinctura Lavandulae composita.*

複方刺賢堉爾丁幾丟兒ハ

搗碎セル桂皮

二十分

搗碎セル肉豆蔻

十分

搗碎セル丁香

四分

紫檀末

十分

酒精

七百分

常水

三百分

ヲ取り五日間冷浸シ壓濾シ其濾液ニ

刺賢堉爾油

八分

迷迭香油

二分

ナ和シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明暗赤色ノ液ニシテ其香氣ハ佳快芳香性ナリ

魯別利亞丁幾丟兒 *Tinctura Lobeliae.*

搗碎セル魯別利亞  
稀酒精

一分  
十分

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明帶褐綠色ノ液ナリ

注意シテ貯フヘシ

密兒拉丁幾丟兒 *Tinctura Myrrhae.*

密兒拉細末  
酒精

一分  
五分

ヲ取り五日間冷浸シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明帶褐赤黃色ノ液ニシテ水ヲ加フレハ乳濁ス

阿片丁幾丟兒 *Tinctura Opii.*

阿片末  
酒精

一分  
五分  
五分

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明赤褐色ノ液ナリ

注意シテ貯フヘシ

本品十分中ニハ阿片末一分ノ可溶成分ヲ含有ス  
注意シテ貯フヘシ

阿片安息香丁幾丟兒 *Tinctura Opii benzoica.*

阿片末

一分

安息香酸

四分

樟腦

二分

茴香油

一分

稀酒精  
ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明淡褐黃色ノ液ニシテ其二百分中ニハ阿片末一分ノ可溶成分ヲ含有ス  
注意シテ貯フヘシ

林檎鐵丁幾丟兒 *Tinctura Pomi ferrata.*

林檎鐵丁幾丟兒ハ

一分

林檎鐵越幾斯篤拉屈篤  
ヲ取り

酒精

二分  
七分

桂皮水  
ノ混液ニ溶解シ濾過シ製スヘシ

本品ハ澄明暗褐色ノ液ナリ

括矢亞丁幾丟兒 *Tinctura Quassiae.*

括矢亞丁幾丟兒ハ

細剉セル括矢亞  
稀酒精

一分  
五分

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明淡褐黄色ノ液ナリ

大黃丁幾丟兒 *Tinctura Rhei.*

大黃丁幾丟兒ハ

大黃粗末

桂皮粗末

搗碎セル縮砂

酒精

常水

十分  
一分  
一分  
五十分  
五十分

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明帶褐黄色ノ液ナリ

番木髓丁幾丟兒 *Tinctura Strychni. Tinctura Nucis vomicae.*

番木髓丁幾丟兒ハ

番木髓末

稀酒精

一分  
十分

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明黄色ノ液ナリ  
注意シテ貯フヘシ

纈草丁幾丟兒 *Tinctura Valerianae.*

纈草丁幾丟兒ハ

細剉セル纈草

稀酒精

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明帶黄褐色ノ液ナリ

生薑丁幾丟兒 *Tinctura Zingiberis.*

生薑丁幾丟兒ハ

生薑粗末

稀酒精

生薑粗末

搗碎セル縮砂

酒精

常水

十分  
一分  
一分  
五十分  
五十分

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明帶黄褐色ノ液ナリ

生薑丁幾丟兒 *Tinctura Zingiberis.*

生薑丁幾丟兒ハ

生薑粗末

稀酒精

一分  
十分

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明帶黄褐色ノ液ナリ

生薑丁幾丟兒 *Tinctura Zingiberis.*

生薑丁幾丟兒ハ

生薑粗末

稀酒精

一分  
十分

細剉セル纈草

稀酒精

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明帶黄褐色ノ液ナリ

生薑丁幾丟兒 *Tinctura Zingiberis.*

生薑丁幾丟兒ハ

生薑粗末

稀酒精

生薑粗末

ヲ取り五日間冷浸シ壓搾シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明帶黄褐色ノ液ナリ

生薑丁幾丟兒 *Tinctura Zingiberis.*

生薑丁幾丟兒ハ

生薑粗末

稀酒精

一分  
十分

達刺侃篤護謨ハ本植物ノ小幹ヨリ出ツル粘液ノ乾涸セルモノニシテ帶狀ノ小片ヲ爲シ或ハ弧狀ノ紋理  
ヲ有スル鍊狀ノ小板片ヲ爲ス  
本品ハ柔軟角質様半透映白色ノ物質ニシテ粉碎シ難ク水中ニハ大ニ膨起ス其粉末ヲ五十分ノ水ニ和ス  
レハ溷濁淡味ノ粘漿ヲ爲スヘシ

鞣酸錠 *Trochisci Acidi tannici.*

鞣酸錠ハ

鞣酸

白糖細末

五分  
九十五分

ヲ取り親密ニ混和シ稀酒精ヲ以テ之ヲ濡ホシ壓ヲ加フレハ結合スヘキニ至リ各一瓦蘭謨ノ重量ヲ有ス  
ル錠子ト爲シ製スヘシ

本品ノ一錠子ニハ〇・〇五瓦蘭謨ノ鞣酸ヲ含有ス

乳酸鐵錠 Trochisci Ferri Lactalis.

乳酸鐵ハ

白糖細末

五分

白糖細末

九十五分

ヲ取り親密ニ混和シ稀酒精ヲ以テ之ヲ濡ホシ壓ヲ加フレハ粘合スヘキニ至リ各一瓦蘭謨ノ重量ヲ有ス  
ル錠子ト爲シ製スヘシ

本品ノ一錠子ニハ〇・〇五瓦蘭謨ノ乳酸鐵ヲ含有ス

吐根錠 Trochisci Ipecacuanhae.

吐根錠ハ

吐根末

一分

白糖細末

九十九分

ヲ取り親密ニ混和シ稀酒精ヲ以テ之ヲ濡ホシ壓ヲ加フレハ粘合スヘキニ至リ各一瓦蘭謨ノ重量ヲ有ス  
ル錠子ト爲シ製スヘシ

本品ノ一錠子ニハ〇・〇一瓦蘭謨ノ吐根ヲ含有ス

格魯兒酸加留謨錠 Trochisci Kali Chloratis.

格魯兒酸加留謨錠ハ

格魯兒酸加留謨細末

十分

ヲ取り之ニ

白糖細末

九十分

ヲ最モ注意シテ親密ニ混和シ稀酒精ヲ以テ之ヲ濡ホシ壓ヲ加フレハ粘合スヘキニ至リ各一瓦蘭謨ノ重  
量ヲ有スル錠子ト爲シ製スヘシ

本品ノ一錠子ニハ〇・一瓦蘭謨ノ格魯兒酸加留謨ヲ含有ス

重炭酸那篤留謨錠 Trochisci Natrii Bicarbonatis.

重炭酸那篤留謨錠ハ

重炭酸那篤留謨細末

十分

白糖細末

九十分

ヲ取り親密ニ混和シ稀酒精ヲ以テ之ヲ濡ホシ壓ヲ加フレハ粘合スヘキニ至リ各一瓦蘭謨ノ重量ヲ有ス  
ル錠子ト爲シ製スヘシ

本品ノ一錠子ニハ〇・一瓦蘭謨ノ炭酸那篤留謨ヲ含有ス

珊篤寧錠 Trochisci Santonini.

珊篤寧錠ハ

珊篤寧細末

五分

白糖細末

九十五分

ヲ取り親密ニ混和シ稀酒精ヲ以テ之ヲ濡ホシ壓ヲ加フレハ粘合スヘキニ至リ各一瓦蘭謨ノ重量ヲ有ス  
ル錠子ト爲シ製スヘシ

本品ノ一錠子ニハ〇・〇五瓦蘭謨ノ珊篤寧ヲ含有ス

注意シテ貯フヘシ

別刺敦那軟膏 Unguentum Belladonnae.

別刺敦那軟膏ハ

別刺敦那越幾斯篤拉屈篤

一分

ヲ取り少量ノ水ニ研和シテ稀薄越幾斯篤拉屈篤ノ稠ト爲シ之ニ

豚脂

九分

ヲ混和シ製スヘシ

用ニ臨テ調製スヘシ

羯答利斯軟膏 *Unguentum Cantharidis.*

羯答利斯軟膏ハ

搗碎セル羯答利斯

ヲ取り之ニ

阿列布油

二分

ヲ混和シ重湯煎上ニ八時間温浸シ壓濾シ

其濾液

八分

ニ就キ

豫メ熔融セル黄蠟

七分

ヲ混和シ冷却スルニ至ル迄攪拌シ製スヘシ

本品ハ黄色ノ軟膏ナリ

歇貌拉氏軟膏 *Unguentum diachylon.*

歇貌拉氏軟膏ハ

單鉛硬膏

三分

亞麻仁油

一分

ヲ取り瓷器ニ盛り重湯煎上ニ熔和シテ冷却スルニ至ル迄攪拌シ製スヘシ  
用ニ臨テ調製スヘシ

倭里設林軟膏 *Unguentum Glycerini.*

倭里設林軟膏ハ

澱粉

一分

常水

一分

倭里設林

九分

ヲ取り先ツ澱粉ヲ善ク水ニ攪和シ之ヲ倭里設林ニ合シタル後全質均同殆ト透映ニシテ冷後軟膏狀ヲ呈  
スルニ至ル迄百四十度ヲ超エサル熱ヲ與ヘ絶エス攪拌シテ製スヘシ

○水銀軟膏 *Unguentum Hydrargyri.*

水銀軟膏ハ

水銀

十分

豚脂

十五分

黄蠟

五分

ヲ取り微温ヲ與ヘテ豚脂ト蠟トヲ熔和シ冷後先ツ其熔和物三分ヲ取り少許ツツ水銀ヲ加ヘテ研磨シ復  
タ肉眼ヲ以テ水銀球ヲ見サルニ至リ熔和物ノ殘餘ヲ加ヘ最モ親密ニ研和シ製スヘシ  
本品ハ帶藍灰色ノ軟膏ニシテ肉眼ヲ以テ水銀球ヲ見ル可カラズ  
本品全量ノ三分一ハ水銀ヨリ成ルモノトス

黄色酸化汞軟膏 *Unguentum Hydrargyri Oxydi Flav.*

黄色酸化汞軟膏ハ

黄色酸化汞

一分

ヲ取り徐徐ニ

華攝林

九分

ヲ加ヘ最モ親密ニ研和シ製スヘシ

用ニ臨テ調製スヘシ

赤色酸化汞軟膏 *Unguentum Hydrargyri Oxydi Rubri.*

赤色酸化汞軟膏ハ

赤色酸化汞

一分

ヲ取り徐徐ニ  
華攝林

九分

ヲ加ヘ最モ親密ニ研和シ製スヘシ  
用ニ臨テ調製スヘシ

沃度化加留謨軟膏 *Unguentum Kalii Iodidi.*

沃度化加留謨

二十分

炭酸加留謨

一分

ヲ取り

蒸餾水

十分

ヲ以テ善ク研和シタル後

華攝林

百七十分

ヲ加ヘ最モ親密ニ研和シ製スヘシ  
用ニ臨テ調製スヘシ

次醋酸鉛軟膏 鉛軟膏 *Unguentum Plumbi Subacetatis.*

次醋酸鉛軟膏ハ

豚脂

九十二分

ヲ取り之ニ

次醋酸鉛液

八分

ヲ混和シ製スヘシ

本品ハ白色ノ軟膏ナリ

之ヲ貯フルコト久シキニ過ク可カラズ

○單軟膏 *Unguentum simplex.*

單軟膏ハ

黃蠟

一分

阿列布油

二分

ヲ取り重湯煎上ニ熔和シ冷却スルニ至ル迄攪拌シ製スヘシ  
本品ハ黄色ノ軟膏ナリ

吐酒石軟膏 *Unguentum sibiatum.*

吐酒石軟膏ハ

極メテ微細ニ研末セル吐酒石

二分

華攝林

八分

ヲ取り親密ニ混和シ製スヘシ  
用ニ臨テ調製スヘシ

硫黃軟膏 *Unguentum Sulphuris.*

硫黃軟膏ハ

昇華硫黃

一分

豚脂

二分

ヲ取り徐徐ニ豚脂ヲ硫黃ニ加ヘ全質均同ノ軟膏ヲ得ルニ至ル迄親密ニ研和シ製スヘシ  
本品ハ枸橼黄色ノ軟膏ナリ

酸化亞鉛軟膏 *Unguentum Zinci Oxydi.*

酸化亞鉛軟膏ハ

酸化亞鉛

一分

ヲ取り微細ニ研末シ徐徐ニ

豚脂

ヲ研和シ製スヘシ

九分

本品ハ全質均同ナル白色ノ軟膏ナリ

烏華烏爾矢 *Uva Ursi*

*Arctostaphylos Uva Ursi Spreng.*

烏華烏爾矢ハ倒卵圓形革様ノ葉ニシテ長サ二「センチメートル」ニ至リ其邊緣闕裂ナク兩面光澤ヲ帶ヒ毛茸ナク網狀ノ脈理ヲ有シ葉柄ハ短シ味ハ稍苦ク收斂性ナリ

續草 *Valeriana*

*Valeriana officinalis Linn.*

續草ハ太サ二「センチメートル」長サ四「センチメートル」ノ根莖ニ長キ多數ノ根ヲ帶フルモノニシテ其根ハ褐色ヲ有シ太サ二「ミリメートル」ニ至リ其橫截面ニハ纖細ナル木心ヲ有シ甚タ厚キ類白色ノ外皮ヲ以テ之ヲ圍繞ス

本品ハ特異峻烈ノ臭氣ヲ有シ味ハ微苦香味料様ナリ

華攝林 *Vaselinum*

華攝林ハ白色乃至淡類黃色半透映軟膏稱ノ塊ニシテ大約四十度ノ温ニ於テ熔融シ充分澄明中性ノ液ト爲ル異重ハ大約〇・八五ナリ水ニハ全ク溶解セス冷酒精ニハ殆ト溶解セサレトモ依的兒嘒囉仿謨硫化炭素的列並底油、脂肪油及揮發油ニハ容易ニ溶解ス白金板上ニ熱スレハ固性物ヲ殘留セスシテ揮散スヘシ

本品五瓦蘭謨ヲ那篤倫油液二十五瓦蘭謨ニ和シ振盪シテ半時間温浸シタル後同容量ノ水ヲ混和シ充分放冷シ濾過シテ得タル液ヲ稀硫酸ニテ過飽スルモ沈澱ヲ生シ又ハ油狀ノ物質ヲ析出ス可カラス

勿拉篤里涅 *Veratrinum*

勿拉篤里涅ハ白色疎鬆ノ粉末ニシテ其粉塵ヲ嗅入スレハ劇烈ノ噴嚏ヲ起シ熱湯ニハ熔融セスシテ僅ニ溶解ス其溶液ハ味苛烈ニシテ苦カラス弱亞爾加里性ノ反應ヲ徵ス四分ノ酒精、二分ノ嘒囉仿謨及大約

六分ノ依的兒ニ溶解シテ亞爾加里性ノ液ト爲リ又容易ク稀酸類ニ溶解ス本品ヲ熱灼スレハ熔融シ次テ炭化シ終ニ固性物ヲ殘留セスシテ全ク燃化スヘシ  
本品ニ鹽酸ヲ加ヘテ煮沸スレハ血紅色ノ液ヲ生スヘシ又大約百分ノ硫酸ヲ加ヘテ研和スレハ帶綠黃色ノ螢石彩ヲ現ハシ次テ紅色ヲ呈スヘシ  
最モ注意シテ貯フヘシ

苦味酒 *Vinum amarum*

苦味酒ハ

龍膽越幾斯篤拉屈篤

一分

葛斯加利刺越幾斯篤拉屈篤

一分

ヲ取リ

設利酒

十九分

ニ研和シ之ニ

橙皮丁幾丟兒

八分

ヲ加ヘ濾過シ製スヘシ

本品ハ澄明暗褐色ノ液ナリ

規那酒 *Vinum Cinchonae*

規那酒ハ

規那末

十分

設利酒

八十分

俚里設林

二十分

ヲ取リ二十日間冷浸シ濾過シ製スヘシ  
本品ハ澄明褐色ノ液ナリ

○古爾矢屈謨酒 Vinum Colehiei.

古爾矢屈謨酒ハ

古爾矢屈謨子粗末

設利酒

一分  
十分

ヲ取り十日間冷浸シテ後壓漉シ漉液ヲ濾過シ製スヘシ

本品ハ澄明黄褐色ノ液ナリ

注意シテ貯フヘシ

鐵酒 Vinum Ferri.

枸橼酸鐵安母紐謨

二分

ヲ取り

白葡萄酒

九十八分

ニ溶解シ濾過シ製スヘシ

本品ハ澄明黄褐色ノ液ナリ

吐根酒 Vinum Ipecacuanhae.

吐根酒ハ

吐根末

設利酒

一分  
十分

ヲ取り十日間冷浸シテ後壓漉シ漉液ヲ濾過シ製スヘシ

本品ハ澄明黄褐色ノ液ナリ

注意シテ貯フヘシ

○芳香阿片酒 舍電華模氏阿片液

Vinum Opii crocatum. Laudanum liquidum Sydenhami.

芳香阿片酒ハ

剉截セル泊芙蘭

桂皮粗末

丁香粗末

稀酒精

設利酒

四分  
一分  
一分  
七分  
八十五分

ヲ取り五日間冷浸シテ後壓漉シ次ニ

其漉液

ヲ取り之ニ

阿片末

一分

ヲ加ヘ更ニ五日間冷浸シテ後壓漉シ漉過シ製スヘシ

本品ハ泊芙蘭様暗黄褐色澄明ノ液ナリ

本品十分ハ阿片末一分ノ可溶成分ヲ含有ス

注意シテ貯フヘシ

百弗聖酒 Vinum Pepsini.

百弗聖酒ハ

含糖百弗聖

俚里設林

常水

百分  
五十分  
五十分

ヲ取り研和シテ稀粥狀ト爲シ之ニ

鹽酸

白葡萄酒

五分  
千八百分