

[illegible][illegible]

非検査人員 無卵者驅除不必要ノモノ十九名 驅除後二回無卵検査必要ナキモノ七名 事故及病氣ノモノ四六名 計七十二名

（驅除後第四回）

[illegible]

非検査人員 無卵者驅除不必要ノ者十九名 驅除後二回又ハ三回検査ニ無卵不必要ナ者十七名 孕及病氣七十六名 前百十二名

（驅除後第五回）

[illegible]

[illegible]

第一表

非檢查人員

無卵者驅除不必要ノ者十九名

驅除後二回又ハ三回無卵ニテ検査不必要ノモノ十七名

事故又八病氣百三十一名 計百六十七名

一般住民回次ニ依リ分チタル寄生蟲卵検査成績比較														
檢査	回次	人員	無卵者		有卵者		同 上							
			人員	百分比	人員	百分比	内 容							
							有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比
							蠅	十二指腸蟲	東洋毛櫟	橫川吸蟲	鞭蟲	蟻	蟲	
驅除前第一回	一八八	三九	二〇七	一〇九	二二	一〇五	一	〇・五	一	一	〇・五	一	一	〇・五
同第二回	一八八	四二	二二八	一七〇	二五	一四・四	二	〇・五	一	一	〇・五	一	一	〇・五
同第三回	一五九	四二	二四〇	一三六	三三	一三・三	二	〇・五	一	一	〇・五	一	一	〇・五
三回平均	一五三	四二	二四〇	一三六	三三	一三・三	二	〇・五	一	一	〇・五	一	一	〇・五
驅除後第一回	二六六	四二	二七七	一七四	四八	一四・八	三	〇・五	一	一	〇・五	一	一	〇・五

同 第二回	同 第三回	同 第四回	同 第五回	五 同 平均	第二回 驅除 後	第三回 同
一六	二三	八三	二八	一六	一六	九
四二	三七	〇	四	九	三	七
六・三	三・〇	二・四	二・四	二・八	二・四	二・七
一五	六	三	二	二	二	六
七・七	六・〇	七・五	八・五	七・五	九・三	七・六
六	七	四	一	三	七	三
五・二	六・二	五・八	六・九	五・四	八・二	三・六
二	五	四	一	九	四	四
七・七	四・二	四・八	八・九	八・五	四・三	四・二
六	四	二	六	七	二	二
三・八	三・三	二・四	三・七	六・六	二・一	二・一
一	一	一	一	一	一	一
〇・八	〇・八	〇・八	〇・八	〇・八	〇・八	〇・八
六	五	四	一	八	七	五
九・七	四・九	五・〇	六・三	七・〇	八・三	六・八
一	一	一	一	一	一	一
一・三	〇・九	〇・九	〇・九	〇・九	〇・九	〇・九

驅除前及第一次驅除後を通じて十二指腸蟲有卵者は八回の検査をしたけれども其の度毎に事故不參者ありて人員に動搖があるので住民全體の蟲卵保有者を確實に知ることが出来ない故に住民百九十五人中一回でも検査を受けた者を検査人員とし一回でも有卵者となつた者を有卵者として調査した左表を作製した(第十二表参照) 蟲卵別に於ても一回でも蛔蟲卵を排出したものは蛔蟲有卵者に數へ十二指腸蟲卵其の他も其のやうに取扱つて調査した即ち之に依つて善入部落の確實なる有卵率を得、確實なる各種蟲卵の保有者を知ることが出來た。即ち左のやうである。

要	項	實數	要	項	實數
檢査人員ニ對 スル百分比	二・一・八	四二	十二指腸蟲有卵者	東洋毛線蟲有卵者	一一・三
檢査人員ニ對 スル百分比	七・二・〇	一四	橫川吸蟲有卵者	鞭蟲有卵者	二・一・一
檢査人員ニ對 スル百分比	九・八	一九	無卵者	有卵者	一四九
檢査人員ニ對 スル百分比	九〇・二	一七四	蛔蟲有卵者	蟲有卵者	一四九
檢査人員ニ對 スル百分比	七七・二	一九三	蛔蟲有卵者	蟲有卵者	一四九

之を見るに普入の住民有卵率は九〇%以上を示し非常に高い即ち内務省に於ける農村保健調査成績では寄生蟲卵保有者は七八・三%を示し十二指腸蟲は二二・三%、蛔蟲は六七・三%鞭蟲は三九・九%と云ふ成績である。

此の平均と比較する時善入は十二指腸蟲に於て稍佳良であるが他の何れもは遙かに高率を示してゐる。男女別に之を考察するに男八九%女九〇%で殆ど有卵率は等しい蟲卵別に見る時は蛔蟲有卵者に於て女僅に高く十二指腸蟲有卵者では男が稍高い此の傾向は内務省で調査したる農村保健調査寄生蟲有卵率と等しい。

(第十二表参照)

調査寄生蟲有卵率と等しい。
(第十二表参照)

今各年齢階級から其の感染の有様を見るのに一歳から五歳に至る年齢階級では約五割強の有卵率を見、六歳以上四十歳迄の年齢階級では十割の

有卵率である。四〇歳以上では七割以上八、九割で稍低し。
又住民全體からの百分比を見れば六歳以上十五歳未満者に於て各一〇%強を占め四〇歳階級の壯年者と七〇歳以上の高年齢の者が三%強を占めてゐる其の割合左表のやうである。

住民全體ニ對スル寄生蟲感染率				年 齡 別			
年 齡 別	検査人員	有卵者	各年齢別検査人員ニ對スル百分比	年 齡 別	検査人員	有卵者	各年齢別検査人員ニ對スル百分比
一歳—五歳	二六	一四	五三・八	一歳—四歳	一八	一六	七五・〇
六歳—一〇歳	二一	一一	一〇・九	五歳—一〇歳	一一	一〇	八四・六
一一歳—一五歳	二一	一一	一〇・九	一〇歳—一五歳	一〇	一〇	一〇〇・〇
一六歳—二〇歳	一三	一一	八四・六	一五歳—二〇歳	八	八	一〇〇・〇
二一歳—二五歳	一九	一三	六七・七	二〇歳—二五歳	九	八	八八・九
二六歳—三〇歳	一八	一三	七二・二	二五歳—三〇歳	六	六	一〇〇・〇
三一歳—三五歳	一八	一三	七二・二	三〇歳—三五歳	四	三	七五・〇
三六歳—四〇歳	八	八	一〇〇・〇	三六歳—四〇歳	四	三	七五・〇
合計	一九三	一七四	九〇・二	合計	一九三	一七四	九〇・二

又家族別に之を見ると第十三表に於て見る如く有卵者が殆ど全家族に及んでゐるものが大部分で家族感染と見るべきである。それは第二三(家族番號)に於ける七人の有卵者中七人まで十二指腸蟲有卵者である。例のやうに第三(家族番號)第七(家族番號)第二四(家族番號)第二七(家族番號)に表れたやうに一家族中の大部分は十二指腸蟲有卵者である如く又東洋毛線蟲に於ても第二四(家族番號)に見る如く一家四人の内三名迄此の蟲卵の保有者である例を見るこれ一家族の食物の等しき又用水の等しき働くべき耕地用ゆべき肥料等も同じ關係により一家族に感染するものと思はれる。(第十三表参照)

第一一二表

一般住民寄生蟲有卵率調査				同 上			
年 齡 別	性 別	要 項	検査人員	有卵者	検査人員	有卵者	検査人員
一歳—五歳	女	人員	三三	有卵者	人員	三三	有卵者
六歳—一〇歳	男	人員	三九	有卵者	人員	三九	有卵者
一一歳—一五歳	女	人員	三三	有卵者	人員	三三	有卵者
一六歳—二〇歳	男	人員	三三	有卵者	人員	三三	有卵者
二一歳—二五歳	女	人員	三三	有卵者	人員	三三	有卵者
二六歳—三〇歳	男	人員	三三	有卵者	人員	三三	有卵者
三一歳—三五歳	女	人員	三三	有卵者	人員	三三	有卵者
三六歳—四〇歳	男	人員	三三	有卵者	人員	三三	有卵者
合計	女	人員	三三	有卵者	人員	三三	有卵者
合計	男	人員	三三	有卵者	人員	三三	有卵者

第一一三表

一般住民家族別ニ調査シタル寄生蟲検査成績				同 上			
年 齡 別	性 別	要 項	検査人員	有卵者	検査人員	有卵者	検査人員
一歳—五歳	女	人員	三三	有卵者	人員	三三	有卵者
六歳—一〇歳	男	人員	三九	有卵者	人員	三九	有卵者
一一歳—一五歳	女	人員	三三	有卵者	人員	三三	有卵者
一六歳—二〇歳	男	人員	三三	有卵者	人員	三三	有卵者
二一歳—二五歳	女	人員	三三	有卵者	人員	三三	有卵者
二六歳—三〇歳	男	人員	三三	有卵者	人員	三三	有卵者
三一歳—三五歳	女	人員	三三	有卵者	人員	三三	有卵者
三六歳—四〇歳	男	人員	三三	有卵者	人員	三三	有卵者
合計	女	人員	三三	有卵者	人員	三三	有卵者
合計	男	人員	三三	有卵者	人員	三三	有卵者

一般住民家族別ニ調査シタル寄生蟲検査成績

家族番號	家族		同 上								内			
	人員	無卵者	有卵者	蛔蟲	十二指腸蟲	東洋毛線蟲	橫川吸蟲	鞭蟲	蟯蟲					
人員	百分比	人員	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比					
一	五	100.0	五	100.0	一	100.0	一	100.0	一					
二	五	100.0	二	100.0	一	100.0	一	100.0	一					
三	七	100.0	一	100.0	一	100.0	一	100.0	一					
四	五	100.0	一	100.0	一	100.0	一	100.0	一					
五	三	100.0	一	100.0	一	100.0	一	100.0	一					
六	八	100.0	一	100.0	一	100.0	一	100.0	一					
七	八	100.0	一	100.0	一	100.0	一	100.0	一					
八	六	100.0	一	100.0	一	100.0	一	100.0	一					
九	六	100.0	一	100.0	一	100.0	一	100.0	一					
一〇	六	100.0	一	100.0	一	100.0	一	100.0	一					
一一	六	100.0	一	100.0	一	100.0	一	100.0	一					
一二	六	100.0	一	100.0	一	100.0	一	100.0	一					
一三	四	100.0	一	100.0	一	100.0	一	100.0	一					
一四	四	100.0	一	100.0	一	100.0	一	100.0	一					
一五	五	100.0	一	100.0	一	100.0	一	100.0	一					
一六	三	100.0	一	100.0	一	100.0	一	100.0	一					
一七	五	100.0	一	100.0	一	100.0	一	100.0	一					

[illegible]

備考 一、家族人員ノ中ノ欠席者ハ計算ニ算入セズ 二、括弧内ハ驅除セラレシ人員ヲ示ス

八、一種及多種寄生蟲有卵者の調査

一種卵以上多種有卵者を見るに一種有卵者は検査人員一九三名中四七名で全検査人員二四・四%を示す。二種有卵者は八三名で四三%を占めて

而して三種卵、四種卵、の保有者は殆ど十二指腸蟲の有卵者である。

(第十四表參照) (第十五表參照)

内務省保健調査に於ける農村寄生蟲有卵者の統計を見るに一種有卵者三四%強二種有卵者三一%強三種有卵者一〇%強であるのに比べると聳入に於ては二種卵三種卵の保有者が甚だ高率であると認められる。

第一四表

[illegible]

第一五表

卵種四		卵種三			
十二指股蟲、 蠅、 蠅、 蟲蟲	十蠅二指、 蟲、 東鞭洋、 蟲毛蟲	蟪蠅 洋蟲、 毛糞線 蟲蟲	東蠅 蟲、 糞穢線 蟲蟲	橫蠅 川蟲、 吸鞭 蟲蟲	十蠅二蟲、 東指洋毛 腸糞線 蟲蟲
女男	女男	女男	女男	女男	女男
三 三四		一 三一 一 三			
三 七		一 四 一 三			
一・六 三・九		〇・五 二・一 〇・五 一・五			
一〇		三四			
五・二		一七・七			

體性別及年齡別、一種及多種寄生蟲有卵者調查

[illegible]

合 計	三 種 有 卵 者												四 種 有 卵 者											
	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男
三六歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
四〇歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
四一歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
四四歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
四六歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
五〇歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
五一歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
五五歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
五六歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
六〇歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
七一歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
七〇歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
八〇歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
八一歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
合 計	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	

		三 種 有 卵 者										四 種 有 卵 者			
		人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比
一歲以上	女	12	33.3	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2
一歲未滿	女	12	33.3	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2
六歲以上	女	12	33.3	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2
一〇歲未滿	女	12	33.3	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2
一歲以上	男	12	33.3	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2
一五歲未滿	男	12	33.3	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2
一六歲以上	男	12	33.3	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2
二〇歲未滿	男	12	33.3	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2
二一歲以上	男	12	33.3	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2
二五歲未滿	男	12	33.3	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2
二六歲以上	男	12	33.3	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2
三〇歲未滿	男	12	33.3	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2
合 計		12	33.3	12	33.3	12	33.3	12	33.3	12	33.3	12	33.3	12	33.3

合 計	三 種 有 卵 者												四 種 有 卵 者											
	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男
三六歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
四〇歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
四一歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
四四歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
四六歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
五〇歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
五一歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
五五歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
五六歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
六〇歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
七一歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
七〇歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
八〇歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
八一歳以上	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
合 計	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一

備考 蠅蟲ヲ發見セシモノ十五名アリタリ

九、各蟲卵別驅除成績

△ 十二指腸蟲其他の驅除 (主藥チモール服用)

第一次服藥後の成績に就ては前掲の第六表から第十一表に至る驅除後の成績表によつて其の概要を説明したが今各種蟲卵別驅除藥別によつて個人表を参照しつゝ説明する。

(イ) 十二指腸蟲驅除状況 (主藥チモール服用)

之を蟲卵別に見るときは十二指腸蟲では服藥人員男女計三十六人の内第二日の検便では二九名の無卵者を見此の率は八〇・六%を示す。

大正十三年に於ける千葉縣衛生課發表驅蟲検査成績表

驅蟲劑 チモール、ナフタリン (チモール一・〇 ナフタリン〇・五 ゲンチヤナ米〇・三)
下劑 硫酸マグネシア一〇・〇

此の結果に於て六〇%乃至八五%の驅蟲率を示す (検査ハ服藥後十日ヲ經テナセリ)

右のやうに「チモール」を驅除主薬となせる千葉縣發表の成績と凡匹敵するのを見るけれども驅除後第二回目の検査では（第十六表の個人表参照）以前に無卵者であつたので再び有卵者となつたもの六名表はれた爲に無卵者は二十四名となり率に於ては六六・二％となり、二回目で其の率が低くなつてゐる。（第十六表個人表参照）

而して第一次驅除後一回も蟲卵を認めなかつたものと最後一回又は二回引續きて蟲卵を認めなかつたものを驅除せられたものとするれば男一二人女一二人計二十四人で此の百分率は六六・七となる。（第十六表個人表参照）

此の調査を見て考へる時は驅除藥服用後一回検査した結果を以て驅除せられた人員を定めるのは確實なものと認めることが出来ないと云ふことが立證されたのである。

即ち第一次驅除成績で四回を通じて無卵者となつたものを除いて再び（十月四日）服藥させ第二次驅除成績を見たのに第一次に於て二回連續して無卵者となつたもので猶卵の排出を見たものが三名あつた。之を以て見ても只一回の検査で無卵者と認めることの誤りを裏書したとも云ふことが出来る。

（第二次驅除では糞便を提出したもの少なく比率を見るべき價値を認めず之をばく）

第三次驅除には前夜（十月三十日）夕食を廢し左の下劑を與へた。

硫 麻	二〇・〇	カスカラサクラダ流動エキス	〇・五
苦 丁	一・〇	稀 鹽 酸	〇・五
水	一〇〇・〇		

翌朝食前に

チモール 二・〇（〇・五入カプセル四個）

右を服用させ三十分乃至一時間以内に

ネマトール 〇・七（カプセル八）

右を服用させ更に一時間を経て前記の下劑を増量して與へ二時間後に排便のないものは浣腸した。

之を二日間隔で反覆し而して二週間後の十一月十九日に検卵し三週を経た十一月二十六日に再び検卵した。

（ロ） 蛔蟲驅除状況（チモール服用の者）

蛔蟲有卵者で「チモール」を主薬とした驅除藥を服用させた者は何れも十二指腸蟲の併有者である。今此の驅除藥が蛔蟲に對して如何なる

効力を有するかを第十七表個人表によつて考察したいと思ふ。

即ち服藥後第一回検査で蟲卵を認めなかつた者で引續き蟲卵を認めないものは三六・％四を示す。而して服藥直後の検査で蟲卵を認めたけれども第二回目の検査で無卵者となりたるものは二名あつたが其の二名は第二次驅除後の検査で再び卵を認めた。

又第一次驅除後の検査で二回又は三回連續して無卵者となつたもの、中に第二次服藥後再び蟲卵を見たものが二人あつた。

要するに「チモール」を主薬とせる驅除藥では蛔蟲の驅除成績は四五％内外を出です。（第十七表個人表参照）然して無卵者となりたる十二名を個人表によつて觀察するのに大體一視野中の蟲卵數の少ない者である。

又驅除前三回の検査中無卵の場合があつた者等に於て驅除藥の効力の確實なるを示し一視野中の蟲卵數の多いもの即ち感染度の濃き者に對しては驅除藥の効力が概して表はれ難いやうである。（第十七表個人表参照）

第二次驅除は前と同じく十二指腸蟲卵を併有せる者には「チモール」を主薬とし驅除を行つたが其の成績は九・一を示し良好でなかつた。

（ハ） 其の他の蟲卵の驅除状況（主薬チモール服用）

(1) 鞭蟲に就て

鞭蟲有卵者で「チモール」を服用したるものは何れも十二指腸蟲卵併有者である。

「チモール」を主薬とした驅除藥の鞭蟲に對する効力は二九・〇％を示す而して服藥後無卵者となつた者は孰れも一視野中の蟲卵數の少ないものである上に驅除前三回の検査で一回或は二回無卵となつた者で蟲卵保有の極く少ないと認められるものである。

（第十八表個人表参照）

而して第一次驅除後の成績で二回無卵となつた者で第二次服藥後の検査で五名の内二名迄再び蟲卵を認めた。（第十八表個人表参照）

此の普入の場合で見るとは鞭蟲に對して「チモール」の効力は餘り良好と認め難いやうに思はれる。

(2) 東洋毛線蟲に就て

東洋毛線蟲有卵者で所定の服藥をなし且確實に驅除後の検査を受けた者は十二名の少數であるから統計として價値が薄いけれども驅除状況を觀察すると十二名の内六名驅除された。驅除率は五〇・〇％を示してゐる。

尙茲に注意したいことは驅除直後に於ては無卵者非常に多く服藥人員十二名中九名迄蟲卵を見なかつたが二回目検査で五名迄再び蟲卵を見たのである。（第十九表個人表参照）

第三次驅除では十二指腸蟲卵を併有した蛔蟲有卵者及鞭蟲有卵者は十二指腸蟲有卵者と等しく「チモール、ネマトール」を主薬とした驅

服藥人員	男		女		男 女 計	
	第一次驅除成績	第二次驅除成績	第一次驅除成績	第二次驅除成績	第一次驅除成績	第二次驅除成績
驅除セラレシ者ト認メラルモノ	一七 六	一二 二	一六 九	一〇	三三 一五	二二 二
百分比	三五・三	一六・七	五六・二	一一・一	四五・五	九・一

備考 此服薬人員ハ何レモ十二指腸蟲卵ヲ併有セルモノナルヲ以テ「フチモール」ヲ服用セシメタリ服用ノ方法ハ十二指腸蟲卵驅除ノ場合ニ同ジ

[illegible]

チモール服用鞭蟲驅除經過表

善入

服藥人員	男		女		男女計	
	第一次驅除成績	第二次驅除成績	第一次驅除成績	第二次驅除成績	第一次驅除成績	第二次驅除成績
驅除セラレシト認メラルモノ	一八	一一	一三	九	三一	二〇
分	四	一	五	二	九	三
百	二二・二	九・一	三八・五	二二・二	二九・〇	一五・〇

備考 鞭蟲有卵ニシテ「チモール」ヲ服用セシ者ハ總テ十二指腸蟲卵伴有者ナリ

第十九表

[illegible]

チモール服用東洋毛様線蟲驅除經過表

7

(1) 蛔蟲に就て

驅除直後第一回の検査に於て無卵者となつたものは百十一名の内三十四名で其百分比は三〇・六％の驅除率を示してゐる。第二回検査では第一回無卵であつた者で有卵になつた者四名第一回で有卵であり第二回で無卵となつたものが四名あつた。其の率は同じく三・六％となる。二回續いて無卵であつた者で三回目の検査に有卵となつたものが六名あつた。

此のやうに検査回数毎に有効と認むる人員に勤務があつて結局第一次驅除後二回三回或は四回引續いて無卵であつたものは男十八名女十七名計三十五名で其の率は三一・五%を示す。(第二十表第二十一表の個人表参照)

第二次（十月四日服藥十月十六日十八日二十日検査）驅除後の検査成績は服藥人員七五名中驅除されたと認めらるゝ者十三名で其の率は僅々一七・三％に過ぎない。

今個人表に依つて仔細に之を見るに確實に驅除されたと認められる者は此場合に於ても大體一視野中の蟲卵數が少なく且驅除前の三回検査でも一回或は二回無卵者となつた者である之に反して驅除されなかつた者を見るのに孰れも一視野中に多くの排卵數を認めた者である。

(2) 横川吸蟲に就て

横川吸蟲有卵者で海人草を服用したものは蛔蟲卵併有者である男女合計三悉く完全に驅除された。

(第二十三表の個人表参照)

(ホ) 其他の寄生蟲驅除狀況

鞭蟲に就て（海人草煎服用）

海人草煎を服用した蠅蟲有卵者は（蠅蟲卵及横川吸蠅卵併有者を含む）男四名女五〇名計九四名あつた内驅除されたと認められる者三六名此の率三九%三を示す。蠅卵保有の濃厚であると認められる者は驅除確實に行はれず蠅卵保有の少ないものは驅除が確實に行はれた之れ蠅蟲驅除の場合と其の傾向の等しいのは個人表を觀察すれば明らかである。（第二十三表第二十四表参照）

第二十表

海人草服用蛔蟲驅除經過表						善入					
男											
四歲A	驅除前成績			第一次驅除成績			排蟲數	第二次驅除成績			
	一回	二回	三回	一回	二回	三回		一回	二回	三回	
女											
四歲A	驅除前成績			第一次驅除成績			排蟲數	第二次驅除成績			
	一回	二回	三回	一回	二回	三回		一回	二回	三回	

[illegible]

[illegible]

二、第一次検査後有卵者ニ對シ十月三日、四日再ビ服用セシメ第二次ノ検査ヲナシタリ
三、第三次ヨリノ驅除ニハサントニシアミロール及海人草ヲ用ヒタリ

[illegible]

海人草服用鞭蟲驅除經過表							
男							
驅除成績							
第一次驅除成績							
第二次驅除成績							
四	歲A	+	+	+	+	+	+
四	歲B	+	+	+	+	+	+
五	歲A	+	+	+	+	+	+
七	歲B	+	+	+	+	+	+
七	歲C	+	+	+	+	+	+
九	歲A	+	+	+	+	+	+
女							
三	歲	+	+	+	+	+	+
四	歲A	+	+	+	+	+	+
五	歲B	+	+	+	+	+	+
五	歲C	+	+	+	+	+	+
六	歲	+	+	+	+	+	+
七	歲	+	+	+	+	+	+

検査人員驅除前では一九三名であつた無卵者十九名を除き猶十二名の事故者（病氣、他行、事故）即ち規定の驅除を受けなかつた者を除いて確

要項	年別	性別	除前合計		除後合計	
			人員	百分比	人員	百分比
検査	人員	人員	一七三	一九	一六三	二四・一
			無卵者	七四	九・八	二三
有卵者	人員	人員	一四九	七・三	九三	五七・四
			百分比	四三	二・七	一五
同	蠅	十二指腸蟲	一四	七・三	六	三七
			有卵者	百分比	三	一・五
東洋毛様	有卵者	百分比	一三	六・四	一	二・一
			有卵者	百分比	四	二・一
横川吸蟲	有卵者	百分比	一三	六・四	一	二・一
			有卵者	百分比	四	二・一
鞭蟲	有卵者	百分比	一三	六・四	一	二・一
			有卵者	百分比	四	二・一
蟯蟲	有卵者	百分比	一三	六・四	一	二・一
			有卵者	百分比	四	二・一

驅除狀況に就ては各種蟲卵保有者に於ける個人表によつて其の詳細を明らかにしたが驅除前驅除後の成績の比較は左の如くである。

驅除前後の比較

服藥人員	驅除サレシト認メラルモノ	分比	第一次驅除成績		第二次驅除成績		第一次驅除成績		第二次驅除成績		第一次驅除成績		第二次驅除成績		計	
			男	女	男	女	男	女	男	女						
六	十	二	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
六	十	八	-	+	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
六	十	九	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
七	十	十	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
七	十	三	-	+	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
七	十	七	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
八	十	二	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

[illegible]

實に驅除藥を投じたる検査人員は百六十二名である此の内三十九名驅除されたから無卵者は以前の十九名を加へて總計五十八名となり此の率は全検査人員に對して三〇・一％を占めることとなる

今各蟲卵保有者を驅除前後を比較し其驅除率を見るに左のやうである

蟲卵別	驅除前有卵者	正規ノ服藥ヲセザリシモノ	服藥シタルモ檢便ヲウケザリシモノ	驅除後ノ有卵者	差	驅除率
蠅	一四九	二	二	九三	五二	三四・九
十指賜	四二	二	二	一五	二三	五四・七
東洋毛線	一四	二	二	六	八	五七・一
蠅	一三二	二	二	八一	四七	三五・六

此の結果を見るに東洋毛様線蟲の驅除率は五七・一％を示し一番良好であつて次には十二指腸蟲の五四・七％次は鞭蟲三五・六％蛔蟲三四・九％で何れも驅除成績良好と認め難いやうである

第二次の驅除は第一次驅除後の檢便を終つて直に(十月三日)第一次と同様の服藥をさせ十二日を経て檢便を行つた結果は左表のやうな成績を得た

蟲卵別	驅除後ノ成績		正規ノ服藥ヲセザリシモノ		服藥シタルモ檢便ヲウケザリシモノ		驅除後ノ有卵者		差		驅除率
	蠅	蛆	蠅	蛆	蠅	蛆	蠅	蛆	蠅	蛆	
蠅	九七	一七	二	二	七	七	八七	七一	七一	一〇	一・〇
蛆	一七	一七	二	二	七	七	九	七	七	四一・二	一・二
蠅	八五	一六	一〇	一〇	一〇	一〇	七三	九三	二〇	九三	一・一
蛆	八五	一六	一〇	一〇	一〇	一〇	七三	九三	二〇	九三	一・一
蠅	八五	一六	一〇	一〇	一〇	一〇	七三	九三	二〇	九三	一・一
蛆	八五	一六	一〇	一〇	一〇	一〇	七三	九三	二〇	九三	一・一

此のやうに十二指腸蟲に於て四一・二％の驅除率を示したので蠅、鞭蟲、東洋毛様線蟲共に第一次驅除の最後の檢査で無卵となつた者も再び卵を發見した者多く成績甚しく不良であつた

故に第三次驅除では驅除藥を變更することとした (第二十五表、第二十六表参照)

第三次驅除概況

第三次驅除では蛔蟲有卵者鞭蟲有卵者及蠅卵及鞭蟲卵保有者に對しては

「サントニン」〇・一二 「アミロール」〇・八八

右を二包となし前夜就寢時に一包翌朝食前に一包を服用せしめた後二時間を経て

海人草 三〇・〇 施那 五・〇

を二〇・〇に煎じ服用せしめた

即ち前二回驅除で無卵者とならなかつたものゝ内病氣、事故、等の者を除き九五名に對し十月三十日より四日間二回繰返し服用させた後十一月十八日に第一回糞便檢査を施行した

又十二指腸蟲及東洋毛様線蟲有卵者に對しては

硫麻 二〇・〇 カスカラサクラダ流動エキス 一・〇

稀鹽酸 〇・五 水 一〇〇・〇

を夕食を廢して服用させ翌朝食前に於て

チモール 二・〇 (〇・五入カフセル四個) を服用させ

更に三十分乃至一時間以内に

ネマトール 〇・七 (カフセル入) を與へ一時間を経て前記の下劑を増量して再び與へて二時間後に排便のないものには洗

腸を行つた

以上のやうに第三次驅除藥服用後凡二週間乃至三週間を経て二回の糞便檢査を行つた即ち第一回を十一月十九日第二回を十一月二十六日に施行した

此の二回の結果を綜合すると左表のやうである

蟲卵別	驅除後ノ成績		正規ノ服藥ヲセザリシモノ		服藥シタルモ檢便ヲウケザリシモノ		第三次驅除後ノ有卵者		差		驅除率
	蠅	蛆	蠅	蛆	蠅	蛆	蠅	蛆	蠅	蛆	
蠅	九六	一〇	五	五	二	二	三一	五八	二七	六〇・四	六〇・四
蛆	一〇	一〇	五	五	二	二	四	六	六	六〇・〇	六〇・〇
蠅	九三	七	五	五	二	二	五四	四二	一一	五七・一	五七・一
蛆	九三	七	五	五	二	二	五四	四二	一一	五七・一	五七・一
蠅	九三	七	五	五	二	二	五四	四二	一一	五七・一	五七・一
蛆	九三	七	五	五	二	二	五四	四二	一一	五七・一	五七・一

第三次で驅除藥變更の結果は蛔蟲六〇・四％十二指腸蟲六〇・〇％東洋毛様線蟲五七・一％の驅除率を得鞭蟲は前回より不良となり三四・四％を示した

此地に對しては實に三次まで驅除を施行したのであるが驅除前に比して第三次驅除後の結果を大約綜合して見ると左のやうである

注意 (驅除後ノ人員ニハ驅除藥ヲ服用セザリシモノ驅除藥服用シタルモ檢便セザリシ者ヲ加ヘタリ)

八・六％次に蛭蟲の七四・五％鞭蟲は一番驅除され難く五三・八％を示してゐる

後十三回に及び此の延人員を見るに検査人員は千三百十二人に及んだ。(第二十五表第二十六表参照)

第二十五表

一般住民體性別及年齡別寄生蟲第一次驅除後，檢查成績

(驅除後五回檢査綜合)

善
入

第二十六表

鞭蟲二名

[illegible]

一般住民體性別年齡別寄生蟲第二次驅除後ノ檢査成績

善入

三、十二指腸蟲、東洋毛樣線蟲ヲ併有セザル蛔蟲、鞭蟲有卵ハ總テ海人草ヲ服用セシメタリ

合 計	八 一 歲 以 上	八 〇 歲 未 滿	七 〇 歲 未 滿	六 〇 歲 未 滿	五 〇 歲 未 滿	五 〇 歲 未 滿	四 〇 歲 未 滿	四 〇 歲 未 滿	四 〇 歲 未 滿	三 〇 歲 未 滿	三 〇 歲 未 滿	二 〇 歲 未 滿	二 〇 歲 未 滿
男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女
一 四 九	七 五 四	一 一 一	一 一 四	三 三 三	二 五 五	四 五 五	七 一 一	一 四 四	三 四 四	二 五 五	七 八 八	二 七 七	
一 六 七				二 二 二	二 二 二	二 二 二	二 二 二	二 二 二	二 二 二	二 二 二	二 二 二	二 二 二	
一 五 九	六 六 六			一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	
四 五 五	五 六 六			五 〇 〇	一 〇 〇 〇	五 〇 〇	五 〇 〇	一 〇 〇 〇	五 〇 〇	六 六 六	六 六 六	五 〇 〇	
八 七 二				一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	
五 四 五	四 三 八			五 〇 〇	五 〇 〇	一 〇 〇 〇	五 〇 〇	一 〇 〇 〇	五 〇 〇	六 六 六	一 〇 〇 〇	一 〇 〇 〇	
一 九 六	六 〇 〇	一 二 二	二 一 一	三 三 三	二 六 六	三 三 三	七 七 七	二 二 二	一 四 四	二 二 二	八 八 八	一 〇 〇 〇	
三 二 八				一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	
九 五 四				一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	
二 九 〇	三 六 六			一 〇 〇	五 〇 〇	一 〇 〇 〇	三 三 三	一 〇 〇 〇	六 六 六	五 〇 〇	一 〇 〇 〇	一 〇 〇 〇	
三 八 四				一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	一 一 一	
七 一 〇	六 一 五			一 〇 〇	一 〇 〇 〇	五 〇 〇	六 六 六	一 〇 〇 〇	一 〇 〇 〇	一 〇 〇 〇	一 〇 〇 〇	一 〇 〇 〇	

二、東洋毛様線蟲有卵者モ之ニ同ジ

二、東洋毛様線蟲有卵者モ之ニ同ジ

[illegible]

年齢別 性別	性	別	有卵者	蛔蟲	服用者	海人草	服用者ノ内 レシモラノ	ガリシモラノ	有卵者	服用者	服用者ノ内 レシモラノ	ガリシモラノ
一六歳未満	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
一六歳以上	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
一一歳未満	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
一一歳以上	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
一〇歳未満	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
一〇歳以上	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
九歳未満	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
九歳以上	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
八歳未満	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
八歳以上	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
七歳未満	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
七歳以上	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
六歳未満	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
六歳以上	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
五歳未満	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
五歳以上	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
四歳未満	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
四歳以上	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
三歳未満	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
三歳以上	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
二歳未満	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
二歳以上	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
一歳未満	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
一歳以上	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
合計	男	女	一〇	〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇

二、視野中の寄生蟲卵數調査

(イ) 驅除前驅除後共に排卵せるもの(驅除せられざりしもの)十二指腸蟲保有者に就て見るに驅除前は標準表(1)に當るもの五八・三%で最高率を占めたが服藥後では標準表(2)に當るもの最高率となり五八・三%を示してゐる。

蛔蟲に就て見るのに驅除前では標準表(2)(3)(4)に於て二一%より二八%を示したが服藥後では標準表(1)(2)に於て減じ(3)に於て三六・二%(4)に於て二七・六%に増加してゐる。

鞭蟲でも驅除後に於て排卵増加を示してゐる服藥後直に五日間を續けて檢便を行つた爲に排卵の増加が表に顯はれたものか又は感染濃厚なるに依るものか。(第三十表参照)

(ロ) 驅除前驅除後共に排卵したけれども最後に無卵となつたもの十二指腸蟲保有者一名に就て見るのに驅除前では標準表(2)を示したが後では標準表(1)となりて終に陰性となつてゐる。

蛔蟲に於ても驅除前に於ては標準表(2)に於て最高率を示したが後に於ては標準表(1)に於て最高率を示してゐる。
鞭蟲に於ても驅除後に於ては總て排卵を減少してゐる。(第三十一表参照)

(ハ) 驅除後全く無卵となつたもの。
總ての蟲卵を通じて驅除前に於て標準表(1)に屬するもの最高率であるのを見る之れ感染が濃厚でないためだと思ふ。

(第三十二表参照)

第三十表

蟲卵別	有卵者	同	實數	後	前	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比
十二指腸蟲	三六	一二	九四	一四	一四	五五	八三	五五	八三	五五	八三	五五	八三	五五	八三	五五	八三	五五	八三	五五	八三	五五	八三
蛔蟲	一四	四	六	後	前	五五	八三	五五	八三	五五	八三	五五	八三	五五	八三	五五	八三	五五	八三	五五	八三	五五	八三
東洋毛線蟲	一二	二	六	後	前	五五	八三	五五	八三	五五	八三	五五	八三	五五	八三	五五	八三	五五	八三	五五	八三	五五	八三

第三十一表

視野ノ寄生蟲卵數調査 (驅除前驅除後共ニ蟲卵ヲ排出シタルモ最後ニ無卵トナリタルモノ) 善 入									
蟲卵別	總數	有卵者	實數	後	前	人員			
						1	2	3	4
十二指腸蟲	三六	一四	一	後	前	人員	百分比	人員	百分比
						1	2	3	4
蛔蟲	四	一	一	後	前	100.0	100.0	100.0	100.0
東洋毛線蟲	一二	一	一	後	前	100.0	100.0	100.0	100.0
橫川吸蟲	三	二	二	後	前	100.0	100.0	100.0	100.0
鞭蟲	一二五	一八	一八	後	前	100.0	100.0	100.0	100.0
蟯蟲	四	一	一	後	前	100.0	100.0	100.0	100.0

第三十二表

視野中ノ寄生蟲卵數 (驅除後全ク無卵トナリシモノ) 善 入									
蟲卵別	總數	有卵者	實數	後	前	人員			
						1	2	3	4
十二指腸蟲	三六	二三	一五	六	一	100.0	100.0	100.0	100.0
蛔蟲	四	一	一	後	前	100.0	100.0	100.0	100.0
東洋毛線蟲	一二	一	一	後	前	100.0	100.0	100.0	100.0
橫川吸蟲	三	二	二	後	前	100.0	100.0	100.0	100.0
鞭蟲	一二五	一八	一八	後	前	100.0	100.0	100.0	100.0
蟯蟲	四	一	一	後	前	100.0	100.0	100.0	100.0

第三十三表

體性別年齢別及寄生蟲卵保有ノ有無ニ依ル體格調査									
年齡別	性別	要項	人員	身長	座高	體重	胸圍	人員	身長
一〇	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6
九	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6
八	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6
七	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6
六	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6
五	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6
四	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6
三	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6
二	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6
一	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6

體性別年齢別及寄生蟲卵保有ノ有無ニ依ル體格調査									
年齡別	性別	要項	人員	身長	座高	體重	胸圍	人員	身長
一〇	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6
九	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6
八	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6
七	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6
六	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6
五	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6
四	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6
三	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6
二	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6
一	女	有卵者	1	124.6	63.3	20.8	56.0	1	124.6

生活程度（上）の者に於て蛔蟲は八八・六％十二指腸蟲は四〇％を示し蛔蟲、十二指腸蟲では生活程度の高い者ほど感染率が高い。

次は下級の生活をして居るものが蝸蟲八一・三%十二指腸蟲二五・%を示してゐる。

中等程度の生活をしてゐる者では其率が低い。
(第三十四表参照)

(第三十四表參照)

[illegible]

一四、職業に依り分ちたる寄生蟲調査

職業に就ては善入は純農村で殆ど全部農業に従事するから職業別に調査することは出来ない。

(第三十五表参照)

第三十五表