

五五四三三三二二二二二同
十十十十十十十十十十
八六四六四二七五四二一
戔戔戔戔戔戔戔戔戔戔
+ + - - + + + + + + + +
1 1 4 1 3 2 1 3 2 2
- + + - + - - - + + -
1 1
- + - + - - + + + -
1 2
〇 〇 〇 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
〇 〇 〇 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
- + + + - - - + - + - +
1 2 1 1 2 1
+ + - + + - - - - + - -
1 2 1 3 1
+ + + - - - + - - -
1 2 1 1
〇 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〇 〃 〃 〇
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
+ + + - + + - + + + -
- + + - + + - - + - -
| | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------|------|------|
| 服藥人員 | 驅除成績 | 一四 |
| 驅除セラレシト認メラルモノ | | 七 |
| 百分比 | | 五〇・〇 |

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 服藥人員 | 驅除セラレシト認メラルモノ | 百
分
比 |
| 一三 | 五・八 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|-----|---------|-------|--|
| 同 二 二 十 十 九 七 五 | | | | | | 女 | |
| 十 十 | | | | | | | |
| 九 一 | | | | | | | |
| 七 二 | | | | | | | |
| 歲 歲 歲 歲 歲 歲 歲 | | | | | | | |
| - - - + - - - + + | | | | 第一回 | 檢 查 成 績 | 驅 除 前 | |
| 1 1 1 1 3 6 | | | | 第二回 | | | |
| - + - | | | | 第三回 | | | |
| 〇 〇 // // 一 〇 〇 〇 〇 | | | | 第一回 | 服 藥 量 | 第 一 次 | |
| 七 七 // // 五 八 六 五 四 | | | | 第二回 | | | |
| | | | | 第三回 | | | |
| | | | | 第一回 | 排 泄 蟲 數 | 第 一 次 | |
| | | | | 第二回 | | | |
| | | | | 第三回 | | | |
| - - - - + + + - | | | | 第一回 | 檢 查 成 績 | 驅 除 後 | |
| 1 ; 2 | | | | 第二回 | | | |
| - - - - - + + - | | | | 第三回 | | | |
| - + - + - - - | | | | 第一回 | 服 藥 量 | 第 二 次 | |
| 1 1 | | | | 第二回 | | | |
| // 一 〇 〇 〇 〇 | | | | 第三回 | | | |
| | | | | 第一回 | 排 泄 蟲 數 | 第 二 次 | |
| | | | | 第二回 | | | |
| | | | | 第三回 | | | |
| + + + + + | | | | 第一回 | 檢 查 成 績 | 驅 除 後 | |
| - + + + + | | | | 第二回 | | | |
| | | | | 第三回 | | | |

| | | | |
|---------------|---|---------------|---|
| 第一次 驅除成績 | | 計 | |
| 服藥人員 | 分 | 服藥人員 | 分 |
| 驅除セラレシト認メラルモノ | 比 | 驅除セラレシト認メラルモノ | 比 |
| 二五 | 六 | 四〇・〇 | 八 |

| | | |
|------|---------------|---|
| 服藥人 | 驅除セラレシト認メラルモノ | 比 |
| 男 | 女 | 計 |
| 百 | 分 | 比 |
| 二〇・〇 | 三 | 九 |

五五五四四四三
十十十十十十
十
九六四八七五
歲歲歲歲歲歲歲

+ - - + - + +
2 3 1

+ + - + + - +
1 2 1 1

| | + + | -
1

$\frac{1}{0}$ // $\frac{1}{0}$ // // $\frac{1}{36}$

$\frac{1}{0}$ // $\frac{1}{0}$ // // $\frac{1}{36}$

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

- + - + + + -
2 2 1 2

+ + - + - + -
2 1 1

+ - + +
1 1 1

$\frac{1}{0}$ $\frac{1}{0}$ $\frac{1}{36}$ $\frac{1}{0}$

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

- + + +

+ + + -

| | | | | | |

第十五表

[illegible]

| | |
|---------------|---------|
| 服藥人員 | 第二次驅除成績 |
| 驅除セラレシト認メラルモノ | |
| 百分比 | 100.0 |

| ネマトール服用横川吸蟲驅除經過表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|-----|------|------|-----|------|--------|-----|------|------|-----|------|--------|-----|------|
| 女 | 驅除前 | | | 第一次 | | | 第一次驅除後 | | | 第二次 | | | 第二次驅除後 | | |
| | 檢査成績 | 服藥量 | 排泄蟲數 | 檢査成績 | 服藥量 | 排泄蟲數 | 檢査成績 | 服藥量 | 排泄蟲數 | 檢査成績 | 服藥量 | 排泄蟲數 | 檢査成績 | 服藥量 | 排泄蟲數 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五十四歳 | 第一回 | 第二回 | 第三回 | 第一回 | 第二回 | 第三回 | 第一回 | 第二回 | 第三回 | 第一回 | 第二回 | 第三回 | 第一回 | 第二回 | 第三回 |
| | - | +1 | - | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |

| 女 | 驅除前 | | 第一次 | | 第一次驅除後 | | 第二次 | | 第二次驅除後 | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------------|------------------|--------|--------|-------------|------------------|--------|--------|-----|-----|--|--|
| | 檢
查 | 成
績 | 服
藥
量 | 排
泄
蟲
數 | 檢
查 | 成
績 | 服
藥
量 | 排
泄
蟲
數 | 檢
查 | 成
績 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第一回 | 第二回 | 第三回 | 第一回 | 第二回 | 第三回 | 第一回 | 第二回 | 第三回 | 第一回 | 第二回 | 第三回 | | |
| 五
十
四
歲 | - | +1 | - | 10 | 10 | | | | - | - | - | | | |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 第一次驅除成績 | |
| 服藥人員
驅除セラレシト認メラルモノ
百分比 | 100.0 |
| 男
女
計 | 服藥人員
驅除セラレシト認メラルモノ
百分比
100.0 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 第二次驅除成績 | |
| 服藥人員
驅除セラレシト認メラルルモノ
百 分 比 | 服藥人員
驅除セラレシト認メラルルモノ
百 分 比 |
| 計 | 計 |
| 100.0 | 100.0 |

サントニン服用
蝸蟲驅除經過表

上池尻

[illegible]

| | |
|----------------|-----|
| 服藥人員 | 二八 |
| 驅除セラレシト認メラルルモノ | 四 |
| 百分比 | 三・三 |

上
池
尻

| 同八同同同七同同六同五四同二 | | | | | | | | | | 女 | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| 歲 | | 歲 | | 歲 | | 歲 | | 歲 | | | | | | |
| + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 第一回 | 檢 | 驅 |
| 5 | 6 | | 2 | 1 | | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 第二回 | 查 | 除 |
| + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | 第三回 | 成 | 前 |
| 6 | 6 | 2 | 2 | | | 4 | | 6 | | 3 | 5 | | 績 | |
| + | | + | + | | | + | + | + | + | + | + | 第一回 | 服 | 第 |
| 5 | | 2 | | | | 3 | 5 | | 5 | 3 | 4 | 第二回 | 藥 | 一 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 第三回 | 量 | 次 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 第一回 | 排 | 第 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 第二回 | 泄 | 一 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 第三回 | 蟲 | 次 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 第一回 | 數 | 驅 |
| + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | 第二回 | 檢 | 除 |
| 5 | 7 | | | | | 5 | 5 | 2 | 3 | | 5 | 第三回 | 查 | 後 |
| + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | 第一回 | 成 | 第 |
| 3 | 5 | | | | | 5 | 3 | 3 | | 4 | 5 | 第二回 | 績 | 二 |
| - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | 第三回 | 服 | 次 |
| 3 | | | | | | 1 | 7 | 1 | | 4 | | 第一回 | 藥 | 驅 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 第二回 | 量 | 除 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 第三回 | 數 | 後 |
| 2 | | | | | | | | | | | | 第一回 | 排 | 第 |
| | | | | | | | | | | | | 第二回 | 泄 | 二 |
| | | | | | | | | | | | | 第三回 | 蟲 | 次 |
| + | + | - | | | | - | + | + | + | + | + | 第一回 | 檢 | 驅 |
| | | | | | | | | | | | | 第二回 | 查 | 除 |
| + | + | - | | | | - | + | + | + | + | + | 第三回 | 成 | 後 |
| | | | | | | | | | | | | | 績 | |

[illegible]

| | |
|---------------|---------------|
| 服藥人員 | 服藥人員 |
| 驅除セラレシト認メラルモノ | 驅除セラレシト認メラルモノ |
| 百 | 分 |
| 比 | 比 |
| 計 | 計 |
| 二六 | 二六 |
| 一四 | 一四 |

上
池
尻

三八九

(ネマトール) 驅除藥品効力調査

[illegible]

第二十二表

(ネマトール) 驅除藥品効力調査

[illegible]

(サントニン) 驅除藥品効力調査

| 年
齡
別 | 性
別 | 蟲
卵
別 | 飼
蟲
有
卵
者 | 服
用
者
ノ
内
譯 | | 鞭
蟲 | 服
用
者
ノ
内
譯 | |
|-------------|--------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--------|--------------------------------------|--|
| | | | | 驅
除
セ
ラ
レ
シ
モ
ノ | 驅
除
セ
ラ
レ
ザ
リ
シ
モ
ノ | | 驅
除
セ
ラ
レ
シ
モ
ノ | 驅
除
セ
ラ
レ
ザ
リ
シ
モ
ノ |
| 五
一
歲 | 女 | 滿上 | 五 | 一 | 一〇〇・〇 | 一 | 一 | 一〇〇・〇 |
| 一
六
歲 | 女 | 滿上 | 八 | 一 | 一〇〇・〇 | 二 | 一 | 一〇〇・〇 |
| 一
一
歲 | 女 | 滿上 | 四 | 一 | 一〇〇・〇 | 二 | 一 | 一〇〇・〇 |
| 二
一
歲 | 女 | 滿上 | 三 | 一 | 一〇〇・〇 | 一 | 一 | 一〇〇・〇 |
| 二
二
歲 | 女 | 滿上 | 二 | 一 | 一〇〇・〇 | 一 | 一 | 一〇〇・〇 |
| 二
二
歲 | 男 | 滿上 | 二 | 一 | 一〇〇・〇 | 一 | 一 | 一〇〇・〇 |
| 〇
六
歲 | 男 | 滿上 | 一 | 一 | 一〇〇・〇 | 一 | 一 | 一〇〇・〇 |
| 三
二
歲 | 男 | 滿上 | 二 | 一 | 一〇〇・〇 | 一 | 一 | 一〇〇・〇 |

(イ) 驅除前驅除後共に排卵せるもの

| | | | |
|---|---|---|---|
| 四 | 五 | 八 | |
| 十 | 歲 | 歲 | |
| 歲 | | | |
| 女 | 女 | 男 | |
| — | + | + | 驅 |
| | 1 | 2 | |
| + | — | — | 除 |
| 3 | | | |
| | | — | 前 |
| + | + | — | 第 |
| 4 | 3 | | 一 |
| + | + | + | 次 |
| 4 | 2 | 4 | 驅 |
| + | + | + | 除 |
| | 1 | 4 | 後 |
| + | — | + | 第 |
| 1 | | 2 | 二 |
| — | + | + | 次 |
| | | 1 | 驅 |
| | | | 除 |
| | | | 後 |

三九三

即ち十二指腸蟲に見る時は驅除前には標準表(本縣假定) (2)に當るもの三一・四%で最高であつたが、驅除後には標準表(本縣假定) (1)に屬するものが最高となつてゐる。

蛔蟲に於ては驅除前に於て標準表(本縣假定) (4)の者二八・一%で最高率であつたが、驅除後に於ては標準率(本縣假定) (5)に當る者最高率を示し、逆の傾向を見る。

鞭蟲では驅除前、後、共に標準表(本縣假定)の(1)が最高率であるが、其の率は驅除後に於て猶更標準表(本縣假定) (1)に於て増加し、(3)に於て著しく減じたのを見る。(第二十二表参照)

(ロ) 驅除前驅除後共に排卵せしも最後に無卵となりしもの十二指腸蟲に就て見るに驅除前には標準表(本縣假定) (2)(3)に於て三六・四の最高率を示したが驅除後では標準表(本縣假定) (1)に於て五四・五%を示し最高を占める、蛔蟲では驅除前は標準表(本縣假定) (4)が四三・五%を示し最高であつたが驅除後では標準表(本縣假定) (1)(2)が二六・一%で最高となつた。鞭蟲では驅除後標準表(本縣假定) (2)に於て却て増加をしてゐる。

(第二十三表参照)

(ハ) 驅除後全く無卵となりしもの

各蟲卵を通じて標準表(本縣假定) (1)に屬するもの最高率を占めて居る。(第二十四表参照)

各部落を通じて見るに池尻の驅除の成績は良好であるが蟲卵の視野中に表はれた數も亦他の各部落に比べて少ない。

之れに依て之を見るときは此の池尻部落の寄生蟲感染状態は他部落に比べて濃厚でないといふやうか。(第二二表、第二三表、第二四表参照)

第二十二表

| 視野中ノ寄生蟲卵數調査 (驅除前驅除後共に蟲卵ヲ檢出シタルモノ) | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| 上 池 尻 | | | | | | | | | |
| 蟲 卵 別 | 有卵者 總數 | 同 實數 | 人員 | | | | | | |
| | | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 八 |
| 十二指腸蟲 | 八五 | 五 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 |
| | | | % | % | % | % | % | % | % |
| 蛔蟲 | 二八 | 五 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 |
| | | | % | % | % | % | % | % | % |
| 東洋毛線蟲 | 四 | 一 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 |
| | | | % | % | % | % | % | % | % |
| 鞭蟲 | 一 | 一 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 |
| | | | % | % | % | % | % | % | % |

| 視野中ノ寄生蟲卵數調査 (驅除前驅除後共に蟲卵ヲ檢出シタルモノ) | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| 上 池 尻 | | | | | | | | | |
| 蟲 卵 別 | 有卵者 總數 | 同 實數 | 人員 | | | | | | |
| | | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 八 |
| 十二指腸蟲 | 八五 | 五 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 |
| | | | % | % | % | % | % | % | % |
| 蛔蟲 | 二八 | 五 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 |
| | | | % | % | % | % | % | % | % |
| 東洋毛線蟲 | 四 | 一 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 |
| | | | % | % | % | % | % | % | % |
| 鞭蟲 | 一 | 一 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 |
| | | | % | % | % | % | % | % | % |

第二十三表

| 視野中ノ寄生蟲卵數調査 (驅除前驅除後共に蟲卵ヲ檢出シタルモノ) | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| 上 池 尻 | | | | | | | | | |
| 蟲 卵 別 | 有卵者 總數 | 同 實數 | 人員 | | | | | | |
| | | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 八 |
| 十二指腸蟲 | 八五 | 五 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 |
| | | | % | % | % | % | % | % | % |
| 蛔蟲 | 二八 | 五 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 |
| | | | % | % | % | % | % | % | % |
| 東洋毛線蟲 | 四 | 一 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 |
| | | | % | % | % | % | % | % | % |
| 鞭蟲 | 一 | 一 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 |
| | | | % | % | % | % | % | % | % |

第二十四表

| 視野中ノ寄生蟲卵數調査 (驅除後全く蟲ヲ檢出セザリシモノ) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| 上 池 尻 | | | | | | | | | |
| 蟲 卵 別 | 有卵者 總數 | 同 實數 | 人員 | | | | | | |
| | | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 八 |
| 十二指腸蟲 | 八五 | 五 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 |
| | | | % | % | % | % | % | % | % |
| 蛔蟲 | 二八 | 五 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 |
| | | | % | % | % | % | % | % | % |
| 東洋毛線蟲 | 四 | 一 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 |
| | | | % | % | % | % | % | % | % |
| 鞭蟲 | 一 | 一 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 | 人員 |
| | | | % | % | % | % | % | % | % |

第二十五表

三九六

| 年齡
性別 | | 有卵者 | | | | 十二指腸蟲有卵者 | | | | 其他寄生蟲有卵者 | | | | 無卵者 | | | |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|
| | | 人員 | 身長 | 座高 | 體重 | 人員 | 身長 | 座高 | 體重 | 人員 | 身長 | 座高 | 體重 | 人員 | 身長 | 座高 | 體重 |
| 一歲以上 | 女男 | 一 | 一五〇 | 八五 | 四二 | 一 | 一八〇 | 七五 | 二六〇 | 一 | 一五〇 | 八五 | 四二 | 一 | 一五〇 | 八五 | 四二 |
| 二歲以上 | 女男 | 二 | 一七〇 | 九〇 | 五〇 | 二 | 一九〇 | 八〇 | 三〇〇 | 二 | 一七〇 | 八五 | 四二 | 二 | 一七〇 | 八五 | 四二 |
| 三歲以上 | 女男 | 三 | 一八〇 | 九五 | 五五 | 三 | 二〇〇 | 八五 | 三二〇 | 三 | 一八〇 | 九〇 | 四二 | 三 | 一八〇 | 九〇 | 四二 |
| 四歲以上 | 女男 | 四 | 一九〇 | 一〇〇 | 六〇 | 四 | 二一〇 | 九〇 | 三三〇 | 四 | 一九〇 | 九五 | 四二 | 四 | 一九〇 | 九五 | 四二 |
| 五歲以上 | 女男 | 五 | 二〇〇 | 一〇五 | 六五 | 五 | 二二〇 | 一〇〇 | 三四〇 | 五 | 二〇〇 | 一〇〇 | 四二 | 五 | 二〇〇 | 一〇〇 | 四二 |
| 六歲以上 | 女男 | 六 | 二一〇 | 一一〇 | 七〇 | 六 | 二三〇 | 一〇五 | 三五〇 | 六 | 二一〇 | 一〇五 | 四二 | 六 | 二一〇 | 一〇五 | 四二 |
| 七歲以上 | 女男 | 七 | 二二〇 | 一二〇 | 七五 | 七 | 二四〇 | 一一〇 | 三六〇 | 七 | 二二〇 | 一一〇 | 四二 | 七 | 二二〇 | 一一〇 | 四二 |
| 八歲以上 | 女男 | 八 | 二三〇 | 一二五 | 八〇 | 八 | 二五〇 | 一二〇 | 三七〇 | 八 | 二三〇 | 一二〇 | 四二 | 八 | 二三〇 | 一二〇 | 四二 |
| 九歲以上 | 女男 | 九 | 二四〇 | 一三〇 | 八五 | 九 | 二六〇 | 一二五 | 三八〇 | 九 | 二四〇 | 一二五 | 四二 | 九 | 二四〇 | 一二五 | 四二 |
| 一〇歲以上 | 女男 | 一〇 | 二五〇 | 一三五 | 九〇 | 一〇 | 二七〇 | 一三〇 | 四〇〇 | 一〇 | 二五〇 | 一三〇 | 四二 | 一〇 | 二五〇 | 一三〇 | 四二 |
| 一歲以上 | 女男 | 一一 | 二六〇 | 一四〇 | 九五 | 一一 | 二八〇 | 一三五 | 四二〇 | 一一 | 二六〇 | 一三五 | 四二 | 一一 | 二六〇 | 一三五 | 四二 |
| 一三歲以上 | 女男 | 一三 | 二七〇 | 一四五 | 一〇〇 | 一三 | 二九〇 | 一四〇 | 四四〇 | 一三 | 二七〇 | 一四〇 | 四二 | 一三 | 二七〇 | 一四〇 | 四二 |
| 一四歲以上 | 女男 | 一四 | 二八〇 | 一五〇 | 一〇五 | 一四 | 三〇〇 | 一四五 | 四六〇 | 一四 | 二八〇 | 一四五 | 四二 | 一四 | 二八〇 | 一四五 | 四二 |

體性別年齡別及寄生蟲卵保有の有無ニ依ル體格調査

上池尻

| 年齡
性別 | | 有卵者 | | | | 十二指腸蟲有卵者 | | | | 其他寄生蟲有卵者 | | | | 無卵者 | | | |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|
| | | 人員 | 身長 | 座高 | 體重 | 人員 | 身長 | 座高 | 體重 | 人員 | 身長 | 座高 | 體重 | 人員 | 身長 | 座高 | 體重 |
| 一歲以上 | 女男 | 一 | 一五〇 | 八五 | 四二 | 一 | 一八〇 | 七五 | 二六〇 | 一 | 一五〇 | 八五 | 四二 | 一 | 一五〇 | 八五 | 四二 |
| 二歲以上 | 女男 | 二 | 一七〇 | 九〇 | 五〇 | 二 | 一九〇 | 八〇 | 三〇〇 | 二 | 一七〇 | 八五 | 四二 | 二 | 一七〇 | 八五 | 四二 |
| 三歲以上 | 女男 | 三 | 一八〇 | 九五 | 五五 | 三 | 二〇〇 | 八五 | 三二〇 | 三 | 一八〇 | 九〇 | 四二 | 三 | 一八〇 | 九〇 | 四二 |
| 四歲以上 | 女男 | 四 | 一九〇 | 一〇〇 | 六〇 | 四 | 二一〇 | 九〇 | 三三〇 | 四 | 一九〇 | 九五 | 四二 | 四 | 一九〇 | 九五 | 四二 |
| 五歲以上 | 女男 | 五 | 二〇〇 | 一〇五 | 六五 | 五 | 二二〇 | 一〇〇 | 三四〇 | 五 | 二〇〇 | 一〇〇 | 四二 | 五 | 二〇〇 | 一〇〇 | 四二 |
| 六歲以上 | 女男 | 六 | 二一〇 | 一一〇 | 七〇 | 六 | 二三〇 | 一〇五 | 三五〇 | 六 | 二一〇 | 一〇五 | 四二 | 六 | 二一〇 | 一〇五 | 四二 |
| 七歲以上 | 女男 | 七 | 二二〇 | 一二〇 | 七五 | 七 | 二四〇 | 一二〇 | 三七〇 | 七 | 二二〇 | 一二〇 | 四二 | 七 | 二二〇 | 一二〇 | 四二 |
| 八歲以上 | 女男 | 八 | 二三〇 | 一二五 | 八〇 | 八 | 二五〇 | 一二〇 | 三八〇 | 八 | 二三〇 | 一二〇 | 四二 | 八 | 二三〇 | 一二〇 | 四二 |
| 九歲以上 | 女男 | 九 | 二四〇 | 一三〇 | 八五 | 九 | 二六〇 | 一二五 | 三八〇 | 九 | 二四〇 | 一二五 | 四二 | 九 | 二四〇 | 一二五 | 四二 |
| 一〇歲以上 | 女男 | 一〇 | 二五〇 | 一三五 | 九〇 | 一〇 | 二七〇 | 一三〇 | 四〇〇 | 一〇 | 二五〇 | 一三〇 | 四二 | 一〇 | 二五〇 | 一三〇 | 四二 |
| 一歲以上 | 女男 | 一一 | 二六〇 | 一四〇 | 九五 | 一一 | 二八〇 | 一三五 | 四二〇 | 一一 | 二六〇 | 一三五 | 四二 | 一一 | 二六〇 | 一三五 | 四二 |
| 一三歲以上 | 女男 | 一三 | 二七〇 | 一四五 | 一〇〇 | 一三 | 二九〇 | 一四〇 | 四四〇 | 一三 | 二七〇 | 一四〇 | 四二 | 一三 | 二七〇 | 一四〇 | 四二 |
| 一四歲以上 | 女男 | 一四 | 二八〇 | 一五〇 | 一〇五 | 一四 | 三〇〇 | 一四五 | 四六〇 | 一四 | 二八〇 | 一四五 | 四二 | 一四 | 二八〇 | 一四五 | 四二 |

三九七

備考 蛔蟲有卵者四名十二指腸蟲有卵者五名其ノ他ノ寄生蟲有卵者一名及無卵者二名缺席ノタメ體格調査不能ニ付削除ス
一三、生活程度に依り分ちたる寄生蟲の調査生活程度(上)(中)に於て無卵者三五・%以上を示し(下)に於て一二・%以上を見る
有卵者は生活程度(下)に於て七七・%の多きを示し(上)(中)は等しく六四・%を占めてゐる各蟲卵から見れば生活程度(下)なる者に於て總て保有率が高い (第二十六表参照)

第二十六表

| 生活程度 | | 検査 | | 有卵者 | | 同 | | 上 | | 内 | |
|------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| | | 人員 | 無卵者 | 人員 | 有卵者 | 人員 | 無卵者 | 人員 | 無卵者 | 人員 | 無卵者 |
| 計 | 下 | 二五 | 六 | 二六 | 一 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 | 六 |
| 中 | 一四 | 三 | 一五 | 二 | 一四 | 三 | 一五 | 二 | 一四 | 三 | 一五 |
| 上 | 五 | 二 | 三 | 一 | 四 | 一 | 五 | 二 | 四 | 一 | 五 |
| 計 | 二五 | 六 | 二六 | 一 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 |
| 有卵者 | 二五 | 六 | 二六 | 一 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 |
| 無卵者 | 二五 | 六 | 二六 | 一 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 |
| 百分比 | 二五 | 六 | 二六 | 一 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 |
| 有卵者 | 二五 | 六 | 二六 | 一 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 |
| 無卵者 | 二五 | 六 | 二六 | 一 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 |
| 百分比 | 二五 | 六 | 二六 | 一 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 |

一四、職業別に依る寄生蟲調査

大體農業に従事する者多く、次は鍛冶業に従事する者が大多數を占めてゐるをして其他の職業に従事する者は十七名で此の家族二十七名とを加へて四四名、即一八・%である、故に農業及鍛冶業を主として有卵率を見るに農業及其家族に於て七三・%の有卵率を見、鍛冶業及其家族に於ては七一・七%の有卵率を見る
各蟲卵保有者を見れば

農業従事者(十二指腸蟲) 四三・%
鍛冶業従事者(十二指腸蟲) 四三・五%
三八・%

右のやうな割合を示してゐる (第二十七表参照)

第二十七表

| 職業別 | | 検査 | | 有卵者 | | 同 | | 上 | | 内 | |
|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| | | 人員 | 無卵者 | 人員 | 有卵者 | 人員 | 無卵者 | 人員 | 無卵者 | 人員 | 無卵者 |
| 計 | 二五 | 六 | 二六 | 一 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 |
| 下 | 一四 | 三 | 一五 | 二 | 一四 | 三 | 一五 | 二 | 一四 | 三 | 一五 |
| 中 | 五 | 二 | 三 | 一 | 四 | 一 | 五 | 二 | 四 | 一 | 五 |
| 上 | 二五 | 六 | 二六 | 一 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 |
| 有卵者 | 二五 | 六 | 二六 | 一 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 |
| 無卵者 | 二五 | 六 | 二六 | 一 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 |
| 百分比 | 二五 | 六 | 二六 | 一 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 |
| 有卵者 | 二五 | 六 | 二六 | 一 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 |
| 無卵者 | 二五 | 六 | 二六 | 一 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 |
| 百分比 | 二五 | 六 | 二六 | 一 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 | 六 | 二五 |

第四項 飾磨郡廣村小坂部落寄生蟲調査及驅除狀況

一、調査地の状況

廣村は飾磨郡の海岸に位し、一帯の平野で耕地廣々と開け交通も亦便利である、部落の全面積は殆ど耕地で二毛作の田地が大部分を占め、水田は僅に二町歩に過ぎない。

二、寄生蟲検査方法及驅除方法概要

廣村小坂部落に對しては最初の五日間に部落民の糞便検査を三回行ひ其間に於て身體検査を施行し其の他の調査事項を個人票記入した。
(十月二十七日より同三十一日に至る)

蛔蟲有卵者に對しては十月三十一日の夜より三日間に亘つて驅除を行ひ、十日間を経て驅除後三回の檢便を施行したのである。

十二指腸蟲に對しては十一月一日投藥驅除を行ひ一日を隔てゝ再び驅除を行ひ、そして十日間を経て驅除後三回の檢便を施行したのである。

驅除は總て集合投藥を行つた。


三、飾磨郡廣村字小坂寄生蟲検査驅除施行日割表

驅除前検査

| 月 | 日 | 驅除前検査 | 月 | 日 | 驅除前検査 |
|----|-----|-------------|---|-----|------------|
| 十月 | 廿七日 | 第一回檢便 | 同 | 三十日 | 第三回檢便及身體検査 |
| 十月 | 廿八日 | 第一回檢便及第二回檢便 | 同 | 卅一日 | 身體検査 |
| 同 | 廿九日 | 第二回檢便及第三回檢便 | | | |

第一次驅除

| 月 | 日 | 十二指腸蟲及東洋毛線線蟲 | 蛔蟲及鞭蟲 | 月 | 日 | 十二指腸蟲及東洋毛線線蟲 | 蛔蟲及鞭蟲 |
|-----|------|--------------|-------------------|-----|----|--------------|-------------------|
| 十月 | 三十一日 | 十二指腸蟲及東洋毛線線蟲 | (夜) サントニン、アミロール服用 | 十一月 | 二日 | 蟲體検査 | (朝) サントニン、アミロール服用 |
| 十一月 | 一日 | バラジートル、硫苦投藥 | (朝) サントニン、アミロール服用 | 十一月 | 三日 | バラジートル、硫苦、投藥 | |
| 同 | | | (夜) サントニン、アミロール服用 | 十一月 | 四日 | 蟲體検査 | |



| 月 | 日 | 第一次驅除後ノ検査 | 月 | 日 | 第一次驅除後ノ検査 |
|--------|---|-----------|---|-----|-----------|
| 十一月十四日 | 同 | 第一回検査 | 同 | 十六日 | 第三回検査 |
| 十五日 | 同 | 第二回検査 | | | |

四、驅除前の検査

驅除前第一回検査を十月二十七日、二十八日の兩日に亘つて行つたが、住民人口二六九名の内、事故、病氣、旅行の爲に十名非検査人員があつたので二五九名を検査したのである。而して第二回以後の検査では第一回検査の際、蛔蟲十二指腸蟲を同時に檢出したものを除いて施行した。驅除前検査三回を綜合した成績は左の如くである。

| 検査人員 | 無卵者 | | 有卵者 | | 蛔蟲 | | 十二指腸蟲 | | 東洋毛様線蟲 | | 横川吸蟲 | | 鞭蟲 | | 蟯蟲 | |
|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-------|------|--------|-----|------|-----|----|------|----|-----|
| | 人員 | 百分比 | 人員 | 百分比 | 人員 | 百分比 | 人員 | 百分比 | 人員 | 百分比 | 人員 | 百分比 | 人員 | 百分比 | 人員 | 百分比 |
| 二五九 | 一四 | 五・四 | 二四五 | 九四・六 | 一二五 | 四四・四 | 一元 | 五三・七 | 一 | 〇・四 | 八 | 三・一 | 三七 | 八三・八 | | |

之を見るに内務省で施行した保健調査の場合に於ける寄生蟲有卵者(七八・三%)に比して甚しい高率を示すばかりでなく本縣に於て先きに調査した善入其他に比べても高率である、各蟲卵別に見れば十二指腸蟲卵の有卵率は五三・七%を示し、以前の調査地即ち善入部落、其他に比べて甚しく高率である、之れ全體の有卵率に關係するものと思はれる特に十二指腸蟲の多いのが目立つてゐる。(第一表より第四表参照)

第一表

| 一般住民體性別及年齡別寄生蟲検査成績 (驅除前第一回) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|-----|------|------|-----|-------|-----|------|----|------|
| 年齡別 | 性 | 検査項目 | | 検査人員 | | 無卵者 | | 有卵者 | | 同 | |
| | | 人員 | 百分比 | 人員 | 百分比 | 人員 | 百分比 | 人員 | 百分比 | 人員 | 百分比 |
| 一六〇歳未満 | 女 | 一九 | 三・六 | 三 | 一五・八 | 二六 | 一〇〇・〇 | 七五 | 五八・八 | 二五 | 一〇・五 |
| 一六〇歳以上 | 女 | 二六 | 三・三 | 三 | 一五・八 | 二六 | 一〇〇・〇 | 七五 | 五八・八 | 二五 | 一〇・五 |
| 一六〇歳以上 | 男 | 二六 | 三・三 | 三 | 一五・八 | 二六 | 一〇〇・〇 | 七五 | 五八・八 | 二五 | 一〇・五 |
| 一六〇歳以上 | 男 | 二六 | 三・三 | 三 | 一五・八 | 二六 | 一〇〇・〇 | 七五 | 五八・八 | 二五 | 一〇・五 |
| 一六〇歳以上 | 男 | 二六 | 三・三 | 三 | 一五・八 | 二六 | 一〇〇・〇 | 七五 | 五八・八 | 二五 | 一〇・五 |
| 一六〇歳以上 | 男 | 二六 | 三・三 | 三 | 一五・八 | 二六 | 一〇〇・〇 | 七五 | 五八・八 | 二五 | 一〇・五 |
| 一六〇歳以上 | 男 | 二六 | 三・三 | 三 | 一五・八 | 二六 | 一〇〇・〇 | 七五 | 五八・八 | 二五 | 一〇・五 |
| 一六〇歳以上 | 男 | 二六 | 三・三 | 三 | 一五・八 | 二六 | 一〇〇・〇 | 七五 | 五八・八 | 二五 | 一〇・五 |
| 一六〇歳以上 | 男 | 二六 | 三・三 | 三 | 一五・八 | 二六 | 一〇〇・〇 | 七五 | 五八・八 | 二五 | 一〇・五 |
| 一六〇歳以上 | 男 | 二六 | 三・三 | 三 | 一五・八 | 二六 | 一〇〇・〇 | 七五 | 五八・八 | 二五 | 一〇・五 |

[illegible]

五、驅除方法

(イ) 蛔蟲有卵者に對しては

サントニン

〇
一
五

アミロール

○

を二包として前夜就寝時に一包を、又翌朝起床直後に一包を服用させた、十二指腸蟲有卵者に對しては前日並に當日「アルコール」類の飲用を嚴禁し

パラジール

四〇（〇・五カフセル入八個）

右を朝食二時間後に服用させた後更に二時間を経て、

硫
苦

二五〇

第五表

右を服用させ其の後二時間を経るも便通を催ふさない者に對しては浣腸を行つた。

十二指腸蟲有卵者は特に嚴密な身體検査を行ひ、老年幼年及心臟症患者、妊婦等に對しては投藥を加減した。(第五表參照)

[illegible]

備考 一五歳以上ハ大人量ヲ與ヘタガ高齢者ニハ多少考慮シテ與ヘタ

體質及病弱等ニヨリ服藥ヲ加減シタ

六、驅除後の成績

有卵者二四五名に就て投薬を行つたことは前述の通りであるが十二指腸蟲有卵者でパラジートを投薬したものゝ内多少の反應を見た爲完全な驅除を行ふことが出来なかつた。

廣村小坂部落に於ける十二指腸蟲患者は全住民の半数以上に及び古くから十二指腸蟲に汚染された處と思考される。尙十二指腸蟲患者も外觀殆んど常人と異ならず、血色、榮養共に普通で自覺症も伴はず。唯其中の數人に貧血と心臓雜音を呈するのを見れば驅除しなければならぬ人員は少數に過ぎない其の他も亦強いて驅除を希望しないばかりでなく、農繁期に直面してゐる際であつたから驅除は反つて迷惑の模様であつたが、絶食を必要としない驅除藥(バラヂートル)を使用するにより身體は衰弱しないであらうと信じて第一回の驅除を受けたけれども其の際頭痛、眩暈、嘔吐等を訴へた者二十數名に及んだ爲に第二回目には約半数驅除を受けたばかりであつた。これは全く繁忙期に直面して身體の衰弱するものであらうことを恐れた爲であらうと思はれる。

而して各蟲卵の驅除前及驅除後の成績を比較するに左の如くである。

注意 十二指腸蟲、蛔蟲併有者で高齡者、病弱者の爲、蛔蟲驅除藥のみを用ゐたる者男二人、女一人あつた。又驅除藥服用後の検査に於て、十二指腸蟲卵を發見した者、男一人、女二人あつた。

| 蟲卵別 | 驅除前ノ有卵者 | 正規ノ服藥セザリシモノ | | 驅除後ノ有卵者 | 差 | 驅除率 |
|-------|---------|-------------|-----|---------|---|-------|
| | | 人員 | 百分比 | | | |
| 蛔蟲 | 二五 | 九 | 三六 | 三 | 三 | 八八・三 |
| 十二指腸蟲 | 二五 | 一 | 四 | 三 | 三 | 八八・三 |
| 東洋毛線蟲 | 一 | 一 | 一〇〇 | 一 | 一 | 一〇〇・〇 |
| 鞭蟲 | 三 | 一 | 三三 | 一 | 一 | 一〇〇・〇 |

總蟲一卵保有者ハ五〇名アツタガ之ハ驅除藥ヲ與ヘナカツタ。故ニ「差七」ヨリ五〇・ヲ減ジタ二一名ガ驅除サレタモノトナル此ノ率ハ九・セヲ示シテキル。

第六表

(第十表参照)

| 一般住民體性別及年齡別寄生蟲第一次驅除後ノ検査成績 (驅除後第一回) | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 年齡別 | 性別 | 検査項目 | | 無卵者 | | 有卵者 | | 同 | |
| | | 人員 | 百分比 | 人員 | 百分比 | 人員 | 百分比 | 人員 | 百分比 |
| 五歳未満 | 女 | 三 | 一〇〇 | 三 | 一〇〇 | 三 | 一〇〇 | 三 | 一〇〇 |
| 一歳 | 男 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 一歳 | 女 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 二歳 | 男 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 二歳 | 女 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 三歳 | 男 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 三歳 | 女 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 四歳 | 男 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 四歳 | 女 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 五歳 | 男 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 五歳 | 女 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 六歳 | 男 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 六歳 | 女 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 七歳 | 男 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 七歳 | 女 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 八歳 | 男 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 八歳 | 女 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 合計 | 計 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |

第七表

一般住民體性別及年齡別寄生蟲第一次驅除後ノ検査成績 (驅除後第二回)

| 年齡別 | 性別 | 検査項目 | | 無卵者 | | 有卵者 | | 同 | |
|------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | 人員 | 百分比 | 人員 | 百分比 | 人員 | 百分比 | 人員 | 百分比 |
| 五歳未満 | 女 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 一歳 | 男 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 一歳 | 女 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 二歳 | 男 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 二歳 | 女 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 三歳 | 男 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 三歳 | 女 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 四歳 | 男 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 四歳 | 女 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 五歳 | 男 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 五歳 | 女 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 六歳 | 男 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 六歳 | 女 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 七歳 | 男 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 七歳 | 女 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 八歳 | 男 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 八歳 | 女 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |
| 合計 | 計 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 | 二 | 一〇〇 |

小坂

第九表

| 合 | 八 | 八 | 七 | 七 |
|-----|----|-----|------|---|
| 計 | 一 | 〇 | 一 | 〇 |
| 計 | 歲 | 歲 | 歲 | 歲 |
| | 以 | 未 | 未 | 未 |
| | 上 | 滿 | 滿 | 滿 |
| | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 四〇 | 一五 | 二五 | | |
| | | | 一 | |
| 二 | 一 | 一 | | |
| 五〇 | 六〇 | 四〇 | | |
| 三八 | 二四 | 二四 | 一 | |
| 九五〇 | 九三 | 九六〇 | 100〇 | |
| 二三 | 七六 | | | |
| 三三 | 四六 | 二四〇 | | |
| 一四 | 五九 | | 一 | |
| 五五〇 | 三三 | 二六〇 | 100〇 | |
| 三 | 二八 | | 一 | |
| 七七 | 八六 | 七〇〇 | 100〇 | |

[illegible]

第十表

| 合 | 八 | 八 | 七 | 七 | 六 | 五 | 五 | 五 | 四 | 四 |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 計 | 一 | 〇 | 一 | 〇 | 一 | 〇 | 一 | 〇 | 六 | 一 |
| 計 | 歲 | 歲 | 歲 | 歲 | 歲 | 歲 | 歲 | 歲 | 歲 | 歲 |
| | 以 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| | 上 | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 | 滿 |
| | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 一四四 | 三六二 | 二一 | 一 | 一四三 | 三六 | 四三 | 七六 | 三二 | | |
| 四 | 二二 | | | | | | | | | 一 |
| 二八 | 三三 | 二五 | | | | | | | | 三三 |
| 一四〇 | 六九 | 二一 | 一 | 一四三 | 三六 | 四三 | 七六 | 二二 | | |
| 九七・三 | 九八・八 | 九七・五 | 一〇〇・〇 | 一〇〇・〇 | 一〇〇・〇 | 一〇〇・〇 | 一〇〇・〇 | 一〇〇・〇 | 一〇〇・〇 | 六・七 |
| 六七 | 元 | 元 | 二一 | 一 | 一 | 二一 | 一 | 一三 | 二 | |
| 四六・五 | 四六・〇 | 四六・九 | 一〇〇・〇 | 一〇〇・〇 | 二五・〇 | 二五・三 | 六・七 | 一六・七 | 三三・三 | 六・七 |
| 八二 | 三五 | 四七 | 一一 | 一 | 三二 | 二四 | 四三 | 六五 | 一 | |
| 五八・九 | 五五・六 | 五八・〇 | 五〇・〇 | 一〇〇・〇 | 七五・〇 | 六六・七 | 六六・七 | 一〇〇・〇 | 八五・三 | 三・三 |
| 三三 | 五六 | 六五 | 二一 | 一 | 四三 | 三五 | 四二 | 七六 | 二二 | |
| 八四・〇 | 八八・〇 | 八〇・二 | 一〇〇・〇 | 一〇〇・〇 | 一〇〇・〇 | 一〇〇・〇 | 八三 | 一〇〇・〇 | 一〇〇・〇 | 六六・八 |

| 一般住民同次ニ依リ分チタル寄生蟲検査成績 | | | | | | | | | | | | | | | | 小坂 | |
|----------------------|------|-----|------|-----|------|-------|---------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|
| 検査同次 | 検査人員 | | 無卵者 | | 有卵者 | | 同 上 内 課 | | | | | | | | | | |
| | 人員 | 百分比 | 人員 | 百分比 | 蛔蟲 | 十二指腸蟲 | 東洋毛様線蟲 | 横川吸蟲 | 鞭蟲 | 蛭 | | | | | | | |
| | | | | | 有卵者 | 百分比 | 有卵者 | 百分比 | 有卵者 | 百分比 | 有卵者 | 百分比 | 有卵者 | 百分比 | | | |
| | | | | | 有卵者 | 百分比 | 有卵者 | 百分比 | 有卵者 | 百分比 | 有卵者 | 百分比 | 有卵者 | 百分比 | | | |
| 驅除前
第一回検査 | 二五元 | 〇 | 二一・六 | 三元 | 八八・四 | 四五・四 | 二五 | 四四・四 | 一 | 〇・四 | 三 | 一・三 | 一八七 | 七三・二 | 三 | 一・一 | |
| 第二回検査 | 一八六 | 三 | 二一・三 | 一五 | 八八・七 | 三・七 | 六 | 三・八 | 一 | 一 | 四 | 二・三 | 一三 | 七一・五 | 一 | 一 | |
| 第三回検査 | 一五 | 一五 | 二一・一 | 二〇 | 八八・九 | 二・九 | 四三 | 三二・九 | 一 | 一 | 三 | 二・三 | 一〇一 | 七四・八 | 一 | 一 | |
| 驅除前
三回綜合成績 | 二五元 | 一四 | 五・四 | 二四五 | 九四・六 | 一一五 | 四四・四 | 一五 | 五五・七 | 一 | 〇・四 | 八 | 三・二 | 二七 | 八三・八 | 三 | 一・一 |

| 第一次驅除後
第一次検査 | 第二次検査 | 第三次検査 | 驅除後
三回綜合成績 |
|-----------------|-------|-------|---------------|
| 一四 | 四〇 | 四〇 | 一四 |
| 三 | 二 | 二 | 四 |
| 九〇 | 五〇 | 五〇 | 二・八 |
| 二二 | 六 | 六 | 一四 |
| 九一〇 | 九七〇 | 九七〇 | 九七・三 |
| 六 | 三 | 三 | 六 |
| 四・九 | 三・五 | 三・五 | 四・五 |
| 六 | 一四 | 一四 | 八三 |
| 四四 | 五・五 | 五・五 | 五・九 |
| 二 | 一 | 一 | 一 |
| 一〇五 | 九 | 九 | 三 |
| 七・九 | 九・八 | 七・五 | 八四・〇 |
| 一 | 一 | 一 | 一 |
| 一 | 一 | 一 | 一 |

七、住民の寄生蟲感染率
小坂部落の一般住民の感染率を驅除前三回の検査綜合成績に就て之を見やうと思ふ。

| 要 項 | 實 績 | 數 百 分 比 | 要 項 | 實 績 | 數 百 分 比 |
|----------|-----|---------|--------|-----|---------|
| 検査人員 | 二五九 | | 東洋毛様線蟲 | 一 | 〇・四 |
| 無卵者 | 一四 | | 横川吸蟲 | 八 | 三・一 |
| 有卵者 | 二四五 | | 蛔蟲 | 三七 | 八・八 |
| 十二指腸蟲有卵者 | 二五 | | 蟲 | 三 | 一・三 |

右表に見るやうに全體の感染率は甚だ高い。

各年齢階級別に見るに一一歳—一五歳、一六歳—二〇歳の階級に於て一〇〇・〇%を示し、又五〇歳階級以上に於て等しく一〇〇・〇%を示す、何れも十二指腸蟲の有卵者が多く、五〇歳以上では殊に高率を示してゐる。又男女別に之を見れば有卵率に於て男女等しい。各種蟲卵別に見る時は總て男の方が高率である、これは十二指腸蟲に於て著しい。

十二指腸蟲有卵者の男に於て高率なのは以前調査の各部落と同じ傾向である。(第四表参照)

又、住民全體に對する率を見れば十五歳未満の者に感染者が多いのは左表に明らかであつて以前調査の各部落と等しい傾向である、

住民全體に對する寄生蟲有卵率

| 年 齡 別 | 檢 査 人 員 | 有 卵 者 | 檢 査 人 員
對スル各年
齡別百分比 | 總檢査人員
=對スル百
分 比 |
|----------|---------|-------|---------------------------|-----------------------|
| 一 歳—五 歳 | 三 | 三 | 八二・二 | 一〇〇 |
| 六 歳—一〇 歳 | 三 | 三 | 九二・九 | 一〇〇 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|----|-------|------|----------|-----|-------|------|
| 一一歳——一五歳 | 七 | 七 | 一〇〇・〇 | 一・四三 | 四六歳——五〇歳 | 三 | 九五・五 | 八・一 |
| 一六歳——二〇歳 | 三 | 二〇 | 一〇〇・〇 | 七・七 | 五一歳——五五歳 | 二 | 一〇〇・〇 | 四・三 |
| 二一歳——二五歳 | 三 | 一九 | 九五・〇 | 七・三 | 五六歳——六〇歳 | 一 | 一〇〇・〇 | 五・〇 |
| 二六歳——三〇歳 | 二 | 一八 | 九〇・〇 | 六・九 | 六一歳——七〇歳 | 一 | 一〇〇・〇 | 五・〇 |
| 三一歳——三五歳 | 一 | 一四 | 九三・三 | 五・四 | 七一歳——八〇歳 | 一 | 一〇〇・〇 | 一・五 |
| 三六歳——四〇歳 | 一 | 一五 | 九三・八 | 五・八 | 八一歳——以上 | 一 | 一〇〇・〇 | 一・五 |
| 四一歳——四五歳 | 八 | 七 | 八七・五 | 二・七 | 計 | 二五九 | 二四五 | 九四・六 |

又、家族別に之を見る時は五八家族中、家族全員有卵者なるもの四十三家族あつた、之を考ふれば如何に寄生蟲感染の濃厚であるかを了解することが出来る。此の内、全家族十二指腸蟲有卵者であるものが、十二家族あるのは恐ろしいことである。水田少く二毛作乾田の多い結果であらう。

第十一表

(第十一表参照)

| 家族番号 | 家族員數 | 検査人員 | 無卵者 | 有卵者 | 同 | 上 | 内 | 下 |
|------|------|------|-----|-----|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 二 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 二 | 六 | 六 | 一 | 五 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 三 | 七 | 七 | 一 | 六 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 四 | 七 | 七 | 一 | 六 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 五 | 四 | 四 | 一 | 三 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 六 | 四 | 四 | 一 | 三 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 七 | 七 | 七 | 一 | 六 | 一 | 一 | 一 | 一 |

