

第17表 年齢及ビ體性ニ依リテ分

年 齡	非 保 有 者			保 有 者							
				蛔 蟲		鞭 蟲		十二指腸蟲		東洋毛線蟲	
	男	女	計	男	女	男	女	男	女	男	女
0—1	92.3	100.0	96.5	7.7	—	—	—	—	—	—	—
1—2	73.9	50.0	62.8	26.1	45.0	—	5.0	—	—	—	—
2—3	36.4	46.2	41.7	45.5	30.8	—	7.7	—	—	—	—
3—4	31.1	41.2	34.8	55.1	35.3	—	—	—	5.9	—	—
4—5	28.6	33.3	31.1	42.9	40.0	—	—	—	—	—	—
5—6	4.0	10.0	6.7	20.0	30.0	12.0	—	4.0	5.0	—	—
6—7	15.8	14.3	15.2	26.3	35.7	—	—	5.3	7.1	—	—
7—8	9.5	15.4	11.8	28.6	15.4	9.5	—	4.8	7.7	—	—
8—9	25.0	8.3	15.0	37.5	20.8	—	8.3	—	4.2	—	—
9—10	5.0	—	2.6	25.0	15.8	10.0	—	5.0	5.3	—	—
10—11	5.6	14.3	9.4	16.7	7.1	—	—	11.1	—	—	—
11—12	7.1	17.7	12.9	14.3	41.2	—	—	14.3	—	—	—
12—13	15.8	5.0	10.3	15.8	10.0	—	5.0	5.3	10.0	—	—
13—14	—	7.1	3.6	14.3	28.6	7.1	—	14.3	—	—	—
14—15	—	12.5	6.7	7.1	12.5	7.1	—	—	6.2	—	—
15—20	4.0	6.2	5.2	12.0	16.9	6.0	3.1	12.0	12.3	—	—
20—25	5.6	2.4	2.9	3.6	—	—	2.4	14.3	9.5	3.6	—
25—30	2.1	2.3	2.2	4.2	4.5	—	2.3	16.7	11.4	—	—
30—35	2.2	2.4	2.3	6.5	2.4	3.4	4.8	13.1	9.5	—	—
35—40	7.9	—	3.9	7.9	10.3	—	2.6	26.3	18.0	—	—
40—45	—	7.7	3.7	—	7.7	3.6	—	10.7	11.5	—	—
45—50	4.0	—	2.0	12.0	—	—	8.3	16.0	—	—	—
50—55	13.9	6.4	11.8	2.8	3.1	—	—	30.6	12.5	—	—
55—60	—	23.5	11.1	—	11.8	5.3	—	15.8	5.9	—	—
60—70	12.2	7.7	9.7	2.4	7.7	2.4	3.8	17.1	5.8	—	—
70—80	5.6	—	2.2	5.6	7.4	11.1	7.4	22.2	3.7	—	—
80—	—	25.0	20.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—
年齢不詳	21.2	18.0	19.5	12.1	25.7	6.1	2.6	9.1	5.1	3.0	—
合 計	13.1	12.6	12.8	14.3	14.5	3.4	2.7	11.9	7.2	0.3	—

チタル寄生蟲感染狀況(百分比)其ノ2

有 卵 者															
横川氏 吸 蟲		蛔 蟲 鞭 蟲		蛔 蟲 十二指腸		蛔 蟲 横川氏		蛔 蟲 繞 蟲		鞭 蟲 十二指腸		鞭 蟲 東洋毛線		鞭 蟲 横川氏	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	18.2	—	—	7.7	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—
—	—	3.5	17.7	6.9	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	7.1	6.7	7.1	—	—	—	—	—	7.1	13.3	—	—	—	—
—	—	28.0	25.0	16.0	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—
—	—	26.3	14.3	5.3	14.3	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—
—	—	14.3	46.2	9.5	7.7	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—
—	—	6.2	20.8	31.3	12.5	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—
—	—	25.0	15.8	15.0	15.8	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—
—	—	16.7	28.6	16.7	7.5	—	—	—	—	5.6	7.1	—	—	—	—
—	—	21.4	11.8	14.3	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	26.3	25.0	25.3	10.0	—	—	—	—	5.3	10.0	—	—	—	—
—	—	7.1	14.3	21.4	7.5	—	—	—	—	7.1	7.1	7.1	—	—	—
—	—	14.3	18.8	35.7	18.8	—	—	—	—	7.1	6.2	—	—	—	—
—	—	8.0	9.2	20.0	26.2	—	—	—	—	12.0	7.7	—	—	—	—
—	—	3.6	7.1	39.3	38.1	—	—	—	—	10.7	11.9	—	—	—	—
—	—	8.3	6.8	25.0	27.3	—	—	—	—	6.3	6.8	—	—	—	—
—	—	2.2	2.4	30.4	33.3	—	—	—	—	4.3	11.9	—	—	—	2.2
—	—	2.6	5.3	5.1	23.7	12.8	—	—	—	10.5	5.1	—	—	—	—
3.6	—	14.4	7.7	17.9	19.2	—	—	—	—	17.9	3.8	—	—	—	3.6
4.0	—	—	8.3	28.0	25.0	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—
—	—	—	6.2	25.0	15.6	—	—	—	—	8.3	9.4	—	—	—	—
—	—	—	—	10.5	29.4	5.3	—	—	—	26.3	5.9	—	—	—	—
—	—	2.4	3.8	17.1	28.0	—	—	—	—	12.2	13.5	—	—	—	—
—	—	—	7.4	27.8	33.2	—	—	—	—	5.6	11.1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.0	10.3	6.1	18.0	—	—	—	—	3.0	2.6	—	—	—	—
0.3	0.1	8.4	9.9	18.9	19.3	0.1	—	0.1	—	6.8	7.9	0.1	—	0.3	—

第17表 年齢及ビ體性ニ依リテ分

年 齡	保 有													
	十二指腸 蟲東洋毛 線 蟲		十二指腸 蟲橫川氏 吸 蟲		十二指腸 蟲 繞 蟲		蛔 蟲 十二指腸 蟲		蛔 蟲 東洋毛 線 蟲		蛔 蟲 繞 蟲		蛔 蟲 十二指腸 蟲	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0—1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1—2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2—3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3—4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4—5	-	-	-	-	-	7.1	-	-	-	-	6.7	-	-	-
5—6	-	-	-	-	-	8.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-
6—7	-	-	-	-	5.3	10.5	7.1	-	-	-	-	-	-	-
7—8	-	-	-	-	-	19.0	7.7	-	-	-	-	-	-	-
8—9	-	-	-	-	-	-	16.7	-	-	-	-	-	-	-
9—10	-	-	-	-	-	15.0	31.6	-	-	-	-	-	-	-
10—11	-	7.1	-	-	-	27.8	14.3	-	-	-	-	-	-	-
11—12	-	-	-	-	-	28.6	5.9	-	5.9	-	-	-	-	-
12—13	-	-	-	-	-	5.3	20.0	-	-	-	5.0	-	-	-
13—14	-	-	-	-	-	21.4	35.7	-	-	-	-	-	-	-
14—15	-	-	-	-	-	28.6	25.0	-	-	-	-	-	-	-
15—20	-	-	-	-	-	24.0	16.9	-	-	-	-	-	1.5	-
20—25	-	-	-	-	3.6	14.3	28.6	-	-	-	-	-	-	-
25—30	4.2	2.3	-	-	-	29.2	34.1	-	-	-	-	-	-	-
30—35	-	-	-	-	-	28.3	26.2	-	-	-	-	-	2.4	-
35—40	-	-	-	-	-	13.2	41.0	-	-	-	-	-	-	-
40—45	-	-	-	-	-	25.0	42.3	-	-	-	-	-	-	-
45—50	-	-	-	-	-	36.0	37.5	-	-	-	-	-	-	-
50—55	-	-	-	-	-	16.7	40.6	-	-	-	-	-	-	-
55—60	-	-	5.3	-	-	31.6	23.5	-	-	-	-	-	-	-
60—70	4.9	-	-	-	2.4	21.9	15.4	-	-	-	-	2.4	3.8	-
70—80	5.6	-	-	-	-	16.7	25.9	-	-	-	-	-	-	-
80—	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-
年齢不詳	-	-	-	-	-	27.3	18.0	-	-	-	-	3.0	-	-
合 計	0.7	0.3	0.3	-	0.4	18.5	22.5	-	0.1	-	0.3	0.3	0.6	-

チタル寄生蟲感染狀況(百分比)其ノ2 (續)

卵												著								
蛔 蟲 十二指腸 吸		蛔 蟲 十二指腸 吸		蛔 蟲 十二指腸 吸		蛔 蟲 十二指腸 吸		蛔 蟲 十二指腸 吸		蛔 蟲 十二指腸 吸		蛔 蟲 十二指腸 吸		蛔 蟲 十二指腸 吸		蛔 蟲 十二指腸 吸		合 計		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-	-	-	3.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.1	50.0	-	-	37.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.6	53.8	-	-	58.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.9	58.8	-	-	65.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.4	66.7	-	-	68.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.0	90.0	-	-	93.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.2	85.7	-	5.3	84.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.5	84.6	-	-	88.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	91.7	-	-	85.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	-	-	-	-	95.0	100.0	-	-	97.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	94.4	85.7	-	-	90.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	-	-	-	92.9	82.3	-	-	87.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.2	95.0	-	-	89.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	92.9	-	-	96.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	87.5	-	-	93.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.0	93.8	-	-	94.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.4	97.6	-	-	97.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.9	97.7	-	3.7	97.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.8	97.6	-	-	97.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.1	100.0	-	-	96.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	92.3	-	-	96.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.0	100.0	-	-	98.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.1	90.6	-	-	88.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	76.5	-	-	88.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.8	92.3	-	-	90.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.4	100.0	-	-	97.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	75.0	-	-	80.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.8	82.0	-	-	80.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.9	87.4	-	-	87.2

第18表 年齢及ヒ體性ニ依リテ分チタ

年 齡	被 檢 査 人 員			保 有					
				實			蟲		
	男	女	計	蛔 蟲		計	鞭 蟲		計
男				女	男		女		
0—1	13	16	29	1	—	1	—	—	—
1—2	28	20	43	6	9	15	—	1	1
2—3	11	13	24	7	5	12	2	2	4
3—4	29	17	46	20	9	29	1	3	4
4—5	14	15	29	9	8	17	4	4	8
5—6	25	20	45	18	16	34	14	11	25
6—7	19	14	33	14	11	25	8	4	12
7—8	21	13	34	15	10	25	10	7	17
8—9	16	24	40	12	17	29	1	13	14
9—10	20	19	39	16	16	32	10	12	22
10—11	18	14	32	14	10	24	9	8	17
11—12	14	17	31	11	14	25	7	4	11
12—13	19	20	39	14	14	28	7	13	20
13—14	14	14	28	9	12	21	7	8	15
14—15	14	16	30	12	12	24	8	8	16
15—20	50	65	115	32	46	78	25	24	49
20—25	28	42	70	18	31	49	9	21	30
25—30	48	44	92	34	31	65	23	23	46
30—35	46	42	88	32	30	62	22	19	41
35—40	38	39	77	20	28	48	12	22	34
40—45	28	26	54	16	20	36	19	14	33
45—50	25	24	49	19	19	38	9	18	27
50—55	36	32	68	17	21	38	10	19	29
55—60	19	17	36	9	11	20	12	5	17
60—70	41	52	93	20	35	55	17	23	40
70—80	18	27	45	9	21	30	6	15	21
80—	1	4	5	—	3	3	—	2	2
年齢不詳	33	39	72	18	28	46	15	13	28
合 計	681	705	1386	422	487	909	267	316	583

ル 蛔 蟲、鞭 蟲、十二指腸蟲感染狀況

數	被 檢 査 人 員 對 性 別 百 分 比											
	十二指腸蟲			蛔 蟲			鞭 蟲			十二指腸蟲		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
—	—	—	—	7.7	—	3.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	26.1	45.0	34.9	—	5.0	23	—	—	—
—	2	2	2	63.6	38.5	50.0	18.2	15.4	16.7	—	15.4	8.3
2	1	3	3	68.9	52.9	63.1	3.4	17.7	8.7	6.9	5.9	6.5
3	2	5	5	64.3	53.3	58.6	28.6	26.7	27.6	21.4	13.3	17.2
9	7	16	16	72.0	80.0	75.5	56.0	55.0	55.5	36.0	35.0	35.5
6	5	11	11	73.7	78.5	75.7	42.1	28.6	36.4	31.6	35.7	33.3
8	3	11	11	71.4	76.9	73.5	47.6	53.8	50.0	38.1	23.1	32.4
5	10	15	15	75.0	70.9	72.5	6.3	54.1	35.0	31.3	41.6	37.5
7	13	20	20	80.0	84.2	82.0	50.0	63.1	55.4	35.0	68.4	51.3
11	7	18	18	77.7	71.4	75.0	50.0	57.1	53.1	61.1	50.0	56.3
8	4	12	12	78.5	82.3	80.6	50.0	23.5	35.5	57.1	23.5	38.7
8	10	18	18	73.7	70.0	71.8	36.9	65.0	51.3	42.1	50.0	46.2
9	7	16	16	64.3	85.7	75.0	50.0	57.1	53.6	64.3	50.0	57.1
10	9	19	19	85.7	75.0	80.0	57.1	50.0	53.3	71.4	56.3	63.3
35	42	77	77	64.0	70.8	67.8	50.0	36.9	42.6	70.0	64.6	66.9
24	37	61	61	64.3	73.8	70.0	32.2	50.0	42.9	85.7	88.1	87.2
41	37	78	78	70.8	70.5	70.7	47.9	52.3	50.0	85.4	84.1	84.7
36	37	73	73	69.6	71.4	70.5	47.8	45.5	46.6	78.3	88.1	83.0
30	31	61	61	52.6	71.8	62.3	31.6	56.4	44.3	78.9	79.5	79.2
21	20	41	41	57.1	76.9	66.7	67.9	53.8	61.1	75.0	76.9	75.9
20	20	40	40	76.0	79.2	77.5	36.0	75.0	55.1	80.0	83.3	81.7
30	26	56	56	47.2	65.6	55.9	27.8	59.4	42.7	83.3	81.2	82.3
17	11	28	28	47.4	64.7	55.5	63.1	29.4	47.2	89.4	64.7	77.8
33	40	73	73	48.8	67.3	59.1	41.5	44.3	43.0	80.5	76.9	78.5
14	21	35	35	50.0	77.8	66.7	33.3	55.5	46.7	77.8	77.8	77.8
—	2	2	2	—	75.0	60.0	—	50.0	40.0	—	50.0	40.0
18	17	35	35	54.5	71.8	63.9	45.5	33.3	38.9	54.5	43.6	48.6
406	421	827	827	62.0	69.1	65.5	39.2	44.8	42.1	59.6	59.7	59.7

## 第六章 人體寄生虫驅除

- (イ) 十二指腸虫卵保有者男406、女421計827名中、學齡兒童以下及70歳以上ヲ除キ驅虫通知カード737枚ヲ交附シ、昭和4年10月26日ヨリ11月1日マデ下記ノ如ク驅虫實施ス、

驅虫劑　ヘノボデイ油(三共販賣ノネマトール球ヲ使用)  
下劑　前下劑ハ、ヒマシ油、後下劑硫苦、センナ葉浸ノ合劑、(センナ葉6.0grヲ以テ50.0ccノ浸劑ヲ作り之ニ硫苦25.0grヲ溶解シ大人量トス)

投藥人員　男272、女280計552名

驅虫順序(1) 驅虫劑投與前夜8時頃、驅虫希望者ヲ各部落毎ニ、所定ノ場所ニ集メ、驅虫ニ關スル注意ヲ與ヘ、且ツ禁忌ノ疾病アルモノヲ除キ、9時過ギ「ヒマシ」油約30.0ccヲ服セシメ、又差シ支ヘノ爲集マル事ヲ得ザルモノニハ其ノ家族ヲシテ適量ノ「ヒマシ」油ヲ持チ歸ラシメ臨臥服用セシム。

(2) 驅虫當日ハ朝食ヲ廢シ小學校ニ集メ大體ニ於テ

(イ)……午前9時第1回目「ヘノボデイ」油0.6テ、少量ノ温湯ニテ服用

(ロ)……ク　10時第2回目同上

(ハ)……ク　11時前記硫苦「センナ」葉浸合劑約60.0ccヲ頓用直チニ温湯100.0—150.0ccヲ飲マシメ自然ノ排便ヲ待ツ

(ニ)……午後1時10.0%粥ヲ飯茶碗ニ2—3杯食セシム、ナホ多量ヲ望ムモノニハ注意シテ與フ、何故ナラバ食スル事大量ニ過グレバ嘔吐、腹痛、又ハ冷汗、不快感ヲ起ス事アレバナリ。

(ホ)……午後4時前後開散、夕食ニ關スル注意ヲ與ヘ常態ニ復セルモノヨリ隨意歸宅セシム。

下劑服用後2時間ニシテ便通ナキモノニハ更ニ少量ノ下劑ヲ與ヘ3時間ニシテナホ排便セザルモノニハ浣腸ヲ行フ。又體格、年齢、性、乗り物ニ對スル抵抗等ヲ考慮シテ投藥量ニ手心ヲ加ヘタルハ勿論ナリ。大體ニ於テ婦人ニ對シテハ第2回目ノ「ヘノボデイ」油0.3grヲ處方スル事トセリ。

以上ノ如クニシテ驅虫終了。翌日ノ業務ニ支障ヲ來シタリト届ケ出デタルモノ無シ。只13才(男)ノ小學兒童ニ第1回ヘノボデイ油約8滴ヲ投與後50分位ニシテ脱力感アリト云フモノアリ、直チニ下劑ヲ投與シ且ツ浣腸ヲ行ヒ安臥セシメ尙又腸洗ヲモ行ヒ、當日ハ特ニ注意シオキタルニ翌日ナホ多少疲勞感アリトテ欠席セリ。

- (ロ) 蛔虫卵保有者ニハ「サントニン」錠ト「ソーウエラン」錠トヲ混用ス。(但シ十二指腸虫卵ヲ併セ保有スルモノヲ除ク、シカシ十二指腸虫卵保有者ニシテ蛔虫卵ヲ併有シ十二指腸虫驅除藥ヲ用フル事ヲ得ザルモノニ對シテハ希望ニヨリ蛔虫驅除劑ヲ與ヘタリ)

投藥人員　男127、女160、計287名

今(イ)、(ロ)ノ項目ニ關スル詳細ヲ表記セバ第19、20表ノ如シ。

- (ハ) 驅虫劑投與後ノ糞便検査

事務ノ都合ニヨリ昭和4年11月26日及ビ同30日ニ採便、縣衛生試験所ニ於テ検査ス。其ノ成績ハ第21、22、23、24、表ノ如シ。

附——第2回目ノ検査ニ於テ大字關尾農、長野愛子(5才)ニ「ヒメノレビス、デイミヌータ」卵ヲ認メタリ。

- (ニ) 第2回目驅除藥投與

第1回驅虫後25乃至30日ニシテ第2回目ノ糞便検査ヲナシ之レニ應ジタル者前記ノ如ク男女合計323名中十二指腸虫卵保有者178名アリ、之レニ對シ第2回目驅虫ヲ實施シタシト、村當局ヨリ申請シ來タリシニヨリ昭和4年12月16、17、18日ノ3日間ニ亘リ第25表ノ如ク驅虫劑ヲ投藥ス、投藥方法ハ初回ト全ク同ジ。

驅虫藥　ネマトール

服藥人員　男65、女57、計122

蛔虫卵ノミノ保有者ニ對シテハ村醫中村氏ニヨリ驅虫劑投與ノ筈(一内野村ハ當時教化勸業講演會ノ爲役場吏員及ビ小學校教員ハ夫々部落ヲ受持チ多忙ヲ極メツ、アリシニヨル—)

附—12月18日、前記長野愛子(5歳)ヲ診ルニナホ「ヒメノレビス、デイミヌータ」卵ヲ保有ス體格、榮養共ニ良。至ツテ健康ナリ、未ダ藥ヲ用ヒシコトナシト云フ。下劑ヲ與ヘントシタレドモ飲マズ。シタガツテ驅虫劑ヲ與フル事ヲ得ザリシハ遺憾ナリキ。

第19表 十二指腸蟲驅除藥服用人員

月 日 大字	10月		"				11月	合計	驅蟲券 交付數	驅蟲券 交付數 對服藥者 百分比	
	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日				
見大	13 2	21 21	—	—	1	1	2	30 23	61	87	76.8
古	—	21 28	—	—	—	—	—	21 28	49	62	79.0
關	18 19	—	—	—	2	3 1	—	21 22	43	59	72.9
太郎丸 小深田	12 11	—	—	—	3 5	—	1	16 16	32	40	80.0
原	15 25	—	—	—	2	1	—	16 27	43	46	93.5
君ヶ	—	—	21 17	—	—	—	—	21 17	38	69	55.1
彌山	—	—	—	47 46	—	—	—	47 46	93	125	74.4
下町	—	—	—	28 24	4 4	—	—	32 28	60	78	70.1
浦田	—	—	—	8 17	—	—	—	8 17	25	27	92.6
上町	—	—	—	2 1	22 17	4 3	—	28 21	49	80	62.5
小路	—	—	—	2 1	18 28	3 5	—	23 34	57	68	83.8
合計	58 57	43 50	21 17	47 46	44 52	49 50	10 8	272 280	737	74.9	
	115	93	38	93	96	99	18	552			

備考 投薬場所ハ君ヶ畑ハ區長住宅、彌山ハ青年會場、其ノ他ハ小學校裁縫室及ビ教員宿直室ヲ用ヒタリ

第20表 蛔蟲驅除藥服用人員

月 日 大字	10月		"		11月	合計	驅除券 交付數	驅除券 交付數 對服藥者 百分比	
	28日	29日	29日	1日	1日				
見大	—	—	—	—	5 10	5 10	15	44	34.1
古	—	—	—	—	14 11	14 11	35	31	80.6
關	—	—	—	—	15 15	15 15	30	34	88.2
太郎丸 小深田	—	—	—	—	—	—	—	11	—
原	—	—	—	—	13 14	13 14	27	34	79.4
君ヶ	—	—	—	—	12 16	12 17	29	44	65.9
彌山	—	—	—	—	16 20	17 26	43	63	68.3
下町	—	—	—	—	16 28	16 28	44	49	89.8
浦田	—	—	—	—	1 4	1 4	5	6	83.3
上町	—	—	—	—	18 20	18 20	38	49	77.6
小路	—	—	—	—	16 15	16 15	31	23	134.8
合計	12 16	16 20	99 124	127 160	287	366	78.4		
	28	30	223	287					

備考 投薬場所ハ十二指腸蟲驅除藥投與場所ニ同シ

第21表 年齢及び體性ニ依リ分テタル驅虫劑投

年 齡	被 檢 査 人 員			保 有					
				驅 蟲 劑 投 與 前					
	男	女	計	蛔 蟲			十 二 指 腸 蟲		
男				女	計	男	女	計	
0—1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1—2	3	1	4	3	1	4	—	—	—
2—3	1	—	1	1	—	1	—	—	—
3—4	4	2	6	4	2	6	1	—	1
4—5	1	4	5	1	4	5	—	—	—
5—6	4	6	10	4	6	10	—	2	2
6—7	4	2	6	4	2	6	—	—	—
7—8	6	5	11	6	4	10	2	4	6
8—9	6	11	17	6	11	17	4	3	7
9—10	8	11	19	8	11	19	4	8	12
10—11	11	3	14	10	2	12	7	1	8
11—12	6	7	13	4	6	10	8	3	11
12—13	6	10	16	4	8	12	4	7	11
13—14	6	7	13	4	6	10	5	2	7
14—15	8	8	16	8	7	15	7	7	14
15—20	21	27	48	17	20	37	17	20	37
20—25	11	11	22	6	6	12	10	11	21
25—30	18	14	32	16	12	28	17	14	31
30—35	18	15	33	15	11	26	18	14	32
35—40	18	14	32	11	11	22	14	13	27
40—45	10	15	25	6	11	17	9	13	22
45—50	7	11	18	6	10	16	7	10	17
50—55	19	13	32	14	9	23	19	13	32
55—60	9	3	12	5	1	6	8	3	11
60—70	12	15	27	6	15	21	12	14	26
70—80	1	2	3	—	2	2	1	1	2
80—	—	1	1	—	1	1	—	—	—
年齢不詳	9	12	21	8	12	20	7	8	15
合 計	227	230	457	178	191	369	181	171	352

與前後ニ於ケル蛔虫、十二指腸虫感染狀況及驅虫率

卵 者						蛔蟲及十二指腸蟲ノ驅蟲率					
驅 蟲 劑 投 與 後											
蛔 蟲			十 二 指 腸 蟲			蛔 蟲			十 二 指 腸 蟲		
男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	—	—	—	100.0	—	75.0	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1	4	1	—	1	25.0	50.0	33.3	—	—	—
—	1	1	—	—	—	100.0	75.0	80.0	—	—	—
2	1	3	—	1	1	50.0	83.3	70.0	—	50.0	50.0
2	—	2	—	—	—	50.0	100.0	66.7	—	—	—
2	2	4	1	2	3	66.7	50.0	60.0	50.0	50.0	50.0
3	3	6	2	1	3	50.0	72.7	64.7	50.0	66.7	57.1
2	3	5	—	4	4	75.0	72.7	73.7	100.0	50.0	66.7
2	1	3	3	1	4	80.0	50.0	75.0	57.1	—	50.0
—	2	2	4	1	5	100.0	66.7	80.0	50.0	66.7	54.5
2	2	4	—	2	2	50.0	75.0	69.2	100.0	71.4	81.8
1	—	1	1	1	2	75.0	100.0	90.0	80.0	50.0	71.4
2	4	6	4	4	8	75.0	42.8	60.0	42.9	42.9	42.9
3	4	7	5	6	11	82.3	80.0	81.1	70.6	70.0	70.3
2	—	2	8	6	14	66.7	100.0	83.8	20.0	45.4	33.3
1	4	5	8	11	19	93.7	66.7	82.1	42.9	21.5	38.7
4	3	7	6	7	13	73.3	72.7	73.1	66.7	50.0	59.4
3	5	8	7	8	15	72.7	54.5	63.6	50.0	38.5	44.5
1	3	4	4	7	11	83.3	72.7	76.5	55.6	46.2	50.0
—	5	5	3	4	7	100.0	50.0	68.7	57.1	60.0	58.8
1	4	5	9	5	14	92.9	55.6	78.2	52.6	61.5	56.2
1	1	2	4	2	6	80.0	—	66.7	50.0	33.3	45.4
1	3	4	8	7	15	83.3	80.0	81.0	33.3	50.0	42.3
—	—	—	1	1	2	—	100.0	100.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	3	7	3	3	6	50.0	75.0	65.0	57.1	62.5	60.0
43	56	99	82	84	166	77.8	70.7	73.2	54.7	55.9	55.1

第22表 十二指腸蟲驅除成績 (ネマトール球ニ依ル)

區分	被検査人員			十二指腸蟲卵ヲ認メ得ザリシ者ノ實數			同上百分比		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計
古門	17	21	38	7	7	14	41.2	33.3	36.8
見定、大石	19	16	35	10	11	21	52.6	68.8	60.0
關屋	14	14	28	9	4	13	65.0	28.6	46.4
太郎丸、小深田	1	3	4	1	2	3	100.0	66.7	75.0
横山、原田	9	13	22	6	7	13	66.7	53.8	59.1
君ヶ畑	14	7	21	11	5	16	78.6	71.4	76.2
彌山	24	29	53	15	20	35	62.5	69.0	66.0
下町	24	20	44	12	10	22	50.0	50.0	50.0
水町、浦田	9	4	13	4	3	7	44.4	75.0	53.8
上町	21	16	37	15	5	20	71.4	31.3	54.1
小路	13	15	28	6	8	14	46.2	53.4	50.0
計	165	158	323	96	82	178	58.2	51.9	55.1

第23表 蛔蟲驅除成績 (ネマトール球ニ依ル)

區分	被検査人員			蛔蟲卵ヲ認メ得ザリシ者ノ實數			同上百分比		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計
古門	11	16	27	7	9	16	63.6	56.3	59.3
見定、大石	12	11	23	8	9	17	66.7	81.8	73.9
關屋	13	11	24	10	7	17	76.9	63.6	70.9
太郎丸、小深田	1	3	4	-	1	1	-	33.3	25.0
横山、原田	8	10	18	6	5	11	75.0	50.0	61.1
君ヶ畑	12	6	18	11	4	15	91.7	66.7	83.3
彌山	17	20	37	15	11	26	88.2	55.2	70.3
下町	20	17	37	17	11	28	85.0	64.7	75.7
水町、浦田	6	2	8	6	2	8	100.0	100.0	100.0
上町	10	9	19	8	6	14	80.0	66.7	73.7
小路	5	10	15	4	10	14	80.0	100.0	93.3
計	115	115	230	92	75	167	80.0	65.2	72.6

第24表 蛔蟲驅除成績 (サトニン錠及マクニン錠又ハソウエラン錠ニ依ル)

區分	被検査人員			蛔蟲卵ヲ認メ得ザリシ者ノ實數			同上百分比		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計
古門	9	7	16	7	6	13	77.8	85.7	81.3
見定、大石	4	4	8	2	2	4	50.0	50.0	50.0
關屋	7	9	16	5	8	13	71.4	88.9	81.3
太郎丸、小深田	2	2	4	1	2	3	50.0	100.0	75.0
横山、原田	4	9	13	3	7	10	75.0	77.8	76.9
君ヶ畑	4	3	7	1	-	1	25.0	-	14.3
彌山	7	5	12	4	2	6	57.1	40.0	50.0
下町	8	13	21	8	12	20	100.0	92.4	95.2
水町、浦田	1	1	2	-	1	1	-	100.0	50.0
上町	13	10	23	9	8	17	69.3	80.0	73.9
小路	6	8	14	5	7	12	83.3	87.5	85.7
計	65	71	136	45	55	100	69.2	77.5	73.5

備考 君ヶ畑、及彌山ノ兩部落ハ「サトニン」錠ト「マクニン」錠トヲ投與シ其ノ他ノ部落ニ對シテハ「サトニン」錠ト「サウエラン」錠トヲ投與セリ

第25表 第2回ネマトール服薬人員

大 字	月 日 別	12月		合 計	驅 虫 券 交 付 數	驅 虫 券 交 付 者 對 服 藥 者 百 分 比	
		16日	17日				18日
見大	定石 男女	8	—	8	14	20	70.0
		6	—				
古	門 男女	12	—	12	24	29	82.7
		12	—				
願	屋 男女	5	—	5	8	18	44.5
		3	—				
太小	耶丸 男女	—	—	1	2	31	100.0
		—	—				
原	田山 男女	3	—	3	6	11	54.5
		3	—				
君	ヶ畑 男女	—	2	2	5	11	45.5
		—	3				
彌	山 男女	—	6	6	8	15	53.3
		—	2				
下	町 男女	—	—	13	20	25	80.0
		—	—				
浦	田 男女	1	—	1	1	9	11.1
		—	—				
上	町 男女	—	—	7	12	19	90.5
		—	—				
小	路 男女	—	—	7	7	14	88.9
		—	—				
合	計 男女	29	8	65	122	178	68.5
		24	5				
	計	53	13	56	122		

備 考 彌山,君ヶ畑ハ彌山青年會場、其ノ他ハ内野村小學校ニテ實施セリ、

糟屋郡青柳村ニ於ケル人體寄生蟲検査及ビ驅除



# 糟屋郡青柳村ニ於ケル人體寄生虫検査及ビ驅除

## 目 次

1、緒 言	43
2、字別現住人口及ビ戸數	43
3、人體寄生虫検査	43
4、寄生虫感染状況(年齢、虫卵別)	45
5、蛔虫鞭虫十二指腸虫ノ感染状況(年齢體性別)	53
6、寄生虫驅除	56
7、驅虫剤投與後ノ糞便検査成績	57

## 糟屋郡青柳村ニ於ケル人體寄生蟲検査及ビ驅除

### (1) 緒言

糟屋郡青柳村ハ嘗テ大正15年3月人體寄生蟲驅除ヲ行ヒ、其ノ後ノ成績ニ鑑ミ、昭和4年度ニ於テ再ビ寄生蟲検査及ビ驅除實施方ヲ打テ合ハセ、昭和4年10月8日ヨリ11月7日ニ至ル間ニ糞便ヲ採集シ縣衛生試験所ニ於テ検査ス、検査従事員、衛生技師1同主事補1同助手1計3名

### (2) 字別現住人口及ビ戸數

字別現住人口及ビ戸數ハ第1表ノ如シ

第1表 字別人口及ビ戸數

字別 性 戸數 別	今在家	新原	川上 原町	下町	青柳	小竹	合計
	23	50	65	72	147	37	394
男	68	146	138	144	320	105	921
女	75	145	160	154	334	138	1,006
計	143	281	298	298	654	243	1,927
一戸平均人口	6.3	5.6	4.6	4.1	4.5	6.2	4.9

### (3) 人體寄生蟲検査

検査方法ハ塗抹法ニヨル、被検査人員ハ住民ノ168.9%ニ該當ス、  
本村ニ於ケル寄生蟲感染狀況ヲ體性及ビ字別ニ見レバ第2表ノ如シ

第2表 字及體性ニ依リテ分

字別 蟲卵性別	今在家			新原			川原上町		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計
實									
被検査人員	48	56	104	69	69	138	109	122	231
非保有卵者	9	7	16	17	12	29	26	34	60
保有卵者	39	49	88	52	57	109	83	88	171
蛔蟲	22	31	53	38	37	75	55	58	113
鞭蟲	12	18	30	14	15	29	25	19	44
十二指腸蟲	23	35	58	34	41	75	53	59	112
東洋毛様線蟲	6	6	12	14	17	31	10	7	17
横川氏吸蟲	2	-	2	1	-	1	1	-	1
蟯蟲	1	-	1	-	-	-	-	-	-
肺藏ガストマ	-	1	1	-	-	-	-	-	-
被検査人員ニ									
非保有卵者	18.8	12.5	15.4	24.6	17.4	21.0	23.8	27.9	26.0
保有卵者	81.2	87.5	84.6	75.4	82.6	79.0	76.2	72.1	74.2
蛔蟲	45.8	55.4	51.0	55.0	53.6	54.4	50.5	47.6	48.9
鞭蟲	25.0	32.3	28.8	20.3	21.7	21.0	22.9	15.6	19.1
十二指腸蟲	47.8	62.5	55.8	49.3	59.4	54.4	48.6	48.4	48.6
東洋毛様線蟲	12.5	10.4	11.5	20.3	24.6	22.5	9.2	5.7	7.4
横川氏吸蟲	4.2	-	1.9	1.6	-	0.7	0.9	-	0.4
蟯蟲	2.1	-	0.9	-	-	-	-	-	-
肺藏ガストマ	-	1.8	0.9	-	-	-	-	-	-

チタル寄生蟲感染狀況

下町			青柳			小竹			合計			大正15年4月検査ノ成績トノ比較
男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	
數												
125	130	255	188	216	404	88	107	195	627	700	1327	1,900
28	29	57	51	59	110	32	33	65	163	174	337	210
97	101	198	137	157	294	56	74	130	464	526	990	1,690
60	66	126	95	95	190	33	54	87	303	341	644	1,290
29	33	62	36	37	73	8	13	21	124	135	259	533
69	61	130	72	92	164	37	42	79	288	330	618	1,248
12	19	31	13	12	25	4	4	8	59	65	124	161
-	-	-	3	-	3	-	-	-	7	-	7	5
-	-	-	-	5	5	-	-	-	1	5	6	2
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
對スル百分比												
22.4	22.3	22.4	27.2	27.3	27.2	36.4	30.8	33.4	26.0	24.9	25.4	11.1
77.6	77.7	77.6	72.8	72.7	72.8	63.6	69.2	66.6	74.0	75.1	74.6	88.9
48.0	50.8	49.4	50.6	44.0	47.0	37.5	50.4	44.6	48.3	48.7	48.5	67.9
23.2	25.4	24.3	19.2	17.1	18.1	9.1	12.2	10.8	19.8	19.3	19.5	28.1
55.2	47.0	51.0	38.3	42.6	40.6	42.1	39.3	40.5	45.9	47.1	46.6	65.7
9.6	14.6	12.2	6.9	5.6	6.2	4.5	3.7	4.1	9.4	9.3	9.3	8.5
-	-	-	1.6	-	0.7	-	-	-	1.1	-	0.5	0.3
-	-	-	-	2.3	1.2	-	-	-	0.2	0.7	0.5	0.1
0.8	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.2	

(+) 更ニコノ寄生蟲感染狀況ヲ年齢ノ蟲卵ニ依リテ分カチ見レバ第3、4表ノ如シ





第4表 年齢及體性ニ依リテ分

年 齡	非保有卵者			保							
				蛔 蟲		鞭 蟲		十二指腸 蟲		東洋毛様 線 蟲	
	男	女	計	男	女	男	女	男	女	男	女
0—1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1—2	-	100.0	50.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-
2—3	57.1	71.4	64.3	28.6	14.3	14.3	14.3	-	-	-	-
3—4	60.0	50.0	55.6	40.0	33.3	-	-	-	-	-	-
4—5	55.6	60.0	58.3	22.2	26.7	11.1	-	-	-	-	6.7
5—6	52.6	50.0	51.8	36.9	50.0	-	-	-	-	-	-
6—7	50.0	35.0	42.1	16.7	50.0	5.6	5.0	10.5	-	-	5.0
7—8	31.3	37.5	34.4	43.9	25.0	6.2	-	-	12.5	-	-
8—9	36.0	50.0	43.1	40.0	23.1	-	7.7	8.0	7.7	4.0	-
9—10	23.1	37.5	31.0	30.8	25.0	-	-	15.4	-	-	-
10—11	27.8	36.9	32.4	28.8	21.1	-	10.5	5.6	15.8	5.6	-
11—12	33.3	31.3	32.3	13.3	31.3	6.7	-	13.3	12.5	-	-
12—13	23.5	21.8	23.5	35.3	26.1	-	13.1	5.9	13.1	-	-
13—14	27.3	27.8	27.6	27.3	33.3	-	-	9.1	11.1	18.2	-
14—15	27.3	36.9	33.3	27.3	15.8	-	5.3	9.1	10.5	-	-
15—20	28.6	27.5	28.0	19.0	13.8	1.6	2.5	11.1	13.8	-	-
20—25	15.6	22.5	19.5	25.0	17.5	6.3	2.6	6.3	17.5	-	-
25—30	20.0	14.3	16.8	10.0	6.4	2.0	1.6	16.0	22.2	-	1.6
30—35	18.9	18.8	18.8	11.3	22.9	1.9	-	18.9	22.9	-	-
35—40	18.4	13.9	16.5	10.2	8.3	-	5.6	12.3	25.0	-	-
40—45	26.7	18.0	21.7	6.7	10.3	3.3	-	16.7	15.4	-	-
45—50	31.1	10.4	18.2	6.9	6.3	-	-	20.7	18.8	-	4.2
50—55	10.0	7.0	8.4	12.5	9.3	-	-	37.5	32.6	-	2.3
55—60	19.5	14.8	17.5	2.8	33.3	-	-	27.8	11.1	-	-
60—70	15.6	38.7	27.0	21.9	12.9	3.1	3.2	6.2	6.5	-	-
70—80	-	7.7	5.6	40.0	23.1	-	-	20.0	23.1	-	15.4
80—	40.0	33.3	37.5	40.0	33.3	-	-	-	-	-	-
年齢不詳	25.0	7.7	14.3	-	38.5	12.5	7.7	12.5	15.4	-	-
合 計	26.0	24.9	25.4	18.8	18.6	2.1	2.6	13.5	15.3	0.6	1.1

チタル寄生蟲感染狀況(百分比)其ノ2

有		卵								者					
横川氏 吸 蟲		蟯 蟲		蛔 蟲		蛔 蟲		蛔 蟲		蛔 蟲		蛔 蟲		鞭 蟲	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11.1	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	12.5	6.2	12.5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.0	3.8	8.0	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15.4	6.2	7.7	6.2	-	-	6.2	-	-	-	7.7	6.2
-	-	-	-	5.6	-	11.1	10.5	11.1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6.7	12.5	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	17.7	8.7	5.9	8.7	-	-	-	-	-	-	11.8	-
-	-	-	-	9.1	11.1	9.1	5.6	-	-	-	-	-	-	-	5.6
-	-	-	-	-	5.3	18.2	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.5	6.3	2.5	14.3	15.0	-	-	-	-	-	-	1.3	1.6
-	-	-	-	-	5.0	21.9	17.5	-	-	-	-	-	-	9.4	5.0
-	-	-	-	8.0	-	26.0	34.9	-	-	-	-	-	-	8.0	7.9
-	-	-	-	1.9	2.1	20.8	12.5	1.9	-	-	-	-	-	5.7	6.3
-	-	-	-	6.1	2.8	10.2	19.5	2.0	-	4.1	-	-	-	18.4	13.9
-	-	-	-	3.3	7.7	16.7	23.1	-	-	-	-	-	-	-	2.6
6.9	-	-	-	6.9	6.3	13.8	27.1	-	-	-	-	-	-	-	4.2
-	-	-	-	2.5	2.3	22.5	25.6	-	-	-	-	-	-	2.5	-
-	-	-	-	-	3.7	22.2	3.7	-	-	-	-	-	-	2.8	3.7
3.1	-	-	-	-	6.5	15.6	9.7	-	3.2	-	-	-	-	9.4	3.2
-	-	-	-	-	-	20.0	7.7	-	7.7	-	-	-	-	20.0	7.7
-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	12.5	-	12.5	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5	-	-	0.3	4.3	4.1	14.7	15.3	0.6	0.4	0.3	-	-	-	0.1	3.6

第4表 年齢及體性ニ依リテ分

年 齡	保 有													
	鞭 蟲 東洋毛線 蟲		鞭 蟲 橫川氏 吸 蟲		鞭 蟲 鏡 蟲		十二指腸 蟲 東洋 毛線蟲		十二指腸 蟲 鏡 蟲		蛔 蟲 十二指腸 蟲		蛔 蟲 東洋毛 線 蟲	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0—1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1—2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2—3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3—4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4—5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5—6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6—7	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	5.0	-	-	
7—8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5	-	-	-	
8—9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9—10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10—11	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	-	
11—12	-	-	-	-	-	6.3	-	-	-	20.0	-	-	-	
12—13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13—14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14—15	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	9.1	10.5	-	-	
15—20	1.6	-	-	-	-	6.3	1.3	-	-	4.8	11.3	1.6	-	
20—25	-	-	-	-	-	3.1	2.6	-	-	3.1	-	-	-	
25—30	-	1.6	-	-	-	2.0	-	-	-	6.0	7.9	-	-	
30—35	-	-	-	-	-	3.8	-	-	-	7.5	8.3	-	-	
35—40	2.0	-	-	-	-	6.1	2.8	-	-	2.0	-	-	-	
40—45	-	2.6	3.3	-	-	3.3	2.6	-	2.6	10.0	12.8	-	-	
45—50	-	-	-	-	-	6.9	1.9	-	-	-	14.6	-	-	
50—55	-	2.3	-	-	-	-	4.6	-	-	2.5	4.6	-	-	
55—60	-	-	-	-	-	2.8	14.8	-	-	13.9	-	-	-	
60—70	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	3.1	3.2	-	-	
70—80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-	-	
80—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	-	-	
年齢不詳	-	-	-	-	-	-	7.7	-	-	25.0	7.7	-	-	
合 計	0.3	0.4	0.2	-	0.2	0.1	2.7	2.0	-	0.1	5.1	5.6	0.2	

チタル寄生蟲感染狀況(百分比)其ノ二(續)

卵						吞						合 計				
蛔 蟲 肺 藏 下マ		蛔 蟲 十二指腸 毛線蟲		鞭 蟲 十二指腸 毛線蟲		蛔 蟲 十二指腸 毛線蟲		蛔 蟲 十二指腸 毛線蟲		蛔 蟲 十二指腸 毛線蟲		蛔 蟲 十二指腸 毛線蟲		男	女	計
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	50.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.9	28.6	35.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0	50.0	44.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.4	40.0	41.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.4	50.0	48.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	65.0	57.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.7	62.5	65.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.0	50.0	56.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.9	62.5	69.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.2	63.1	67.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.7	68.7	67.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.5	78.2	77.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.7	72.2	72.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.7	63.1	66.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.4	72.5	72.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.4	77.5	80.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.0	85.7	83.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.1	81.2	81.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.6	86.1	83.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.3	82.0	78.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.9	89.6	81.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.0	93.0	91.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.5	85.2	82.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.4	61.3	73.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	92.3	94.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0	66.7	62.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	92.3	85.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.0	75.1	74.6

(5) 次ニ年齢並ニ體性別ニ依リテ蛔蟲、鞭蟲、及ビ十二指腸蟲ノ感染狀況ヲ見レバ第五表ノ如シ

第5表 年齢及體性ニ依リテ分チタル

年 齡	被 檢 査 人 員			保 有 數								
				蛔 蟲			鞭 蟲			十 二 指 腸 蟲		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
0—1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1—2	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
2—3	7	7	14	2	1	3	1	1	2	—	—	—
3—4	15	12	27	6	6	12	—	2	2	—	—	—
4—5	9	15	24	3	5	8	2	—	2	—	1	1
5—6	19	8	27	9	4	13	—	—	—	2	—	2
6—7	18	20	38	5	11	16	2	2	4	4	1	5
7—8	16	16	32	10	8	18	3	2	5	3	4	7
8—9	25	26	51	13	9	22	1	3	4	4	4	8
9—10	13	16	29	7	8	15	3	3	6	4	4	8
10—11	18	19	37	11	7	18	2	3	5	4	6	10
11—12	15	16	31	7	8	15	6	3	9	6	3	9
12—13	17	23	40	10	12	22	5	6	11	4	10	14
13—14	11	18	29	5	10	15	1	3	4	2	5	7
14—15	11	19	30	7	8	15	1	5	6	5	7	12
15—20	63	80	143	30	40	70	12	17	29	26	39	65
20—25	32	40	72	19	19	38	8	7	15	17	21	38
25—30	50	63	113	26	31	57	12	13	25	30	47	77
30—35	53	48	101	27	25	52	11	10	21	34	27	61
35—40	49	36	85	19	13	32	18	10	28	28	25	53
40—45	30	39	69	14	23	37	7	10	17	17	24	41
45—50	29	48	77	10	29	39	3	13	16	14	35	49
50—55	40	43	83	18	19	37	6	7	13	30	33	63
55—60	36	27	63	17	15	32	7	4	11	28	13	41
60—70	32	31	63	17	15	32	7	7	14	18	11	29
70—80	5	13	18	3	6	9	1	2	3	3	6	9
80—	5	3	8	3	2	5	1	—	1	1	1	2
年齢不詳	8	13	21	4	8	12	4	2	6	4	6	10
合 計	627	700	1,327	303	341	644	124	135	259	288	330	618

蛔蟲、鞭蟲、十二指腸蟲ノ感染狀況

有 卵 者 ノ 内								
被 檢 査 人 員 對 性 別 百 分 比								
蛔 蟲			鞭 蟲			十 二 指 腸 蟲		
男	女	計	男	女	計	男	女	計
—	—	—	—	—	—	—	—	—
100.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—
28.6	14.3	21.4	14.3	14.3	14.3	—	—	—
40.0	50.0	43.5	—	16.7	7.4	—	—	—
33.3	33.3	33.3	22.2	—	8.3	—	6.7	4.2
47.4	50.0	48.2	—	—	—	10.5	—	7.4
27.8	55.0	42.1	11.1	10.0	10.5	22.2	5.0	13.2
62.5	50.0	56.2	18.8	12.5	15.6	18.8	25.0	21.9
52.0	34.6	43.2	4.0	11.6	7.8	16.0	15.4	15.7
53.9	50.0	51.7	23.1	18.8	17.3	30.8	25.0	27.6
61.1	36.8	48.6	11.1	15.8	13.5	22.2	31.6	27.0
46.7	50.0	48.4	40.0	18.8	29.0	40.0	18.8	29.0
58.8	52.1	55.0	29.4	26.1	27.5	23.5	52.1	35.0
45.5	55.5	51.7	9.1	16.7	13.8	18.2	27.8	24.1
63.7	42.1	50.0	9.1	26.3	20.0	45.5	36.9	40.0
47.6	50.0	49.0	19.0	21.3	20.3	41.3	48.8	45.5
59.4	47.5	52.8	25.0	17.5	20.8	53.1	52.5	52.8
52.0	49.2	50.5	24.0	20.6	22.1	60.0	74.6	68.1
50.9	52.1	51.5	20.8	20.8	20.8	64.1	56.3	60.4
38.8	36.1	37.7	36.7	27.8	31.9	57.1	69.4	62.4
46.7	59.0	53.6	23.3	25.7	24.6	56.7	61.5	59.4
34.5	60.4	50.7	10.3	27.1	20.8	48.3	72.9	63.6
45.0	44.2	44.6	15.0	16.3	15.7	75.0	76.7	75.9
47.2	55.6	50.8	19.5	14.8	17.5	77.8	48.2	65.1
53.2	48.4	50.8	21.9	22.6	22.2	56.3	35.5	46.1
60.0	46.2	50.0	20.0	15.4	16.7	60.0	46.2	50.0
60.0	66.7	62.5	20.0	—	12.5	20.0	33.3	25.0
50.0	61.5	57.1	50.0	15.4	28.6	50.0	46.2	47.6
48.3	48.7	48.5	19.8	19.3	19.5	45.9	47.1	46.6



(6) 寄生蟲驅除

昭和5年3月15日ヨリ同月19日ニ至ル5日間ニ亘リ同村小學校講堂ニ於テ驅蟲實施スヘノボディ油投與人員567名、「サントニン」-「ソーウエラン」投與人員377名。

驅蟲劑 十二指腸蟲驅除ノ目的ニハ「ヘノボディ油」蛔蟲驅除(蛔蟲卵ノミノ保有者)ノ目的ニハ「サントニン」-「ソーウエラン」ヲ用ヒタリ。

驅除方法 (イ)十二指腸蟲驅除ノ目的ニハ

1. ヘノボディ油投與前夜9時頃ヒマシ油約30.0cc 頓服、翌日ハ朝食ヲ廢セシメ所定ノ時刻ニ小學校講堂ニ集合セシメ
2. 午前9時「ヘノボディ油」大人量約0.6cc (約18滴) 小量ノ温湯ト共ニ投與
3. 午前10時「ヘノボディ油」大人量約0.6gr ナ硫苦溶液(コノ溶液60.0cc中ニ硫苦30.0gr ナ溶解セシム) 約60.0ccヲ以ツテ服用セシメ直チニ温湯約120.0-150.0cc、ヲ飲マシム
4. 正午過ギ10%粥ヲ飯茶碗ニ2-3杯食セシメタリ。

以上ノ如クニシテ十二指腸蟲驅除劑服藥者第6.7表ノ如シ

(ロ)蛔蟲驅除希望者ニ對シテハ同村小學校教室ニ於テ3月16日午前10時半ニ「サントニン錠」ヲ投與、午後3時半「ソーウエラン錠」ヲ飲マシム、其ノ數377名

第6表 十二指腸蟲驅除人員

月日 性別	3月	〃	〃	〃	〃	合計	被検査人員 對服藥者 百分比	全住民 對服藥者 百分比
	15日	16日	17日	18日	19日			
男	53	60	66	60	49	288	46.0	31.3
女	35	68	68	63	45	279	39.9	26.3
計	88	128	134	123	94	567	42.7	29.4

第7表 大字別十二指腸蟲驅除人員

大字 性別	青柳町	新原	今在家	青柳	小竹	合計
	川原					
男	100	44	29	75	40	288
女	85	42	36	85	31	279
計	185	86	65	160	71	567

(7) 驅蟲劑投與後糞便検査

驅蟲劑投與ハ上記ノ如ク3月15日ヨリ19日ニ至ル5日間ニ終了、其ノ後33日即チ4月23日糞便ヲ採集シ24日ヨリ5月3日ニ至ル間ニ縣衛生試験所ニ於テ検査ス、其ノ成績ハ第8.9.10表ノ如シ。(事務ノ都合ニヨリ毎日3時間ヅ、検査糞便ハ其ノ間氷室ニ貯フ) ナホ第2回驅除ハ村醫ニヨリ實施ノ筈。

第8表 十二指腸蟲驅除成績

區分	被検査人員			驅除シ得タルモノ			同上百分比		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計
今在家	11	17	28	3	7	10	27.3	41.2	35.7
新原	8	11	19	4	3	7	50.7	27.3	36.8
町、川原	59	53	112	22	23	45	37.3	43.4	40.2
青柳	36	32	68	13	13	26	36.1	40.6	38.3
小竹	17	21	38	4	7	11	23.5	33.3	29.9
計	131	134	265	46	35	99	35.1	39.6	37.4

第9表 「ネマトール」球服藥ニ依ル蛔蟲驅除成績

區分	被検査人員			驅除シ得タルモノ			同上百分比		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計
今在家	7	12	19	7	9	16	100.0	75.0	84.2
新原	6	5	11	6	5	11	100.0	100.0	100.0
町、川原	28	26	54	25	20	45	89.3	76.9	83.4
青柳	23	15	38	20	12	32	87.0	80.0	84.2
小竹	5	8	13	5	6	11	100.0	75.0	84.6
計	69	66	135	63	52	115	91.3	78.8	85.2

第10表 「サントニン」錠及「ソウエラン」錠  
 及服薬ニ依ル蛔蟲驅除成績

區 分	被 檢 査 人 員			驅 除 シ 得 タ ル モ ノ			同 上 百 分 比		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計
今 在 家	4	2	6	4	2	6	100.0	100.0	100.0
新 原	3	3	6	3	3	6	100.0	100.0	100.0
町 川 原	24	21	45	19	17	36	79.2	80.9	80.0
青 柳	19	16	35	17	14	31	89.4	87.5	88.6
小 竹	8	9	17	8	5	13	100.0	55.6	75.4
計	58	51	109	51	41	92	88.0	80.4	84.4

糸島郡元岡村ニ於ケル人體寄生蟲検査及ビ驅除

# 糸島郡元岡村ニ於ケル人體寄生蟲検査及ビ驅除

## 目 次

1、緒 言	59
2、現住人口及戸數	59
3、糞 便 檢 査	59
4、人體寄生蟲感染狀況(體性及ビ字別)	59
5、人體寄生蟲感染狀況(年齢及ビ蟲卵別)	63
6、蛔蟲、鞭蟲、十二指腸蟲ノ感染狀況(年齢及體性別)	71
7、人體寄生蟲驅除	74
8、驅除劑投藥後ノ糞便検査	75

## 糸島郡元岡村ニ於ケル人體寄生蟲検査及ビ驅除

### (1) 緒 言

糸島郡元岡村ニ於テハ既ニ大正15年、時ノ村長濱地知幾氏ハ3年計畫ヲ以ツテ人體寄生蟲驅除事業ニ着手セントシ縣ノ助力ヲ求メテタルニヨリ、同年9月第1回糞便検査ヲ行ヒ、昭和2年4月驅除シ、第2回糞便検査ハ之レヲ昭和3年6月ニ行ヒ、昭和4年3月驅除ス、同年村長及ビ衛生係ノ更迭アリ、三苦治郎氏村長ニ就任ス、氏モ亦此ノ事業ニ大イニ力ヲ致サレ第3回目糞便検査ヲ昭和5年2月ニ、驅除ヲ同年3月ニ實施シ、コヽニ3年計畫ヲ無事終了スルコトヲ得タリ、之レ全ク兩村長ノ一方ナラヌ努力ノ賜ト信ジ敬意ヲ表ス。

### (2) 現住人口及ビ戸數

本村ニ於ケル字別、現住人口及ビ戸數ハ次表ノ如シ

第1表 字別、現住人口及ビ戸數

字 人口、戸數、性	元岡南	元岡北	桑原南	桑原北	今出	本村	石崎	大野丸川	上川原	大野丸	水崎	合計
	現住人口	170	194	118	169	90	72	91	83	119	107	61
男	165	185	148	194	79	81	80	91	138	101	72	1,332
女	335	379	264	363	169	153	171	174	257	208	133	2,606
計	61	68	45	62	26	27	32	35	44	37	20	457
戸數	5.5	5.6	5.9	5.8	6.5	5.7	5.3	5.0	5.8	5.6	6.7	57
一戸當人口												

### (3) 糞便検査

昭和5年2月22日ヨリ同3月14日ニ至ル22日間ニ縣衛生試験所ニ於テ糞便検査ヲ行ヒタリ。

検査従事員 衛生技師1、同主事補1、同助手1、計3名

糞便検査ノ數 男857、女872、計1,729

現住人口對糞便検査數百分比 男67.3、女65.5、男女平均66.4トナル

### (4) 人體寄生蟲感染狀況ヲ體性、及ビ字別ニ見レバ第2表ノ如シ。

(附 大正15年、昭和3年及ビ昭和5年ノ成績比較)