

第二章第一項 患者及病症區別

百十六

1

患者職業別表

第二章第一項 患者及病症區別

米水車業
農兼薪炭商
運送人夫業
鍛冶職
倉庫人夫業
鐵道踏切番人
植木商
洋傘直シ業
屎尿汲除業
甘酒行商
紙屑拾業
土工業
農業
古儀商
生糸合名會社
倉庫係
經木眞田貿易商
機關士
寫眞彩色業
艦船行商
銀行員

第二章第一項 患者及病症區別

ニシテ之等ノ各病症ニ就キ其轉歸及經過日數ヲ擧クレハ左表ノ如クニシテ之ニ依リ死亡數ハ發病第四、五兩日ニ最モ多キヲ知リ得ヘシ

「ペスト」患者經過及轉歸一覽表

第一項 傳染病院收容患者病床記錄

横濱市ニ於テ發生シタル八十八名ノ患者中傳染病院（市立万治病院）ヘ收容セラレシモノ四十五名（疑似二名及送院ノ途中死亡シタルモノ一名ヲ除ク）ニシテ之ヲ男女及轉歸ニヨリテ區別スレハ

此等各患者ノ症狀經過等ハ左ノ万治病院病症日誌ニ詳ナリ(溫度表ハ印刷ノ都合ニテ省略)

第一號

入院
死亡
明治三十五年十月六日午前二時
同 年同月七日午後一時

○「ペスト」患者病床日誌

樹濱市海岸通り五丁目廿番地

佐々木シナ

十六年

卷之三

卷之六

古變ナシ

二際シテ劇

卷之二

卷之二

ミリ健力ニ

午前九時ノ症狀
脈搏 百十至
呼吸 三十三

精神ハ嗜眠ノ状態ニ陷リ脈搏ハ細小幽微ニシテ頻數、體溫ハ尙未僅カニ上昇シ、各處淋巴腺ノ腫脹ハ依然タリ

入院後未タ藥餌ヲ取ラス
體溫 三九、五度
脈搏 百二十四至
呼吸 四十三

午後一時ノ症狀

精神ハ昏睡状態ニ踏リ、時々譁語アリ、脈搏ハ幽微ニシテ頻數不正、心悸亢進、心音僅カニ鈍濁ス、肌温ハ高クシテ乾燥シ、舌背ニ於ケル黒色ノ厚苔ハ著シク乾燥シテ輝裂ヲ呈ス

右鼠蹊部ノ腫脹ハ廣ク瀰漫シ、ブーバルト鞦帶ヲ超ヘテ上方ニ蔓延シ皮膚ハ紫紅色ヲ潮シ板狀浸潤ヲ認ム在來股腺ノ腫脹部ニ一致スル皮膚ハ僅ニ膨隆スルモ能ク其深在腫脹腺ノ大サヲ觸知スルヲ得スブーバルト鞦帶ノ上部ニ接シテ新生セシ二三深在淋巴腺ノ腫脹ハ凡ソ雀卵大ニシテ硬固能ク其移動ヲ觸ル、ヲ得、凡テ此部ハ按壓及下肢ノ屈伸ニ由リテ痛覺ノ著シキヲ見ル
左右頸部ノ淋巴腺腫脹ハ僅カニ皮膚ノ癢着ヲ始メタルヲ徵スルモ皮表ノ變色若クハ浸潤ヲ認メス
肺ハ打診上著變ナキモ聽診上在來ノ笛聲增加ニ氣管支音ノ交ユルヲ聞グ

四肢尖端ハ輕度ニ厥冷シ、蒼青色ヲ呈ス生殖器ヲ檢スルニ會陰ニ變狀ナク、處女膜ハ凹凸不平ノ隆線トナリテ遺残シ、腔ハ白色粘液様分泌物ノ少量ヲ有スルモ粘膜面ニ於テ靡爛潰瘍若クハ裂傷ヲ認メス子宮孔ニ異常ナシ

午後二時ノ症狀

精神ハ稍々昏睡状態ヨリ醒覺シ、時々亦事ヲ語リ周圍ノ人ヲ辯スルノ外他症狀ニ著變ナシ

體溫 三九、八度
脈搏 百二十至
呼吸 四十四

午後八時三十分ノ症狀

精神ハ愈々明瞭ノ度ヲ加ヘ、脈搏ハ稍々力ヲ獲整調ニ赴キ、心動靜肅ニ傾ク
鼠蹊部ノ腫脹ハ稍々治散シタルヲ認ムルモ皮表ノ潮紅ハ依然タリ

尿利頻々、便通ナシ

食慾臻リ牛乳、米粥、鶏卵等ヲ飲用シ服藥ヲナス

體溫 三八、八度
脈搏 百二十一至
呼吸 四十

七日午前九時ノ症狀

精神ハ再ヒ昏睡状態ニ陷リ脉ハ頻數微細殆ント觸ル、ニ難ク心動著ク衰フ

肺ハ臻ル處中小ノ濕性水泡音ヲ以テ充盈シ呼吸困難アリ屢々咳嗽發作起ルモ咯出スルノ力ナシ盛ニ鼻翼呼吸ヲ營ム

右鼠蹊部ノ腫脹ハ著シク減退シ尙ホ該皮表ハ紫紅色ヲ呈ス從來存セシ穿刺孔ヨリ少量黃色漿液ヲ排泄ス左頸部ノ淋巴腺腫脹ハ殆ント全ク消散シ右頸部ノモノハ尙ホ僅カニ存在ス凡テ以上腺腫ノ各部ハ按壓及體動ニ由於痛覺ハ殆ント無キモノ、如シ

體溫 三八、二度

脈搏 百四十四至
呼吸 四十六

正午十二時ノ症狀

諸症著ク増惡シ、呼吸困難愈々加ハリ喉頭喘鳴ヲ發シ四肢ノ厥冷ハ益々高度ニ赴キ、角膜ハ混濁シ臉裂相當部ニ粘液絮狀物ヲ沈着シ瞳孔ハ著ク縮少シ光線反應遲鈍ナリ

體溫 三八、八度
脈搏 百四十四至
呼吸 五十六

午後一時

全身諸症狀益々増惡シ、呼吸先ツ廢シ心動隨テ絶シ煩悶ナク眠ルカ如ク遂ニ鬼籍ニ入ル

第二號

砂川斧三郎方

木村德二郎

入院

明治三十五年十月七日午後八時十分
死亡 同 年同月八日午前六時

入院時ノ現症

體格大、體質強、營養佳良顔貌苦惱ノ狀ヲ呈シ神識ハ明瞭ナリ肌溫高ク乾燥シ眼結膜ノ充血ヲ徵セス
肺ハ打聽診上著變ナク、心ハ常位、心悸稍々亢進シ心音異常大ク、脈搏ハ中等度ニ緊張シ整調ナルモ頻數舌ハ乾燥シ黒色ノ薄苔アリ腹部ハ稍々膨滿シ柔軟、肝脾ノ肥大ナシ

頸腺肘腺ハ異常ナク鼠蹊腺ハ左右數個ノ豌豆大硬結ヲ有スルモ炎症々狀ヲ徵セス
體溫 三九、一度
脈搏 百二十五至
呼吸 三十二

八日午前三時ノ症狀

入院後凡ソ七時間ニシテ全身症狀俄然一變シ脈搏ハ微細ニシテ頻數トナリ、惡心、嘔氣アリ亦時々吃逆ヲ發生シ苦惱ニ呻吟シテ轉輾反側ス然レトモ神識ハ尙ホ明瞭ニシテ能ク應答ニ堪ユ瞳孔ハ稍々散大シ光線ニ對スル反應ハ遲鈍トナル

午前五時三十分後ノ症狀

此際諸症益々増惡シ脈搏ハ細微殆ント觸ル、ヲ得ス心音ハ著シク雜性ヲ帶ヒ、呼吸困難ヲ呈シ口唇ハ青色ヲ帶ヒ、四肢ハ厥冷シ「チアノーゼ」ヲ現ハス瞳孔ハ著シク散大シテ光線反應愈々消失スルモ神識ハ尙ホ明瞭ナリ

腋窩ノ淋巴腺腫ハ此時既ニ著ク縮小シテ強ク按壓スルニ非サレハ其所在ヲ知ルコト難ク壓痛ハ殆ント消散ス
斯クシテ午前六時遂ニ心臟麻痺ヲ以テ斃ル

横濱市海岸通リ五丁目二十番地

東井吉松雇人

第三號

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百二十七

岩口甚吉

百二十九年

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百二十八

入院 明治三十五年十月九日午後五時
死亡 同 年同月十日午前六時

入院時ノ現症

體格中等、體質強、營養佳良、顏貌ハ無慾狀ニシテ神識ハ朦朧、應答ハ不明瞳孔ハ通常ニシテ光線的反應ハ遲鈍ナリ肌溫高ク乾燥ス呼吸器系統ニ著變ナシ脈ハ中等大、緊張シ稍々頻數心ハ常位心音異常ヲ認メス舌ハ濕潤シ苔ナク腹部ハ平坦柔軟ニシテ肝脾ノ肥大ナシ生殖器系統ニ異常ヲ認メス

左顏面頬骨突起部ノ表皮ニ凡ソ五厘銅貨ノ擦過傷アリテ赤色ヲ微シ兩下肢及足部ニ創傷ヲ見ス
淋巴腺系統ハ右頸部僧帽筋ノ前緣ニ於テ殆ント豌豆大硬固ノ淋巴腺腫脹ヲ有シ無痛ニシテ皮膚ニ變色ナク又癢着ヲ見ス

右鼠蹊鞦帶下部ノ皮膚ハ僅ニ赤色ヲ微シテ隆起シ左下ノ股腺ハ殆ント小雞卵大ニ腫脹シ硬固深部ト癢着セスシテ皮膚ト僅ニ癢着ス之レヲ按シ若クハ當該下肢ヲ運動スレバ著シク疼痛ヲ訴ヘ極力之レヲ避ケント昂ム其他腋窩腺肘腺及ヒ左股腺ニ著變ナシ

體溫 百至 三八、七度
脈搏 二十四
呼吸

午後八時ノ症狀

精神狀態ハ漸次變化シ來リテ發揚ニ赴キ或ハ起シテ逃レントシ或ハ看護婦ニ抗抵シ常ニ轉輾シテ靜止スルコトナク其他症狀ニ著變ナシ

午後十時ノ症狀

精神狀態ハ益々增悪シ全ク變調シテ傍人ヲ辨セズ時々幻覺アリテ喃々シ時ニ躁狂ニ陥リテ褲衣ヲ破リ身自ラ

午前四時ノ症狀

搔爬シ或ハ觸ル、所ノモノヲ噉傷シ常ニ轉輾反側シテ床上ニ保ツコト殆ント困難ニ屬セリ
他全身症狀ニ著變ナシ

體溫	三九、七度
脈搏	百二十八至
呼吸	三十五

午日午前二時ノ症狀

精神狀態ハ益々躁狂ニ變シ脈ハ細數心音ハ稍々鈍濁ス

午前四時ノ症狀

顎ニ虛脫狀態ヲ呈シ安靜ニ陥リ全身發汗著シク脈搏ハ細小ニシテ頻數、四肢ハ厥冷ヲ微シ瞳孔ハ漸次散大シテ光線ノ反應ハ益々鈍リ右股腺腫脹部ハ變化ナク遂ニ午前六時ニ至リ心臟麻痺ニテ斃ル

體溫 百四十五至
脈搏 四十八
呼吸

第四號

横濱市海岸通り五丁目二十番地

吉松三男

田中寅之助

六 年

發病 明治三十五年十月十四日

入院 同

月十六日午前二時

轉歸 同

年十一月廿四日治

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百二十九

既往症

兩親及四人ノ同胞皆健在ス患者ハ生來數回ノ種痘ヲ經タルモ麻疹ヲ耐過シタルヤ否ヤハ不明昨年左右何レカノ鼠蹊部ニ腫起ヲ來シ壓痛ヲ伴ヒタルモ醫治ヲ享ケスシテ消散シ爾來其ノ部ニ僅ノ硬結ヲ遺残セリト云フ本病ハ本月十四日午後始メテ頭痛ヲ感シタルノ外異變ナカリシモ十六日ニ至リ熱發、口渴、食氣不進等ヲ併發シ同時ニ兩鼠蹊鞦帶部ニ腫脹ヲ呈シ發赤及壓痛ノ著シキヲ注目セラル、ニ迨シテ本病診定ノ下ニ送院セラレタリト云フ入院時ノ現症

體格及營養ハ年齢ニ比シテ佳良、顏貌、苦惱狀ナリ精神明瞭眼結膜ニ著變ナク肌温ハ高ク乾燥ス體位ハ自動的仰臥ニアルモ膝關節ニ於テハ著シク屈曲ノ位置ヲ取ル消化器系統口唇粘膜ハ乾燥シ變色ナク舌亦乾燥シテ輕微ノ白苔ヲ衣ス腹部ハ一般ニ膨滿スルモ痛覺雷鳴等ノ異常ナク肝脾亦腫大ヲ證セス

血行器系統 脈ハ微弱稍々不正其數百二十至心位心音ニ著變ナシ

呼吸器系統 肺界ハ尋常打診上著變ナキモ聽診上呼吸音ノ銳利ナルヲ認メ喉頭ニ輕度ノ喘鳴ヲ微シ時々咳嗽アルモ咯痰ナシ

淋巴系統 左右ブーバルト氏鞦帶部ニ於テ各々一個ノ横椭圓形隆起ヲ有シ其皮膚ハ僅ニ赤色ヲ潮シ浸潤ハ強クシテ著明ナル壓痛アリ之ヲ觸ル、ニ皮下ノ淋巴腺ハ鳩卵大ニ腫脹シ硬固ナリ皮膚及深部組織ト癒着シテ移動シ難シ下肢ノ伸展ニ際シ痛覺甚シキヲ見ル

頸部膝窩肘部ノ淋巴腺ハ異常ヲ認メス

入院後ノ經過

十月十六日 午後二時脈搏著シク微弱ニ陷リ同鼠蹊部ノ皮膚ハ浮腫狀態ヲ呈シ深ク手ノ壓痕ヲ遺ス穿刺鏡検シテ稍々多數ノ「ペスト」菌ヲ認ム

午後三時三十分惡寒アリ

午後四時「ペスト」治療血清一〇、〇立方仙迷注射

午後九時三十分血清一〇、〇立方仙迷注射

同月十七日 午前九時咳嗽稍々頻發ナルモ咯痰ナシ肺ハ聽診上類鼾音ヲ徵ス兩側扁桃腺ハ腫脹シテ咽頭口蓋弓ヨリ突出スルモ粘膜面上變化ナシ左右鼠蹊腺ノ腫脹ハ僅ニ増大シタルモ兩下肢ノ伸展ニ因ル痛覺ハ減少シタルモノ、如シ、

血清一〇、〇立方仙迷注射

午前十時脈著シク不良體溫三十五度一分ニ急降ス、

午後三時血清二〇、〇立方仙迷注射

此日午後ハ患者自覺的症狀ハ極メテ安靜ニシテ好ンテ睡眠ヲ貪リ亦食餌服藥ヲ悅フ

同月十八日 午前九時左右鼠蹊腺腫ハ皮膚ノ浸潤著ク減少シ稍々柔軟假性波動ヲ認ム

血清一〇、〇立方仙迷注射

午後四時肺ノ類鼾音消失シ粗烈ナルヲ徵ス

血清六、〇立方仙迷注射

午前十時血清二〇、〇立方仙迷注射

午後三時脈奮ヒ體溫上リ氣分頗ル爽快ナリ

血清一八、〇立方仙迷注射

尿ハ弱酸性黃赤色透明少量ノ蛋白ヲ含有シ輕度ノデアツオ反應アリ

同月二十日、脈ハ稍々力ヲ増シタルモ三搏毎ニ著明ナル結代ヲ呈ス

午後八時血清二〇、〇立方仙迷注射

同月廿一日 午前八時三十分左鼠蹊腺腫ノ波動ヲ認ム

午後三時血清一八、〇立方仙迷注射

同月廿二日 右鼠蹊腺腫ノ波動ヲ徵ス茲ニ至リテ腺腫ハ按壓及下肢伸展ニ由ル痛覺ハ殆ント全ク去レリ

午後三時血清二〇、〇立方仙迷注射

同月廿三日 午前九時兩鼠蹊腺ヲ切開排膿ス左腺腫ヨリ取リタル膿中ニ「ペスト」様菌ヲ認ム

同月廿四日 兩側切開孔ハ膿汁ノ分泌ナク右創孔ヨリ少許ノ壞死組織ヲ抽出セリ自覺症狀ハ佳良ニシテ食慾

著ク振ア

午後脈搏再ヒ結代ス

同月廿五日 肉芽增生ハ未タ來ラス

同月廿六日 右側胸部ニ蕁麻疹ノ發生ヲ徵ス脈搏ノ結代歟ム

同月廿七日 蕁麻疹ハ蔓延シ全胸腹ニ亘ル

同月廿八日 午後蕁麻疹ハ消褪ヲ始ム

同月廿九日 蕁麻疹ハ殆ント全ク消散ス

同月三十日 右切開口ヨリ少量ノ膿汁ヲ分泌ス

同月卅一日 著變ナシ

十一月一日 同

同月二日 同

同月三日 同

同月四日 同

同月五日 同

同月六日 左切開孔ハ全ク閉鎖治癒シ右切開孔ハ膿ノ分泌ナキモ肉芽ノ増殖緩慢ナリ

脈搏不正ニシテ再ヒ結代ヲ徵ス

同月七日 諸症依然タリ

同月八日 同

同月九日 同

同月十日 同

同月十一日 全身症狀佳良脈搏結代止ム

治療法

前記血清注射ノ外興奮剤トシテストロハント丁幾赤葡萄酒ヲ稀鹽酸里母那蛭ニ調和シテ内服セシメ或ハ隨時依の兒加樟腦ノ皮下注射ヲ施シ腺腫ノ局處ニハ初メ消炎療法トシテイヒチオール、グリセリンノ塗布ニ水囊貼用等ヲ行ヒ後チ温琶布ヲ施シ化膿ヲ待テ切開シ排膿シテ昇汞綿紗ヲ充填シ時々肉芽面ニ格魯兒亞鉛液ノ腐蝕ヲ行フテ其ノ增生ヲ促セリ

食 飼

有熱時ニハ粥汁牛乳鶏卵、ミルクポンチ、肉汁等ヲ與ヘ解熱後ハ米粥牛乳鶏卵肉汁ミルクポンチ等ヲ與ヘテ今日尚ホ繼續セリ

明治三十五年十一月十一日

横濱市立万治病院醫員 石浦德太郎

横濱市海岸通五丁目二十番地

本間文三方

第五號

發病 明治三十五年十月二十一日

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百三十三

二十五年

入院 明治三十五年十月二十四日午後十時
轉歸 同 年十二月二日治

既往症

父ハ肺病ニテ沒シ母及同胞二人ハ健存ス
患者生來強壯幼時種痘瘻疹ヲ耐過シ十四五歳ノ頃脇窓扶斯ニ罹リ二ヶ月餘ニシテ全治シタル外記スヘキ事ナシ
本病ハ四日以前左臀部ニ腫物ノ發生ヲ自覺シ次テ左鼠蹊部ノ腫脹ヲ來タセシモ敢テ意ニ介セサリシカ昨夜（二
十三日）ヨリ頭痛四肢倦怠惡寒戰慄口渴等ノ諸症ヲ併發セシヲ以テ檢疫醫ノ診察ヲ受ケ遂ニ本日本病診定ノ下
ニ送院セラレタリト云フ

入院時ノ現症

體格上等體質強壯營養佳良顏貌ハ苦惱ノ狀ナク僅ニ不安ノ態アリ精神明確眼結膜ノ充血ナク瞳孔ノ反應尋常ナ
リ肌溫高キモ乾燥セス皮膚ノ彈力ハ健存ス下肢外表ニ創傷孔等ノ認ム可キ變狀ナキモ左後臀部襞ノ稍上方臂裂
線ニ當リ凡ソ貳錢銅貨大ノ暗紅色ヲ呈セル部分アリテ其中央表皮ノ缺損ヲ徵シ之ヲ觸ルレハ凡ソ梅實大ニ硬結
シテ無痛ナリ之ト對向セル臂裂線ニモ亦同様ノ變色及表皮ノ缺損ヲ見ルモ皮表下ノ硬結ナシ

循環器系統、心ハ常位心音異常ナク心悸稍々亢進ス脈搏ハ中等度ニ緊張シ頻數ナリ

呼吸器系統、肺界尋常打聽診上著變ヲ認メス

消化器系統、舌ハ濕潤シ輕微ノ白苔ヲ衣シ腹部ハ稍々膨滿シ柔軟肝脾ノ肥大ナク他ニ認ムヘキ著變ナシ
淋巴腺系統、左ブーバルト氏鞦帶中央ノ下方ニ當リ卵圓形ナル皮膚ノ腫起ヲ徵シ僅ニ赤色ヲ潮ス其中央ニ穿刺
痕ヲ見ル之ヲ觸ルレハ凡ソ鷄卵大硬固ノ腺腫脹ニシテ皮膚下癰着スルモ深部ノ癰着ナク壓痛ハ著明ナルモ下肢

運動等ニ起因スル自覺痛ハ無キモノ、如シ

右鼠蹊腺ハ大豆大二個ノ無痛性硬結ヲ有シ左肘腺ハ小豆大一個ノ腫脹ヲ有ス頸及腋窩ノ淋巴腺ニ著變ナシ

入院後ノ經過

十月廿四日 午後十時二十分「ペスト」治療血清五〇、○立方仙迷注射

同月廿五日 頭痛著ク輕快ス午後三時三十分頃ヨリ凡ソ一時間惡寒ヲ發セリ

午後三時四十分血清三〇、○立方仙迷注射

午後八時血清二〇、○立方仙迷注射

同月廿六日 自覺症狀著ク佳良左鼠蹊ノ腺腫ノ皮膚浸潤ハ減少シ壓痛及發赤モ稍々消散セルヲ認ム

午前九時三十分血清二二、○立方仙迷注射

午後四時血清二〇、○立方仙迷注射

同月廿七日 左ブーバルト氏鞦帶下ノ腺腫脹ハ増大シテ殆ント鷄卵大トナリブーバルト鞦帶上ニ亦雀卵大ナ

ル一個新生淋巴腺ノ腫脹ヲ認ム

午前九時血清二〇、○立方仙迷注射

午後三時血清三五、○立方仙迷注射

同月廿八日 ブーバルト氏鞦帶上下ノ二個ノ淋巴腺腫脹ハ益々増大シテ相接近シ周圍皮膚ノ浸潤ハ著ク消褪
シタルモ中央部ノ皮膚ハ限局的ニ潮紅ヲ呈ス腹部膨滿ヲ訴フ

午後八時腺腫脹部ノ穿刺痕ヨリ按壓ニ由リ濃厚ナル血清膿汁ノ排出スルヲ認ム

午前九時三十分血清二〇、○立方仙迷注射

午後三時血清二〇、○立方仙迷注射

同月廿九日 午前九時前記穿刺痕ヨリ有溝消息子ヲ挿入シテ新生腺腫ニ達シタルヲ以テ切開ヲ行フテ排膿セ

シム膿ハ濃厚ニシテ帶黃白色中ニ「ペスト」菌ノ多數ヲ認ム

而シテ切開孔内ノ内所見ハ殆ント豚脂様ノ觀アリ

此ノ日體溫初メテ下降シ食慾増進ス

同月三十日 諸症佳良

同月三十一日 切開孔ノ上部ヨリ稀薄ナル膿汁ノ稍々多量ヲ漏泄ス
午後脈搏軟弱ニシテ著シク減數ス

十一月一日 血清注射部注射部ニ尋麻疹ヲ認メ體温昇騰ヲ始ム切開孔内ノ肉芽ハ遲鈍創孔ヨリ壞死組織及腺ノ軟化セルカ如キモノヲ除去シ得タリ

午後尋麻疹ハ益々蔓延ス同八時血清二〇、○立方仙迷注射

同月二日 寻麻疹ハ大半消散シタルモ熱度再ヒ昇騰シ脈ハ軟弱ニ陷ル右鼠蹊腺ノ無痛性硬結ハ僅ニ容積増加ヲ認メ左腋窩ノ深部ニ於テ拇指頭大ナル磊塊ヲ觸レ三個ノ淋巴腺腫脹ノ集合ヨリ成リ痛覺ハ無キモノ、如シ

同月三日 寻麻疹ハ殆ント全ク消散ス本日解熱劑ヲ與フ

同月四日 切開孔ハ排膿殆ト無ク肉芽ハ尙ホ不良ナリ

同月五日 膝關節部ニ鈍痛ヲ訴フ

同月六日 右ノ關節痛ハ消散ス熱更ニ昇騰ス

午後三時血清四〇、○立方仙迷注射ス其後一回嘔吐アリ

同月七日 午前十時血清五〇、○立方仙迷注射

午後二時血清四〇、○立方仙迷注射

此ノ日脈搏浮大ニシテ軟弱顔貌無慾狀ヲ呈シ衰弱加ハル

同月八日 午前八時血清四〇、○立方仙迷注射

左右背下部ニ於テ吸氣時々小水泡音ヲ聞ク衰弱加リ眼窩僅カニ陥凹ス
同月十日 切開孔内ノ肉芽ハ腐蝕ニ由リテ佳良ノ觀ヲ呈シ來リ左肺下部ニ有響性水泡音ヲ聽取ヘ心窩部ニ壓重ノ感アリ

同月十一日 自覺的衰弱及呼吸促迫ノ感アリ

治療法

前記血清注射ノ外内服トシテ、ストロファンアンツス丁幾赤酒稀鹽酸リモナード、ノ合劑ヲ與ヘ解熱藥トシテ臨時鹽酸規尼涅安知必林、水揚酸曹達等ヲ與ヘ興奮藥トシテ依的兒加樟腦油ノ注射ヲ施シ下劑トシテ臨時蓖麻子油硫酸那篤儒謨等ヲ投シ局部ニイヒナオールグリセリンノ塗布、水囊若クハ溫罨法等ヲ施セリ

食餌
粥汁牛乳鷄卵ミルクポンチ葡萄酒肉汁水飴等ヲ與ヘタリ
體溫脈搏及呼吸ハ載セテ別紙ニアリ

明治三十五年十一月十一日

横濱市立万治病院醫員 石浦德太郎

横濱市海岸通リ五丁目二十番地

齋藤三吉

五十六年

第六號

發病 明治三十五年十月二十七日

入院 同 年同月三十日午前七時三十分死亡

病歴生來強壯ニシテ三十九歳ノ時虎列刺病ニ罹リ今ヨリ十一年前來年々輕症脚氣ヲ患フルノミ

本病ハ十月二十七日俄然四肢倦怠肩硬頭痛及腰痛ヲ覺ニ惡寒發熱アリ翌日ニ至リ鼠蹊腺ノ腫脹ヲ認メ漸々增大シ昨夜來疼痛ヲ伴ヒ延テ今日ノ狀態ニ陥レリト云フ入院時ノ現症

體格上等體質強壯營養ハ年齡ニ比シ佳良顔貌僅ニ不安ノ狀アレトモ毫モ苦惱ノ態ナシ精神ハ明瞭眼結膜ノ充血

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

ナク瞳孔ニ變化ナク肌温高クシテ乾燥シ左脛骨前面ノ中央部ニ僅微ノ創傷アリテ結痂ヲ構成セリ又右臀部皴襞ノ中央部ニ凡ソ鷄卵大硬固ノ腫瘍アリ能ク移動シテ炎症々状ナシ脈ハ稍々硬ク整正心尖搏動ハ第五肋間乳腺外一指横徑ノ部ニアリ心音變化ナシ舌ハ濕潤シ僅ニ白苔ヲ衣シ扁桃腺ハ僅ニ腫脹スルノ他變化ヲ認メス腹部膨満シテ肝脾ノ肥大ナシ

淋巴腺ヲ檢スルニ頸、肘、及腋窩腺ニ變化ナク股腺ハ鷄卵大ニ腫脹シテ柔軟其深部ニ蠶豆大數個ノ腺ヲ觸知シ壓痛アリ該部ノ皮膚ハ強ク浸潤セリ鼠蹊腺ハ殆ント鷄卵大ニ腫脹シ硬固ニシテ握痛強ク能ク移動セリ外部ノ皮膚ハ同シク浮腫狀ニ浸潤セリ鼠蹊腺ヲ穿刺シテ其液ヲ檢スルニ多數ノ「ペスト」菌ヲ認ム其他左耳下ニ鷄卵大ノ柔軟無痛ノ腫瘍ヲ認ム

入院後ノ經過

十一月三十日 午後二時血清六〇、○注射

入院時ノ體温ハ四十度五分ヲ示セシモ注射後下降シテ三十九度三分ヲ示スニ至ル内股部ニ於ケル腫脹ハ著シク消散セリ鼠蹊部ハ依然トシテ却テ疼痛ヲ増加セリ更ニ血清二〇、○注射ヲ施セリ

同月三十一日 午前體温漸々下降シテ三十七度七分ヲ示シ以テ全身症狀ハ稍々佳良トナル血清二〇、○注射午後體温上昇シ患部ノ腫脹及疼痛ヲ増加セリ血清四〇、○注射ヲ行フ脈搏ハ力アレトモ時々結代ス

午後八時ニ至リ熱度稍々下降シテ局部ハ其腫脹及疼痛ノ減スルヲ認ム煩渴アリ睡眠中屢々譖語アリ血清二二、○注射

十一月一日 午前血清四〇、○立方仙迷注射

患部ノ腫脹及疼痛ハ増加シテ殆ンド前日ニ倍ス即チブーバルト氏鞆帶ニテハ陰阜ヨリ同側ノ腸骨前上棘ニ達スル横隨圓形堤狀ノ腫脹ヲ呈シ其下部ニ於テハ殆ント大腿ノ上三分ノ一ヲ占メ明ニ他部ト限界スル浮腫狀浸潤ヲ呈セリ神思ハ變化ナク却テ前日ヨリ爽快ナリト云フ

検尿スルニ蛋白及デアズオ反應アリ

午後二時血清二〇、○立方仙迷注射
體温三十九度五分患部著變ナシ脈ハ浮大ニシテ結代甚シ同日午後及同夜ハ格別ノ變化ヲ認メサリシ
十一月二日 午前二時頃ヨリ苦悶ヲ始メ次第ニ進テ轉輾反側シ譖語甚ク脈搏微弱トナリ同六時頃ニ至リテハ呼吸及脈搏不正頻數トナリカンフル注射ヲ行フモ僅ニ反應アルノミ而シテ此等ノ症狀ハ刻々增惡シテ遂ニ同七時三十分心臟麻痺ニ由リテ斃ル精神ハ溷濁セシテ死前迄明ニ應答アリタリシ
死後強直ハ凡ソ四十分計ニシテ下顎關節ヨリ始マリ一時間後ニ至リテハ全身ニ及ヒ加之死斑ハ胸腹及背下ニ散發セリ

治療法

前記ノ如ク血清注射ノ外鹽里謨赤酒合劑心臟亢奮藥トシナカンブル油ノ皮下注射ト患部ニハ單ニイヒチオール巴布ノ貼用ヲナシ腺ノ摘出ハ行ハサリシ
體溫脈搏等ハ別紙ノ如シ

明治三十五年十一月十一日

横濱市立万治病院醫員 高木昌太郎

横濱市根岸町字麥田三千八百六十八番地
米商 傳七四男
青木昌次郎

第七號

既往症

兩親及ヒ一兄アリ皆健在ス患者生來強壯幼ニシテ種痘麻疹等ヲ經タルノ外明治三十六年二月下旬肋膜炎ニ罹リ醫治ヲ受ケ全治シタリト云フ

本病ハ明治三十六年六月十五日午後惡寒發熱全身倦怠等アリ翌日ニ至リ左腋窩ニ疼痛ヲ覺ヘ諸症漸次増悪同十
八日遂ニ本病診定ノ下ニ送院セラル

現 症

體格中等體質並ニ營養中度精神ハ已ニ昏迷ノ狀態ニアリ眼球上舉瞳孔ハ著シク散大シ角膜鈍濁殆ント反應ナシ
眼球結膜ハ充血シ皮膚ハ乾燥シ熱感アリ輕度ノ藍青色ヲ呈ス顏面ハチアノーゼ著明ニシテ殊ニ口唇ハ深藍色ヲ
呈ス

血行器系、脈搏ハ微細ニシテ觸知シ難シ心動ハ不整ニテ疾速ナリ
呼吸器系、呼吸ハシャイネストック氏現象ヲ徵シ兩肺共ニ粗大ノ囉音ヲ以テ充タス

消化器系、舌ハ濕潤僅ニ白苔ヲ衣シ挺出困難腹部ハ平坦肝脾異狀ヲ認メス四肢ハ時々痙攣ヲ來ス所謂頻死苦悶
ノ狀態ヲ呈ス
淋巴系、左腋窩即大胸筋附着部ノ後線ニ於テ皮膚僅ニ隆起シ變色ナク輕度ノ瀰漫性浸潤アリ觸ル、ニ鷄卵大彈
力性硬度ノ淋巴腺腫脹ヲ認メ之ヲ押壓スルモ既ニ昏迷ニ陥ルヲ以テ痛感ヲ訴ヘス左肘關節部ニ豌豆大ノ損傷ア
リ下肢處々ニ蟲刺痕アルモ他ノ腺ニハ異狀ヲ認メス局部穿刺鏡檢スルニ多數ノ類似「ペスト」菌ヲ認ム
經 過

諸症狀益々增悪入院後五十分ニシテ死亡ス

横濱市神奈川町浦島五百七十五番地

山崎留吉内縁妻

野 口 タ ケ

第 八 號

二十六年

既往症

兩親健全同胞四人健在生來強壯幼時種痘及麻疹ヲ經過スルノ他著症ヲ患ヒタルコトナシ

本病ハ明治三十六年八月二十七日惡寒頭痛次テ發熱全身倦怠口渴食機不振等ヲ來ス症狀漸次增進同二十九日ニ
至リ同病診定ノ下ニ本院ニ送付セラル

現 症
體格營養共ニ良ニシテ顔貌稍々苦惱ノ狀ヲ呈ス眼結膜充血肌溫高ク皮膚乾燥シ精神稍々不安ノ狀アルモ應答明
瞭頭痛ヲ訴フ

呼吸器系、異狀ヲ認メス

血行器系、脈搏頻數ニシテ心悸亢進セリ呼吸ハ三十六ヲ算ス

消化器系、口唇乾燥舌濕潤シテ白苔ヲ被リ煩渴甚シク食機不進腹部ハ軟ニシテ盲腸部ヲ壓スルニ雷鳴アリ肝ノ
肥大ナシ脾ハ打診上肥大アルガ如キモ觸知スルコトヲ得ス便ハ下痢ニシテ僅ニ粘液ヲ存ス
淋巴系、頸腺兩側共ニ豌豆大ノ腫脹アルモ浸潤皮膚變色及ヒ壓痛等ナシ腋窩ニ於テモ同様鼠蹊腺亦小豆大ノ硬
結兩側共ニ數個アルモ前同様股腺又異狀ナシ右股腺部ニ穿刺痕ヲ認ム
經 過

八月三十日 右鼠蹊部ノ皮膚僅ニ浮腫狀ヲ呈ス發赤疼痛等ナシ腺ハ大豆大硬固ナルモノ二個アリ時々嘔吐ヲ
發ス便ハ依然下痢狀ニシテ粘液ヲ含有ス右肺前面ニ於テ僅ニ笛聲ヲ聞ク言語澁滯甚シク身體ノ倦怠ヲ訴フ不
斷喃々獨語シ安眠ヲ得ス脈搏漸次不良トナル
三十一日 胸腹部ニ血斑ヲ發ス脈搏頻數ニシテ弱嘔吐嘔氣尙止マラス症狀益々不良ニ陥リ呼吸困難ヲ來ス角
膜溷濁瞳孔散大シ心動頓ニ微弱トナリ脈搏ハ殆ント觸知スルコト難ク遂ニ午後七時三十分死亡セリ

横濱市元濱町二丁目十二番地

小林方

第九號

既往症

生來強壯曾テ麻疹痘瘡コレラ等ニ罹リシコトアリ明治三十六年五月二十一日ヨリ寒胃氣味ニテ發熱アリ次日ニ至リ某醫ノ治ヲ受ケ同二十四日ニ至リ局部ニ疼痛ヲ發ス同日本病診定ノ下ニ送院セラル

現症

體格營養共ニ佳良顔貌苦惱ノ状ヲ呈ス眼結膜ハ稍々貧血ノ状ニアリ爪甲並ニ口唇チアノーゼヲ呈ス消化器系口唇並ニ舌ハ乾燥シ口渴アリ食機甚シク減損腹部柔軟ニシテ壓痛ナク肝脾等ノ肥大ナシ呼吸器系呼吸甚タ促迫一分間四六ヲ算ス胸部打診聽診上共ニ著變ナシ血行器系脈搏甚タ微弱頻數ニシテ其數ヲ算シ難シ心音ハ局部ニ於テ聽知スルヲ得ス精神ハ明瞭應答變ナキモ輕度ノ頭痛ヲ訴フ

淋巴系頸部腋窩ノ腺ニハ異狀ナシ右股腺ハ鳩卵大ニ腫脹シヲ僅ニ發赤周圍浸潤ヲ呈ス壓スルニ疼痛ヲ訴フ左側モ同様ニ腫起スルモ稍々輕度ナリ壓痛ハ甚シ右左鼠蹊腺モ雀卵大ニ腫脹シテ疼痛アリ

経過

症狀益々不良ニ陷リ入院後二時間ニシテ鬼籍ニ上ル

横濱市三吉町一丁目七番地

第十號

新之助次男

山 口 松 太 郎

十 四 年

既往症

父母共ニ健全同胞二人健在幼時種痘並ニ麻疹ヲ經過スルノ他著患ニ罹リシコトナシ本病ハ明治三十六年六月六日午後ヨリ身體倦怠頭痛發熱食氣不振等ヲ來ス同七日ニ至リ右側頸部ニ疼痛ヲ發ス依テ醫治ヲ受ケシガ同日直ニ同病決定ノ下ニ本院ニ送ラル

現症

體格營養共ニ中等皮膚暗褐色ヲ呈ス顔貌苦惱ノ状ナキモ眼結膜充血セリ體溫四十度七分脈搏百二十至ヲ算ス前頭髮際部ヨリ少シク上部ニ於テ不正ノ瘢痕ヲ見ル血行器系脈搏整正ニシテ力アリ心音心界異狀ヲ認メス呼吸器系著變ナキモ時々咳嗽ヲ發ス消化器系口唇乾燥舌ハ濕フ白苔ヲ衣ス扁桃腺左右共ニ腫脹發赤セリ特ニ左側ニ於テ著シ食機不進腹部軟ニシテ異狀ナシ神經系應答明瞭ナルモ時々喃々獨語ス頭重頭痛ナシ
淋巴系右頸部ハ腫脹シ壓痛甚シ（特ニ乳頭突起部ニ於テ強ク）胸鎖乳頭筋ノ後側ニ於テ雀卵大ノ淋巴腺腫脹及乳頭突起ノ直上ニ小腫起アリ此部ハ柔軟ニシテ壓スルニ少シク凹凸又乳頭突起ノ下方深部ニ於テ淋巴腺ノ腫起ヲ認ムルモ浸潤強クシテ明ニ其限界ヲ知ルコト克ハス其他耳翼モ健側ニ比シテ少シク腫脹シ牽引スルニ疼痛アリ其他ノ腺ニハ異狀ヲ認メス

経過

七日 午後十時脈搏稍々不整トナリ時々咳嗽ヲ發ス精神症狀増加セリ

八日 午前脈搏前日ト異ナルコトナシ局部ノ症狀大差ナキモ壓痛少シク減少セリ食氣ハ依然不進午後諸症狀依然精神稍々明瞭トナル

九日 精神更ニ溷濁ス脾ハ肥大ノ證明困難ナルモ全部壓痛アルカ如クシ局部ノ腫脹增加シ浸潤ノ爲メ深部腺ノ腫起アル可キモ能ク觸知スルコト克ハス肺ニ他覺的異狀ヲ發見セス扁桃腺腫起ハ前日ニ異ルコトナシ午後局部ノ腫起ハ周圍ニ向テ益々增加シ次テ開口不充分トナリ漸ク舌ヲ挺出シ得ルノミ精神ハ甚タ亢奮シテ喃々獨語時々外床ヲ逸セントスルノ状ヲ示セリ嘔氣ヲ來ス喉頭部ノ少シク喘鳴ヲ發ス爲メニ呼吸音不純ナリ脈搏ハ頻數ニシテ不整トナル午後九時脈搏依然喉頭部ノ喘鳴去リ呼吸音異狀ナシ口唇稍々チアノーゼヲ呈ス午後十一時三十分諸症頓ニ増惡脈搏ハ微弱ニシテ觸知スルコト難ク心動亦幽微トナリ呼吸喘鳴ヲ發ス益々不良ナルノミ

十日 午前十二時四十五分心臟癱瘓ノ爲メニ遂ニ鬼籍ニ上ル

横濱市扇町三丁目百二十九番地

第十一號

塗物屋吉松母
小山七キ

四十三年

既往症

夫ハ已ニ沒ス兩親及兄弟ナシ一子アリ健存患者生來健全著患ヲ知ラス只時々胃痛ニ惱ムコトアルノミ本病ハ明治三十六年六月十三日惡寒發熱心神不快ヲ感シ同夜右鼠蹊部ニ疼痛ヲ自覺シ同十四日某醫ノ治療ヲ受ケ直チニ本病診斷ノ下ニ送院セラル

現症

體格中等體質健營佳良皮膚ハ乾燥シ肌温高ク顔貌稍々不安ノ狀アリ兩眼結膜ハ汚穢紅褐色ノ顆粒ヲ簇生ス瞳孔ニ著變ナシ右眼角膜ニ帽針頭大ノ清潔ナル陷凹アリ（角膜潰瘍痕？）腰部牽引痛ヲ訴フ精神ハ明瞭ナリ消化器系、舌ハ濕潤シ黃白色ノ薄苔ヲ被リ口渴甚シク食氣稍々不進腹部ハ著變ヲ認メス

血行器系、脈搏ハ稍々疾速ニシテ中等度々緊張ス心界異狀ナキモ心音少シク鈍濁ス

呼吸器系、ハ著變ヲ認メス

淋巴系、右股腺部ハ皮膚稍々隆起ス輕度ノ潮紅アリ浮腫狀ニシテ二個ノ淋巴腺腫脹ヲ見ル硬固ニシテ一ハ拇指頭大一ハ雀卵大ニシテ相駢立シ皮膚ハ僅ニ癒着アルカ如シ深部ハ移動ス自覺的疼痛輕度ナルモ壓痛ハ甚シ尙ホ鼠蹊及鞦帶上ニ小指頭大ニ二個ノ腺腫脹アルモ皮膚ト癒著ナク能ク移動ス右足蹠並ニ跟骨部ニ皮膚ノ輝裂ヲ認ム他淋巴腺ニ異狀ナシ局部穿刺鏡檢スルニ類似「ペスト」菌ヲ認ム

經過

十五日 午前腺ノ腫脹僅ニ縮小セリ他症狀依然タリ午後心音ハ稍々微弱トナル局部異狀ナシ午後九時脈搏變

ナシ心音稍々良トナル局部ノ疼痛少シク緩解セルカ如シ

十六日 同様ニシテ時々咳嗽ヲ發スルモ略淡ナシ聽診上異變ヲ認メス股腺ニ於テ一部皮膚少シク發赤セリ結

膜充血ハ殆ト去レリ氣分大ニ良トナル股腺ノ大ナルモノハ假性波動ヲ呈ス該皮膚ハ發赤ヲ增ス他ノ腺ハ依然硬シ脈搏ノ代月經來潮ス

十七日 精神僅ニ不安ノ狀アリ股腺ノ大ナルモノハ波動ヲ呈ス該皮膚ハ發赤ヲ增ス他ノ腺ハ依然硬シ脈搏ノ結合代ナシ腺ノ大ナルモノハ著シク隆起セリ周圍炎ハ消退セリ

十八日 局部前日ニ比シ縮小シ壓痛亦大ニ去レリ試ニ柔軟部ヲ穿刺スルニ膿得タリ昨夜ハ安眠ヲ得スト云フ十九日 右腋窩下部胸壁ニ接シテ雀卵大硬固ノ淋巴腺腫脹アリ疼痛ナク能ク移動ス左腋窩ニモ小指頭大ニシテ同様ノモノヲ見ル何レトモ皮膚ニ變化ナシ自覺症狀佳良午後局部潮紅シ柔軟腫脹ヲ増加ス依テ切開排膿セリ皮下結締織ハ壞疽様ニ變セリ

二十日 創孔膿分泌アリ周圍ノ硬結未タアリ

廿一日 注射局部ニ膿麻疹發生ス熱少シク上ル創孔排膿ナシ症狀稍々不良トナル舌ハ苔ナク滑澤ニシテ赤色嘔氣アリ

廿二日 膜麻疹ハ蔓延シテ四肢ニ及フ諸關節疼痛ヲ訴フ氣分不良熱ハ稍々下降患部排膿ナク周圍ノ浸潤漸次消褪ノ傾向アリ午後發疹ハ全身ニ及フ眼球結膜及ヒ皮膚ハ黃色ヲ呈ス嘔氣止マス食氣不進

廿三日 發疹ハ前同様皮膚ノ黃色少シク消退嘔吐一回アリ局部排膿ナシ

廿四日 热下降發疹ハ大半消散セルモ氣分變ナシ關節痛依然眼結膜ノ充血去ル心窩緊滿嘔氣未タアリ

廿五日 食慾稍々進ム關節痛大ニ去ル右股腺ノ浸潤消散シ創孔ハ前ト變ナシ舌ハ濕潤僅ニ白苔ヲ衣ス嘔氣嘔吐止ム全身發疹消退一般症狀良ナリ

廿六日 體溫下降セリ眼球結膜左右共ニ充血羞明疼痛アリ溫奄法ヲ行フ下頸關節ノ疼痛ヲ來ス開口困難トナレリ

廿七日 症狀同様

廿八日 創孔稍々良トナル

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百四十六

廿九日 諸症依然繃帶交換セス眼ノ症狀稍々良トナル

三十日 前同様

七月一日 諸症狀良トナル

七月二日 同上

三日 同上眼ノ症狀殆ト去ル

四日 創孔肉芽良排膿ナシ

五日 六日、七日、八日、九日、十日、十一日、十二日 症狀益々佳良

十三日 創孔殆ント癒合ス

十四日 創孔全ク閉鎖ス

十五日 諸病狀良ナルヲ以テ退院セシム

横濱市根岸町三千五百七十七番地

萬里小路又憲方

第十二號

肥田ムメ

十一年

既往症

著シク精神溷濁ノ爲メ詳細ヲ知ルコト克ハサルモ本病ハ明治三十六年九月二日午前身體倦怠發熱等ノ症狀ヲ發現

左腋窩部ニ疼痛ヲ來ス同三日ニ至リ同病診定ノ下ニ本院ニ送ラル

現病

體格營養共ニ佳良顔貌不安ノ狀ヲ呈ス眼結膜充血瞳孔變化ナク體溫四十度三分ニシテ時々身體ヲ動搖シ強テ抑止セントスレハ其ノ度高マリ床上ニ轉輾シ却テ人ヲ咬マントスルノ狀ヲ呈スルコトアリ神識ハ甚シク溷濁シテ人事ヲ辨セス時々譖語ヲ發ス

呼吸器系ニハ異狀ナシ血行器系ニ在テハ脈搏頻數不整ナレトモ心音心界共ニ變化ヲ見ス消化器系舌ハ口ヲ緊閉スルヲ以テ檢スルヲ得ス腹部ハ柔軟ニシテ肝脾共ニ變ナシ淋巴系左腋窩腺ハ小鷄卵大ニ腫脹皮膚ト瘻着シ該部ノ皮膚ハ僅ニ浸潤シ變色ナク之ヲ壓スルトキハ疼痛ヲ訴フ其他ノ腺ニハ異狀ヲ認メス局部穿刺シ液ヲ取り鏡檢スルニ無數ノ疑似「ペスト」菌ヲ認ム

經過

四日 熱少シク下降精神稍々明瞭トナル局部ノ疼痛依然周圍ノ浸潤增加シテ乳房外側及鎖骨下窩ニ波及セリ腺ハ昨日ヨリモ增大セリ午前九時三十分（全身魔醉）局部切開腺摘出ヲ行フ脈搏頻數ニシテ熱高シ精神ハ溷濁呼フトキハ醒覺シテ僅ニ應答スルノミ常ニ轉輾反側ス舌ハ黃白色厚苔ヲ衣ス腹部雷鳴アリ尿道ハ腫脹シ孔ハ肉芽狀ヲ呈ス容易ニ出血シ尿ハカテ一アルニヨリ排出脈搏ハ重複性トナル

五日 脈搏ノ重複止ム精神症狀變ナシ創孔ハ稍々良排膿ナシ舌ハ清潔トナリ尿利自然ニ來ル食機少シク進ム午後八時脈搏再ヒ頻數不正熱高ク精神ハ朦朧食慾不進病狀一般ニ良ナラス夜十二時頃ニ至リ益々不良トナリ脈搏殆ント觸知スルコト難ク心音ハ幽微トナリ四肢厥冷ヲ來ス

六日 諸症狀益々不良ニ陥リ遂ニ午前四時心臟癱瘓ノ爲メ鬼籍ニ入ル

横濱市松影町一丁目三十七番地

（龜之湯）勝次郎次女

第十三號

既往症

父母共ニ健存同胞五人内一人數日前腦膜炎ニ罹リ死亡患者生來健全著患ヲ知ラス

本病ハ明治三十六年九月五日正午ヨリ發熱アリ同六日ニ至リ益々增惡スルヲ以テ某醫ノ診ヲ受ク直ニ入院スルニ至レリト云フ

現 症

體格體質共ニ中等營養稍々良顔貌不安ノ状態ヲ呈スルモ嗜眠スルコト多ク皮膚ハ乾燥稍々蒼白ヲ呈ス精神ハ少シク鈍ナリ體溫三十九度四分ヲ示ス

呼吸器系、異狀ヲ認メス

血行器系、脈搏頻數ニシテ心音心界變化ナキモ心悸亢進ス

消化器系、舌苔ヲ被リ口渴甚シ食氣不進嘔氣アリ腹部異狀ナシ

淋巴系、右鼠蹊腺一個雀卵大ニ腫脹皮膚僅ニ發赤セリ壓スルニ疼痛甚シ右股腺腋窩及頸腺ニモ一二ケノ腫脹ヲ認ム

經 過

七日 右鼠蹊腺ノ腫脹ハ依然タリ下方股腺ハ殆ント鳩卵大ニシテ皮膚ト癥着シ發赤少キモ浸潤並ニ壓痛著明嘔吐アリ精神ハ嗜眠ノ状態ニアリ強ク呼フトキハ漸ク應答ス午後ニ至リ脈搏頻數不正トナル其他ノ症狀變ナシ

八日 精神稍々良應答明瞭トナル股腺ハ前日ト變ナキモ鼠蹊腺ハ腫脹增加セリ口渴甚シク嘔吐未タアリ他ハ變化ナシ

九日 脈搏漸次不良顔貌益々不安ノ状ヲ呈ス熱高ク局部大差ナシ

十日 局部益々增大疼痛甚シ胸部左側ニ於テ笛聲ヲ聞ク喉頭少シク喘鳴ヲ發ス

十一日 諸症狀增惡局部ハ未タ波動ヲ呈セサルモ發赤疼痛甚シ右側頸腺豌豆大ニ腫脹壓痛及ヒ浸潤アリ脈搏觸知スルコト難ク心動幽微口唇チアノーゼヲ呈ス呻吟甚シ益々不良ニ陥リ午後〇時二十分遂ニ死亡

横濱市松影町一丁目三十七番地

勝次郎三女

松 本 ハ ナ

第十四號

既往症

兩親健存同胞五人内一人死亡患者生來健全著患ニ罹リシコトナシ
明治三十六年九月四日頃ヨリ發熱アルノ外別ニ異狀ヲ認メサルモ患者ノ姉疑似ペストニテ九月四日本院ニ入院故ニ注意患者トシテ同六日送院セラルト云フ

現 症

體格體質營養共ニ佳良患者診斷ニ際シ大ニ恐怖號泣甚シク爲メニ細診スルヲ得サルモ發熱(二十八度九分)ノ外異狀アルヲ認メス

呼吸器血行器消化器神經系淋巴系等ニ變化ナシ

經 過

七日 一般症狀良ナルモ不安ノ状態アリ

八日 高熱ノ他異變ナシ

九日 同上

十日 諸症狀同様ナルモ不安ノ状態アリ

十一日 體溫依然高シ脈搏頻數ナルモ不正ナラス左頸腺ニ鳩卵大ノ腫脹ヲ生シ周圍ノ浸潤甚シク且ツ疼痛アリ試ニ穿刺シ其液ヲ取リ鏡檢スルニ多數ノ類似「ペスト」菌ヲ認ム

十二日 前同様ナルモ時々嘔吐アリ

十三日 左頸部浸潤硬結變ナシ更ニ右頸部ニ鶏卵大ノ硬結ヲ生シ脈搏ハ細ニシテ弱トナル局部ハ兩側共ニ腫脹ヲ増シ皮膚發赤セリ午後九時頃ニ至リ呼吸困難聲音少シク嗄嘶ス

十四日 脈搏頻數不正局部症狀變ナシ

十五日 頸部兩側共ニ著シク腫脹頸部一般ニ浮腫ヲ生セリ嘔吐並ニ咯痰多キモ胸部聽診上著變ヲ認メス

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百五十

十六日 脈搏良ナラス 左頸部腫脹稍々減シ柔軟トナレリ 穿刺孔ヨリ排膿アリ 故ニ切開排膿セリ 顔貌稍々爽快ノ状アリ

十七日 局部硬結少シク縮小創孔ヨリ排膿アリ 體溫稍々上昇右側モ柔軟トナレリ

十八日 脈搏依然頻數創孔變ナシ 右頸腺モ波動ヲ呈ス

十九日 症狀前日ト異ナルコトナシ 右側切開排膿セリ

二十日 左創孔ヨリ惡臭アル 排膿多量ニアリ 右側ハ膿少ナシ

二十一日 同上

二十二日 局部大差ナシ 顔面黃色ヲ呈シ 脈搏不良食機不進等ヲ來ス

二十三日 頸部創孔左右共ニ排膿盛ナリ 脈搏頻數ニシテ弱體溫少シク下降

二十四日 二十五日 同上

二十六日 創孔排膿漸次減少體溫依然高シ 咳嗽頻發 昨夜安眠セスト云フ

二十七日 局部變ナシ 脈搏頻數不正食氣不進益々衰弱ヲ加フルノミ

二十八日 同上

二十九日 昨夜咳嗽ノ爲メ不眠嘔吐アリ 热高シ衰弱加ハル

三十日 咳嗽少ナシ 热下降 脈搏稍々良トナル 右創孔良ナルモ左創孔ヨリ排膿多シ 午後脈搏頓ニ不良トナリ 殆ト觸知スルニ難ク 症狀益々不良トナルノミ 體溫下降シテ三十五度八分トナル

十月一日 諸症狀益々増悪シ 苦悶甚シク呼吸困難等ヲ來ス 遂ニ午後二時死亡セリ

横濱市南太田町千八百八十二番地

池戸牧太郎雇人

十一年

第十五號

既往症

患者神識錯迷セルヲ以テ不詳明治三十六年七月二十一日午後六時十五分本院ニ送附セラル

現症

體格營養共ニ佳良 顔貌苦惱ノ狀ヲ呈ス 眼結膜貧血眼球變化ナク 皮膚特ニ顔面ハ稍々苦色ヲ呈シ 嘰語ヲ發シ

身體ヲ動搖シ 安靜ナラス 精神變調應答不明 體溫三十九度八分

呼吸器系、異狀ヲ認メス

血行器系、脈搏頻數不正ニシテ百五十至ヲ算ス 心悸亢進セリ

消化器系、舌ハ乾燥白苔ヲ衣ス 時々嘔氣嘔吐ヲ發ス 腹部柔軟ニシテ壓痛ナク 肝脾ノ肥大ヲ認メス
淋巴系、左腋窩部ニ手拳大ノ腫脹アリ 内ニ數個鳩卵大ノ腺腫脹ヲ認メ 壓スルニ甚シキ疼痛アリ 該部皮膚ハ發赤ナキモ浸潤ヲ呈ス 左側鼠蹊部及ヒ頸部ニ僅ニ腺ノ腫脹アリ

經過

二十二日 昨夜諱語甚シク 安眠ヲ得ス 热ハ下降スルモ 脈搏多數應答明瞭トナル 局部ノ腫脹少シク減スルモ 疼痛尙ホ盛ナリ 左鎖骨上部ニ腫起ヲ生シ 微痛アリ 嘔氣甚シ午後ニ至リ 热更ニ高ク 心悸亢進著シク 精神ハ發揚シ殆ト躁狂狀態ニアリ

二十三日 昨夜安眠セス 今朝稍々沈靜 脈搏微弱ニシテ不正熱下降ス 腋窩及ヒ鎖骨上部ノ腫脹益々增加シテ上

臍内側ニ波及セリ

二十四日 热下降セリ 腫脹ハ前頸部ニ及フ 疼痛依然腋窩ノ腺ハ柔軟トナリ 稍々減退セルカ如シ 其他左側鼠蹊部ノ腺モ腫脹シ 小指頭大トナリ 壓痛少シク存ス 午後ニ至リ 脈搏ハ不正腫脹ハ左耳下腺部ニ及フ 呼吸困難ノ狀ヲ呈ス 且ツ鼻翼呼吸ヲ營ム 嘴頭ノ喘鳴ヲ發シ 四肢厥冷等ヲ來ス

二十五日 脈搏微細不正ニシテ觸ル、ニ難シ 左耳下腺部ノ腫脹ハ蔓延シテ左全頬部ニ波及シ 右頸腺モ腫起皮膚ノ浸潤ハ頸部ノ全周ニ亘リ 一種異様ノ顔貌ヲ呈ス 嘴頭ヲ檢スルニ軟口蓋ニ懸垂等腫脹赤變シ 左右口蓋弓

ハ腫脹甚シク兩側相觸接セントシ扁桃腺及咽喉後壁ハ爲メニ見ルコト克ハス舌ノ運動著シク困難言語不明瞭トナル呼吸困難喉頭ノ喘鳴及ヒ鼻翼運動盛ナリ精神ハ稍々明瞭瞳孔ハ中等度ニ散大反應稍々存ス腋窩腺腫脹部ハ少シク波動ヲ呈ス
諸症狀漸次増惡苦悶加ハリ轉輾反側シ遂ニ午前七時三十分死亡

横濱市松影町丁目三十七番地

理髮業 末吉長女

第十六號

十二年

既往症

兩親健存同胞五人一弟二妹ハ昨日及今日ニ亘リ急病ノ爲メニ死ス生來強壯ト云フニアラナルセ著患ニ罹リシコトナシ

本病ハ明治三十六年九月七日ヨリ全身倦怠發熱及ヒ右下肢ノ疼痛等アルヲ以テ某醫ノ診ヲ受ケタリ同九日同病ノ下ニ本院ニ送ラルト云フ

現 症

體格中等營養佳良顔貌稍々無慾狀ヲ呈ス眼結膜充血肌温高ク皮膚乾燥シ精神少シク朦朧タルモ應答明瞭ナリ呼吸器系異狀ヲ認メス

血行器系脈搏頻數ナルモ緊張シ心悸亢進著明心音心界變ナシ
消化器系舌ハ乾燥黃白色ノ厚苔ヲ衣ス食氣不進腹部平坦ナルモ緊張ス肝脾ノ肥大ナシ

淋巴系右股腺ハ鷄卵大ニ腫脹シ硬固皮膚ト癢着シ其部ハ發赤ナキモ浮腫狀ヲ呈ス之レト連續シテブーバルト氏鞦帶上ノ腺ニモ腫脹アリ大サ鳩卵大ニシテ數個連續シ凡テ自覺痛ヲ訴フ右頸腺ニ大豆大ノ硬結アルノ外他ノ腺

ノ腫脹ヲ認メス局部穿刺液ヲ取り鏡檢スルニ多數ノ類似「ペスト」菌ヲ認ム

経過

十日 脈搏頻數不正且ツ弱シ譖語甚シク不眠並ニ不安ノ狀アリ局部ハ腫脹增加セリ

十一日 股腺部浸潤甚タ增進大腿ノ半ニ達ス上部ハ臍ト耻骨縫際ノ間ニ至ル壓スルニ疼痛アリ其他ノ症狀前日ト異ナルコトナシ

十二日 精神稍々明瞭トナル他ハ依然タリ

十三日 局部ノ浸潤益々增加セリ

十四日 脈搏尙ホ頻數不正局部大差ナキモ發赤ヲ來ス

十五日 局部ハ柔軟トナル浸潤ハ増加シテ右腸骨部全體ヨリ季肋部ニ及ヒ背部ハ脊柱ニ達ス脈搏稍々良トナル精神亦明瞭

十六日 股腺部ニ水泡ヲ生ス右大腿並ニ腹部ノ浸潤稍々去ル右眼充血セリ

十七日 同上

十八日 前日ト大差ナシ熱少シク上ル右側耳下腺部腫起疼痛アリ眼症狀稍々良トナル

十九日 耳下腺ノ疼痛減スルモ化膿ノ傾アリ

二十日 右創孔排泄物ナシ左耳垂下ニ鷄卵大ノ腫脹ヲ生シ壓痛アリ爲メニ開口困難トナル右腋下ニ膿瘍ヲ

生ス切開排膿セリ

二十二日 股腺部切開スルモ排膿セス結締織ノ壞死片ヲ見空洞ヲ來ス上方及内方ニ消息子ヲ送入スルコトヲ得

二十三日 脈搏及顔貌稍々良創孔何ツレモ排膿ナシ

二十四日 右耳下腺部ニ於テ深部ヨリ少許ノ排膿アリ股腺部變ナシ只下腹ニ食後疼痛ヲ發ス

二十五日 右ブーバルト氏鞦帶上ニ浮腫アリ潮紅增加ス疼痛アリ腹部痛ハ依然タリ

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百五十四

二十六日 プーバルト氏鞆帶上ノ炎症狀ハ稍々良トナル

二十七日 股腺ノ壞死片剝離セリ其近傍ヨリ排膿多量右大陰唇ニ浮腫ヲ來ス腹部壓痛減少尿ノ失禁ヲ來セリ

二十八日 股腺部同上ニシテ其上部ニ於テ又々切開セリ

二十九日 三十日、同上

十月一日 創孔同變脈搏頻數時々惡寒アリ

二日 諸症狀同變腹部稍々軟トナル

三日 創底ハ壞死組織ヲ附シ創ノ周圍ヲ壓ズレハ數個ノ孔口ヨリ排膿多量臭氣強シ

四日 同上

五日 热漸次下降症狀稍々良

六日 上部ノ皮膚切開ヲ行フ底面ニ多量ノ壞疽片アルヲ以テナリ

七日 脈搏頻數心悸亢進熱高ク時々諧語ヲ放チ不安ノ狀ヲ呈ス昨夜來安眠セスト

八日 同上

九日 創孔腹部ニ接近シタル側ニ數個ノ孔アリ惡臭膿多量排出創孔ノ上方ニ輕痛アリ僅ニ浸潤セリ衰弱加ハ

ル

十日 上部ノ二孔ハ膿汁多シ

十一日 同上

十二日 排膿臭氣共ニ依然昨夜一回嘔吐セリ

十三日 同上

十四日 長サ六寸計リノ圓形ノ壞死結締織片ヲ排泄セリ

十五日 脈搏奮フ體溫下降排膿少量トナル

十六日 十七日、十八日、十九日、廿一日、廿二日 同上

九日

創孔腹部ニ接近シタル側ニ數個ノ孔アリ惡臭膿多量排出創孔ノ上方ニ輕痛アリ僅ニ浸潤セリ衰弱加ハ

ル

十日 上部ノ二孔ハ膿汁多シ

十一日 同上

十二日 排膿臭氣共ニ依然昨夜一回嘔吐セリ

十三日 同上

十四日 長サ六寸計リノ圓形ノ壞死結締織片ヲ排泄セリ

十五日 脈搏奮フ體溫下降排膿少量トナル

十六日 十七日、十八日、十九日、廿一日、廿二日 同上

九日

諸症狀良創孔ノ排膿甚少ナシ

三十日 同上

三十一日 同上

三十二日 同上

三十三日 同上

三十四日 體溫上升スルノ他異變ナシ

三十五日 體溫下降創孔佳良爾後二十五日ニ至ル同様

三十六日 創孔全ク治癒ス其他一般症狀良ニシテ僅ニ衰弱ヲ殘スノミ

三十七日 二十八日 同様

三十八日 諸症狀佳良ナルヲ以テ退院ヲ命ス

横濱市松影町一丁目三十七番地

河合音次郎

四十七年

既往症

生來健全明治三十六年九月七日午後惡寒發熱右股膜ニ腫起疼痛同日某醫ノ診ヲ受ケ同八日野毛山病院ノ診斷ヲ受ク同九日注意患者トシテ本院ニ送ラルト云フ同日午後四時局部穿刺液ヲ取り鏡檢スルニ多數ノ類似「ペスト」

菌ヲ認ム

現症