

## 21. 発熱に関するアンケート調査

1. 健康児の腋窩温を何度から何度くらいまでとしますか。

最高最低 体温	乳 児		幼 児		学 童	
	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低
8					1	
7	3					
6	2		1		2	
5	179		53		43	
4	45		78		20	
3	86		72		41	
2	70		59		59	
1	7		5		12	
37.0	54	2	151		200	
9	4		9		15	2
8	3	23	14	2	37	1
7	2	10	6	3	7	5
6		7	2	17	6	1
5	1	84	1	65	8	52
4		8		10	2	6
3	1	26	1	23	1	25
2		15	1	21	1	18
1		1		1		3
36.0		221		240		249
9		1		2		1
8		12		22		27
7		1		1		1
6		1		3		5
5		12		15		27
4						
3		1				
2						1
1						
35.0		6		5		6
不 明	23	49	27	50	25	50
計	480	480	480	480	480	480

2 一般に高熱というときは、およそ何度以上でしょうか(腋窩温)

	乳 児	幼 児	学 童
4 1.0		1	1
4 0.1	1	1	1
4 0.0	1 1	5	5
3 9.5	1 5	1 5	8
3 9.1		1	1
3.9.0	2 1 3	2 2 0	2 2 2
3 8.9			1
3 8.8	3	3	1
3 8.7	1	1	1
3 8.6	1	1	1
3 8.5	1 4 4	1 4 2	1 3 3
3 8.3	3	3	3
3 8.2	1	2	
3 8.1			1
3 8.0	7 4	7 3	8 3
3 7.8	1		1
3 7.5	2	2	5
3 7.2			1
不 明	1 0	1 0	1 1
計	4 8 0	4 8 0	4 8 0

3 強いていえば、解熱剤を使用する目的は次のうちどちらでしょうか

発熱の程度によって使う	3 0 7	6 4.0%
発熱以外の症状によって使う	1 4 3	2 9.8
その他及び不明	3 0	6.2
計	4 8 0	1 0 0.0

4 症状によって異なるとは思いますが、解熱剤使用の時期についてお聞かせ下さい。

(1) 度、分以上あれば  
発熱当初からでも使  
う 326人

(2) 症状によっては発熱当初から使う  
適応となるおもな症状は  
223人

体 温	人
40.1	1
40.0	5
39.5	6
39.1	1
39.0	50
38.7	1
38.5	97
38.3	2
38.2	2
38.0	109
37.8	4
37.7	1
37.6	2
37.5	40
37.0	5
不 明	154
計	480

症 状	人	223人に対して
熱状けいれん	119	53.4%
不 機 嫌	55	24.7
頭 痛	47	21.1
全身症状	31	13.9
不 眠	25	11.2
不 安	18	
食欲不振	18	
嘔 吐	17	
神 経 痛	10	
悪感戦慄	9	
咽頭高度発赤	8	
顔 色	7	
発 熱	7	
上気道炎	6	
咳	6	
腹 痛	5	
下 痢	5	
呼吸促迫	5	
脱水症状	5	
苦 痛	4	
扁桃 炎	4	
そ の 他	21	

(3) 発熱があっても直ちに使用しないで〇度〇分以上の熱が〇日くらいつづいたら使う

79人

体温	日	人
39.0		5
38.5		7
38.0		2
39.5	3	2
39.0	3	1
39.0	2	1
39.0	1	1
38.5	3	7
38.5	2	8
38.5	1	11
38.5	0.5	2
38.3	2	1
38.0	4	1
38.0	3	7
38.0	2	8
38.0	1	5
37.7	2	1
37.5	7	1
37.5	5	1
37.5	4	1
37.5	3	1
37.5	2	2
37.2	2	1
37.0	2	1
37.0	1	1

次のような症状のとき使う 82人

症 状	人	%
熱性けいれん	23	
不機嫌	23	
不眠	17	
頭痛	15	
全身倦怠	11	
食欲不振	10	
ひきつけ・けいれん	8	
脱水	4	
発熱原因の判明して いるとき	4	
嘔気、嘔吐	4	
関節痛	3	
上気道炎	3	
不安	3	
その他	32	

(4) ほとんど解熱剤を使わない人

36人

(5) その他の意見

省略

5 日常使用している薬品名をお聞かせ下さい

経 口 薬					
乳	児	幼	児	学	童
スルピリン	150	パッフアリン	161	パッフアリン	183
アスピリン	104	スルピリン	147	アスピリン	144
パッフアリン	91	アスピリン	123	スルピリン	133
ボンタールシロップ	97	ボンタール	98	ボンタール	60
ボンタール		フェナセチン	19	フェナセチン	14
サチボン	22	サチボン	11	ブルフェン	20
フェナセチン	13	アセトアミノフェン (ピリナジン)	15		
PL顆粒	11	ママレット	10		
アセトアミノフェン	10	PL顆粒	11		

坐 薬					
乳	児	幼	児	学	童
メチロン	127	メチロン	102	インダシン	64
イルピン	122	イルピン	105	メチロン	31
サリチゾン	26	インダシン	44	イルピン	22
バリオメール	27	サリチゾン	25	インドメサシン	12
スルピリン	22	アセトアミノフェン アンヒバ	21		
インダシン	23	バリオメール	17		
アセトアミノフェン	21	スルピリン	16		
アンヒバ		アミノピリン	12		
アミノピリン	14	エスピン	19		
エスピン	14	アスピリン	10		
ママレット	13				
アスピリン	11				

注 射 薬					
乳	児	幼	児	学	童
メチロン	51	メチロン	60	メチロン	57
スルピリン	23	スルピリン	27	スルピリン	29
メチロン10%	14				

6 解熱剤の使用法について

(1) 屯用で1日〇回まで

		ま と め				
1) 屯用で1日	1回	25	1~2回	17人	3) 解熱剤を単独使用	130
	2回	143	1~3回	4人	4) 他剤と併用	284
解答	3回	125	2~3回	30人	両方	36
385人	4回	27	2~5回	1人	不明	30
	5回	1	3~4回	10人		
	6回	1	4~5回	1人		
					<hr/>	480
						人

(2) 定時で1日〇回あるいは〇時間おき

定時で1日1回		1人		
	2回		3人	
解答	3回		116人	
239人	4回		4人	
	1~2回		1人	
	3~4回		13人	
定時で1日(解答ナシ)回あるいは4時間おき			4人	
	"	5"	1"	
	"	6"	6"	
	"	8"	3"	
定時で1日1回あるいは5時間おき			1人	
"	2回	"	3"	1人
"	2回	"	6"	8人
"	3回	"	4"	7人
"	3回	"	5"	3人
定時で1日3回あるいは6時間おき			28人	
"	3	"	8"	23人
"	4	"	4"	1人
"	4	"	6"	14人
"	6	"	4"	1人