シスタチオニン合成酵素障害に基づくホモシスチン尿症の長期予後
(分担研究：現行マススクリーニングにより発見された
患児の管理と長期予後に関する研究)

長谷 豊*

【要約】厚生省研究班集計（1988年度末）で報告されている16例のシスタチオニン合成酵素障害に基づくホモシスチン尿症を主体に、長期予後、スクリーニングや管理上などの問題点について検討した。B₆反応性は、中間型と思われる1例以外は全例B₆不応型であった。早期に対称性制限食事療法を施行された例（1ヵ月以内8例）は、ほぼ良好な知能発達を示していた。身体発育は順調で、高対称性血症に比し高身長傾向にあった。血中対称性は初回から高値を示し、再採血、精検・診断時とより高値になるが、初回1.5mg/dlと正常が夫々1例あり注目された。また新生児期に尿ジントロカド反応が陰性で診断が遅れた例が4例あり、うち1例は高対称性血症として7歳で診断されていた。以上のことから、精検診断時の鋭敏で確実な尿中ホモシスチン検出方法の確立と、対称性以外の代謝産物を指標とした新しいスクリーニング法の開発も必要と考えられた。また生後39日と53日に夫々肺出血と肺梗塞で死亡した2例や9歳時に水晶体脱臼が見られた中間型があり、B₆投与の見直しと食事治療開始の優先、バチンの早期投与や血小板凝集抑制作用のある薬剤投与の考慮も必要と考えられた。

見出し語：ホモシスチン尿症、新生児スクリーニング、高メチオニン血症

【研究方法】シスタチオニン合成酵素障害に基づくホモシスチン尿症は、厚生省研究班青木らの1988年度末集計で、15例が報告されている。さらにスクリーニング正常で後に症状より発見された1例を加えても16例で、頻度は100万人に1人と、考えられていたよりはるかに少ない。これらの症例につき、症例報告、発表論文や

* 大阪市立小児保健センター 第一内科
(1st Dep. of Pediatrics, Osaka Children's Medical Center)

学会発表抄録などから長期予後を検討し、Muddら(1985) やPullonら(1980) の欧米の欧米の報告も参考に、スクリーニング や管理上などの問題点についても検討した。

表1 日本の新生児マススクリーニングで発見されたホモシスチン尿症

No.	患者	出生年度	性	メチオニン値 (mg/dl)			尿CN 反応	食事治療 開始年令	備考 (現在の状態など)
				初回	再検	精検			
1.	HK	1978	F			16~20	+	20日	死亡(39日) 肺出血
2.	KN	1979	M	8	8	16.0	++	48日	死亡(53日) 肺梗塞
* 3.	KH	1979	F	4	8	32.2	+	20日	10Y1M:IQ88, 水晶体偏位(+)
* 4.	TK	1979	M				-	<1月	2Yで治療中止, 5Y:右側水晶体摘出, 6Y11Mより右片麻痺, DG:20
5.	YK	1980	M	1.5	20	27.4	-	42日	正常(7Y6M:IQ101)
6.	NY	1981	M	13		10.4	+	30日	4Y3M:DQ110, 3Y6Mよりベタン投与
7.	YY	1981	F	8	8↑	18.0	+?	32日	正常(4Y:DQ105)
* 8.	KK	1982	F	12	12	20.7	±	24日	4Y9M:IQ105, 2Y3Mよりベタン投与
9.	MK	1982	F	4	20↑	25.4	++	52日	3Y:DQ86
*10.	KH	1983	M	8		21.2	-	3月8日	5Y8M:DQ94
11.	HH	1985	M	2~4	12	15.8	+	43日	正常
12.	TH	1986	M	4	8	15.0	?	59日	再検まで1.5月
13.	YT	1987	F	4	8	14.3	-	3月	5M肝機能障害, 1Y:DQ109
14.	AI	1987	F	8	25.2	31.5	?	30日	正常, ベタン投与
15.	Y	1988	M	4~8	16~20	24.3	+	28日	

*	MH	1985	F	1↓	/	8.3	+	2才5月	*10 KHの妹, スクリーニングも, DQ57

* 同胞例あり

【結果】表1は16例のまとめである。血中メチオニンは初回から高値を示し、再採血、精検・診断時とより高値になるが、最下段のスクリーニング正常で2歳5ヵ月時に症状から発見された1例(MH)と、初回1.5mg/dlであった例(No5, YK)は注目に値する。即ち高メチオニン血症を示さないシスチオニン合成酵素障害に基づく

シスチオニン尿症の存在である。また新生児期に尿シスチオニン反応が陰性で診断が遅れた症例が4例あり、いずれも治療開始が遅れている。うち1例は高メチオニン血症としてフォローされ、5歳で水晶体摘出手術、6歳時に右片麻痺より診断された問題例である。

このことから、精検診断時に鋭敏で確実な尿中シスチオニン検出方法(硝酸銀シスチオニン反応)の確立が必要で、さらにメチオニン以外のシスチオニンを指標としたスクリーニング法を始めとした新しいスクリーニング方法の開発も必要と考えられた。

B₆反応性は、中間型と思われる1例以外

表2 シスタチオニン合成酵素障害によるホモシスチン尿症のB₆反応性について

	B ₆ 不応型	B ₆ 反応型	中間型
I. Muddらの報告(1985): 529例*			
①症状 註は同胞検索で発見(474)	40 % (188)	47 % (224)	13 % (62)
②新生児スクリーニング発見(55)	78 % (43)	13 % (7)	9 % (5)
③高メチオニン血症(-)例(25)	8 % (2)	84 % (21)	8 % (2)

II. Pullonらの報告(1980): 32例*			
新生児スクリーニング発見例	85 % (23)	15 % (4)	- (0)

III. 日本の新生児スクリーニングで発見された症例 15例			
	93 % (14)	- (0)	7 % (1)

* B₆反応不明例を除く。

外はB₆不応型であった。PullonらやMuddらの報告でも、スクリーニング発見例のほとんどがB₆不応型である(表2)。しかし、Muddらは症状や同胞検索で発見された症例でのB₆反応型と不応型の比率はほぼ同率であったことと、高メチル血症のない例の84%がB₆反応型であったことから、B₆反応型の見逃しの可能性を示唆している。欧米では生後1~2日の採血であることも一因であろうが、わが国においても同様な結果が出ていることはB₆反応型の見逃しの考慮も必要で、今後B₆反応型をも検出出来るようなスクリーニング法の研究開発も必要と考えられた。

図1は知能発達の予後を見たもので、15例のうちIQ/DQの測定値が判明している症例の調べ得た最近の値を記入した。1症例(No4, TK)を除き、早期にメチル制限食事療法を施行された例(1ヵ月以内8例)は、ほぼ良好な知能発達を示しており、同胞例との比較(表略)でも、スクリー

リング発見・治療例の方が明らかに発達は良好であった。

知能発達について、Muddらは症状または同胞検索で発見された例では、IQ/DQが90以上か、平均または平均以上や正常発達と報告されたB₆不応型はたった9%である。しかし新生児スクリーニングで発見された例では77%と高率であり、Pullonら

表3 シスタチオニン合成酵素障害によるホモシスチン尿症の知能発達

	B ₆ 反応型	B ₆ 不応型
I. Muddらの報告(1985)		
①症状または同胞検索で発見 IQ 90 以上 平均or平均以上] の症例	43 %	9 %
②新生児スクリーニングで発見 IQ 90 以上 平均or平均以上] の症例	≒ 100 %	77 %
II. Pullonらの報告(1980)		
新生児スクリーニングで発見 IQ 90 以上または正常	100 %	81 %
III. 日本の新生児スクリーニング で発見された症例 IQ 90 以上または正常	/	75 %

の報告の81%や今回の集計の75%と同傾向を示した(表3)。このことから、B₆不応型 α - β - γ - δ - ϵ - ζ - η - θ - ι - κ - λ - μ - ν - ξ - $\omicron$ - π - ρ - σ - τ - υ - ϕ - χ - ψ - ω 尿症の知能発達に対する早期発見・早期治療の効果が著しいことは明らかであり、 α - β - γ - δ - ϵ - ζ - η - θ - ι - κ - λ - μ - ν - ξ - $\omicron$ - π - ρ - σ - τ - υ - ϕ - χ - ψ - ω 尿症のスクリーニングの必要性を再認識させる結果であった。

身体発育は順調であったが、高 α - β - γ - δ - ϵ - ζ - η - θ - ι - κ - λ - μ - ν - ξ - $\omicron$ - π - ρ - σ - τ - υ - ϕ - χ - ψ - ω 血症に比し高身長傾向にあり(図略)、マルファン症候群様体型に関連することも考えられるが、断定は出来なかった。

Thromboembolism(血栓塞栓症)について、Muddらは無治療のB₆不応型で15歳時には27%に既往歴としてみられるとしている。今回の15例でthromboembolismをきたした症例は、生後39日と53日に夫々肺出血と肺梗塞で死亡した2例(No1, HK; No2, KN)と6歳11ヵ月に脳血栓によると考えられる右片麻痺より α - β - γ - δ - ϵ - ζ - η - θ - ι - κ - λ - μ - ν - ξ - $\omicron$ - π - ρ - σ - τ - υ - ϕ - χ - ψ - ω 尿症と診断された1例(No4, TK)の計3例にみられた。血小板凝集能異常は症例KNのみで見られているが、HKは不明、TKでは明らかな異常は見られていない。しかし、いずれも治療開始直後か、治療が行なわれていない例であった。血小板凝集能異常に対して α - β - γ - δ - ϵ - ζ - η - θ - ι - κ - λ - μ - ν - ξ - $\omicron$ - π - ρ - σ - τ - υ - ϕ - χ - ψ - ω 系薬剤などの治療を実際に行なったのは、No9, MKのみであった。さらに α - β - γ - δ - ϵ - ζ - η - θ - ι - κ - λ - μ - ν - ξ - $\omicron$ - π - ρ - σ - τ - υ - ϕ - χ - ψ - ω 、特に活性型の投与後、急激な中止により状態が悪化した症例(No2, KN)もあり、VB₆大量投与を見直して、 α - β - γ - δ - ϵ - ζ - η - θ - ι - κ - λ - μ - ν - ξ - $\omicron$ - π - ρ - σ - τ - υ - ϕ - χ - ψ - ω 制限食事治療を第一選択とするよう研究班の暫定治療指針を改定する必要があると思われた。

水晶体脱臼について、MuddらはB₆不応型の自然経過で10歳時に82%にみられると報告している。この15例では、9歳時

に水晶体脱臼が見られた中間型の例(No3, KH)と5歳で水晶体摘出術を受けたNo4, TKにみられた。いずれも夫々の同胞(8歳時と10歳時)にもみられている。この予防のためには、長期投与による副作用が明らかでないので問題は残るが、 α - β - γ - δ - ϵ - ζ - η - θ - ι - κ - λ - μ - ν - ξ - $\omicron$ - π - ρ - σ - τ - υ - ϕ - χ - ψ - ω 減少を計る α - β - γ - δ - ϵ - ζ - η - θ - ι - κ - λ - μ - ν - ξ - $\omicron$ - π - ρ - σ - τ - υ - ϕ - χ - ψ - ω 投与が有効と考えられる。今回の集計でも5歳前より投与が行なわれた症例が3例あった。

以上から、 α - β - γ - δ - ϵ - ζ - η - θ - ι - κ - λ - μ - ν - ξ - $\omicron$ - π - ρ - σ - τ - υ - ϕ - χ - ψ - ω 尿症の頻度は低いが、治療効果から考え、スクリーニングは必要であるが、スクリーニング、診断、治療、予後、夫々に問題点があり、さらに研究して行かなければならないと思われた。

【文献】

1. 特殊 α - β - γ - δ - ϵ - ζ - η - θ - ι - κ - λ - μ - ν - ξ - $\omicron$ - π - ρ - σ - τ - υ - ϕ - χ - ψ - ω 情報, 第13号, 1986; p9-37.
2. 青木菊麿, 木野加代子: 厚生省心身障害研究・代謝疾患・内分泌疾患等の α - β - γ - δ - ϵ - ζ - η - θ - ι - κ - λ - μ - ν - ξ - $\omicron$ - π - ρ - σ - τ - υ - ϕ - χ - ψ - ω スクリーニング, 進行阻止及び長期管理に関する研究班平成元年度研究報告書, 1990; p11-13.
3. 池内優仁, 他: 日本先天代謝異常学会雑誌, Vol14, No1, 1988; p53.
4. 上村憲司, 他: 日本先天代謝異常学会雑誌, Vol14, No2, 1988; p33.
5. Mudd, SH, et al: Am J Hum Genet, 37, 1985; p1-31.
6. Pullon, DHH: Neonatal Screening of Inborn Errors of Metabolism (eds by Bickel, H. et al.) 1980; p29-44, Springer-Verlag.

検索用テキスト OCR(光学的文字認識)ソフト使用

論文の一部ですが、認識率の関係で誤字が含まれる場合があります

【要約】厚生省研究班集体計(1988年度末)で報告されている16例のシスタチオン合成酵素障害に基づくホモシスチン尿症を主体に、長期予後、スクリーニングや管理上などの問題点について検討した。B6反応性は、中間型と思われる1例以外は全例B6不応型であった。早期にメチオニン制限食事療法を施行された例(1ヵ月以内8例)は、ほぼ良好な知能発達を示していた。身体発育は順調で、高メチオニン血症に比し高身長傾向にあった。血中メチオニンは初回から高値を示し、再採血、精検・診断時とより高値になるが、初回1.5 mg/dlと正常が夫々1例あり注目された。また新生児期に尿シアンニトロプルシッド反応が陰性で診断が遅れた例が4例あり、うち1例は高メチオニン血症としてフォローされ、6歳時に診断されていた。以上のことから、精検診断時の鋭敏で確実な尿中ホモシスチン検出方法の確立と、メチオニン以外のホモシステインを指標とした新しいスクリーニング法の開発も必要と考えられた。また生後39日と53日に夫々肺出血と肺梗塞で死亡した2例や9歳時に水晶体脱臼が見られた中間型があり、B6投与の見直しと食事治療開始の優先、ベタインの早期投与や血小板凝集抑制作用のある薬剤投与の考慮も必要と考えられた。