HTLV-1の水平感染するまでの期間と抗体価の変動

武 弘道*、梅本正和*、地頭所保*、蔵屋一枝**、波多江正紀**、持富実***

【要約】過去5年間に判明した抗体陽性妊婦のうち、同意の得られた186例の妊婦の家系について種々の調査を行ない以下の結果を得た。①妊婦への感染経路は、症例数は48家系増えたが割合は昨年報告と大差なく、母子感染67.7% (126/186)、夫-妻感染18.3% (34/186)、輸血感染7.5% (14/186)、婚前交渉により感染4.3% (8/186)であった。②研究対象児より先に生まれた同胞134例(母乳保育)のうち20例(14.9%)が陽性であった。研究対象児は4例を除き人工栄養であり、63例中2例(3.2%)が陽性であった。③夫-妻感染26例の結婚生活開始から抗体陽性判明までの期間は、結婚生活開始約1~4年に感染が判明しているものが多かった。④経時的抗体価の変化では小児のほとんどが抗体価は上昇していた。夫陰性、祖母陽性の垂直感染と考えられる女性で、27歳時陰性であったものが、29歳時に陽性となったものがあった。この症例の子供は本人が陰性の時期に出産したが、4歳時すでに陽性であった。これは抗体陰性でもウイルスは存在し、子供に垂直感染する可能性があることを示した。

【見出し語】夫-妻感染、EIA抗体価、家系調査

【研究方法】私達は鹿児島市立病院の産婦人科と共同で1986年9月からHTLV-1の疫学と母児感染に関する研究を始めている。1991年12月までの5年間に抗体陽性妊婦のうち、同意の得られた186例の妊婦の家系について妊婦の母と夫の抗体検査をした。目的は、①昨年に引続き妊婦の感染経路の調査を行なった。②栄養法の差による垂

直感染率の比較を行なった。③夫-妻感染の場合、結婚生活(性生活)開始から抗体陽性判明までの期間を調査した。④経時的抗体価の変化を調査した。④の対象は1年以上の期間において抗体価を2回以上検査した小児8例であった。抗体価の検討はEIA法(エイテストATL)の結果を用い、抗体価はcut off index (C.I.)で示した。

*鹿児島市立病院小児科、**同産婦人科、***同検査室

【結果】①妊婦の母は129例中84例(65.1%)が陽性であった。このことは抗体陽性妊婦の34.9%は母以外から感染していることを示している。実際、輸血歴や婚前性交歴まで調べて分析してみると、妊婦への感染経路は、症例数は48家系増えたが割合は昨年報告と大差なく、母子感染126例(67.7%)、夫-妻感染34例(18.3%)、輸血感染14例(7.5%)、婚前交渉により感染8例(4.3%)であった(表1)。平均年齢29.6歳で18.1%が夫-妻感染であるので、40歳位の妊婦になると40%位が夫-妻感染による陽性者と考えている。②(表2)研究対象児より先に生まれた同胞134例(母乳保育)のうち20例(14.9%)が陽性であった。研究対象児は4例を除き人工栄養であり、63例中2例(3.2%)が陽性であった。③我々の調査では、抗体陽性妊婦の夫の陽性例は29例あり、そのうち3例は妊婦の母も陽性であったので夫から感染したことがはっきりした例は26例である。26例の結婚生活(性生活)開始から抗体陽性判明までの期間を(表3)に示した。11年、13年、16年と長いものがあるが、これは感染するのにこの年月かかったということではなく、たまたま妊娠して検査して陽性が判明したのがこの年であったということである。概ね結婚生活開始約1~4年に感染が判明しているものが多い。このような夫-妻感染の存在は母児感染と深く関係しており、HTLV-Iの高浸淫地においては高年齢キャリア-妊婦ほど母児感染の危険率は高いといえよう。

表1: 妊婦の感染経路

母子感染	126	(67.7%)
夫-妻感染	34	(18.3%)
輸血による感染	14	(7.5%)
婚前性交渉	8	(4.3%)
もらい乳	1	(0.5%)
母も夫も陽性のもの	3	(1.6%)
計	186	(99.9%)

表2: 母乳栄養児と人工栄養児の抗体陽性率

栄養法	調査数	抗体陽性者数	抗体陽性率
母乳栄養	134	20	14.9%
人工栄養	63	2	3.2%

表3: 夫-妻感染症例の結婚(性交渉の開始)より陽性判明までの期間

症例	年齢	夫の年齢	陽性判明までの期間
1)J.T.	29	28	8月
2)M.N.	27	31	11月
3)Y.H.	32	31	1年 0月
4)S.K.	25	28	1年 7月
5)Y.K.	28	33	1年 10月
6)Y.O.	26	33	1年 11月
7)S.N.	23	35	2年 1月
8)C.I.	24	24	2年 4月
9)Y.I.	25	28	2年 4月
10)M.S.	21	23	2年 5月
11)M.Y.	29	34	2年 6月
12)K.Y.	39	44	2年 6月
13)K.K.	38	36	3年 5月
14)T.T.	34	36	3年 8月
15)T.T.	31	38	3年 11月
16)S.H.	32	32	4年 8月
17)M.K.	28	32	4年 7月
18)R.T.	39	49	5年 3月
19)H.O.	30	33	5年 6月
20)K.O.	21	33	5年 10月
21)T.M.	37	38	7年
22)J.T.	36	40	8年 2月
23)Y.T.	38	41	8年 6月
24)T.S.	33	40	11年
25)M.M.	37	43	13年
26)T.T.	39	41	16年

④小児の経時的抗体価の変化(図1)：1例を除き7例が経時的にみると抗体価は上昇していた。抗体価が下降した症例は、母乳を3日間だけ授与しただけで感染したが、胎内感染あるいは経胎盤感染の可能性が高い。夫陰性、祖母陽性の垂直感染と考えられる症例で、27.5歳時 C.I.が0.73(陰性)であったものが29.7歳時に3.22(陽性)と上昇したものがあつた(図2)。この症例の子供は母がPA, EIAともに陰性の時期に出生したが、4.5歳時すでに陽性であつた。

【考察】水平感染では、多くが結婚生活開始約1～4年に感染することが証明された。これは重要な知見であり、正常な性生活を営んでいるにもかかわらず、妻の抗体価が陽転しない症例においてはPCR法を用いて感染の有無を確認する必要がある。

HTLV-Iに感染した個体におけるウイルスの増殖状況は未だよく分かっていない。今回小児のキャリアを経時的に追跡するとEIA抗体価はほとんどが上昇することがわかつた。古い血清においては、再度取り出して測定を試みたが、cut off indexにはさほど影響はなかつた。EIAの抗体価が高い症例ほどウイルス量が多いかの検討は今後の課題である。

HTLV-I抗体陽性率は男女とも年齢を追うごとに高くなることは周知の事実であるが、いずれの報告も男性の上昇率より女性の上昇率が有意に高く、その一因としては性交渉による夫-妻感染が考えられている。しかし、男性においても加齢による増加傾向がみられ、増加の理由は十分には解明されていない。加齢とともに免疫能が低下

図1：子供のEIA法による経時的抗体価の変化

図2：MT(母：26.8-30.9歳)とPT(子供：4.5-7.9歳)の抗体価の変化

して抗原の部分的発現を許すようになり、その結果非中和抗体である抗HTLV-I抗体が出現してくるとか、年齢による陽性率の違いは出生コホートの影響を考える意見も強い。

私達は抗体陰性でもウイルスは存在し、子供に垂直感染した症例を示した。抗体価の経時の上昇と考え合わせると、「HTLV-I抗体陽性率は男女とも年齢を追うごとに高くなる」のは、成人になってからでも陽転化する例があるからではないかと我々は考えている。

【文献】

- 1)武 弘道、梅本正和、地頭所保、池ノ上克、持富実：家族内調査からみたATLウイルスの疫学。日本医事新報、3492：43-46、1991。
- 2)梅本正和、武 弘道、地頭所保、池ノ上克、持富実、沢田高志：HTLV-Iの家族内感染におけるp40^{ex}抗体の検討。医学のあゆみ、158：829-830、1991。
- 3)武 弘道、梅本正和：出産年齢・出産順位と母子間感染（HTLV-I、HBV、梅毒） 周産期医学。21：1813-1817、1991。
- 4)武 弘道、梅本正和、地頭所保、波多江正紀、蔵屋一枝：ATLウイルスの疫学と母子感染に関する研究。 鹿児島県医師会報、9月号：2-9、1991。
- 5)武 弘道：成人T細胞白血病（ATL）ウイルス。助産婦雑誌、45、975-981、1991。
- 6)武 弘道：ATLの疫学。小児科診療、54：31-35、1991。
- 7)武 弘道、梅本正和、持富 実、楠原浩一：ゼラチン粒子凝集法（PA法）によるHTLV-I抗体の測定 -血清検体とEDTA血漿検体の比較-。臨床検査、35：665-666、1991。

検索用テキスト OCR(光学的文字認識)ソフト使用

論文の一部ですが、認識率の関係で誤字が含まれる場合があります

【要約】過去5年間に判明した抗体陽性妊婦のうち、同意の得られた186例の妊婦の家系について種々の調査を行ない以下の結果を得た。妊婦への感染経路は、症例数は48家系増えたが割合は昨年との報告と大差なく、母子感染67.7%(126/186)、夫-妻感染18.3%(34/186)、輸血感染7.5%(14/186)、婚前交渉により感染4.3%(8/186)であった。研究対象児より先に生まれた同胞134例(母乳保育)のうち20例(14.9%)が陽性であった。研究対象児は4例を除き人工栄養であり、63例中2例(3.2%)が陽性であった。夫-妻感染26例の結婚生活開始から抗体陽性判明までの期間は、結婚生活開始約1~4年に感染が判明しているものが多かった。経時的抗体価の変化では小児のほとんどが抗体価は上昇していた。夫陰性、祖母陽性の垂直感染と考えられる女性で、27歳時陰性であったものが、29歳時に陽性となったものがあった。この症例の子供は本人が陰性の時期に出産したが、4歳時すでに陽性であった。これは抗体陰性でもウイルスは存在し、子供に垂直感染する可能性があることを示した。