

ハイリスク妊娠研究調査票の集計

—Retrospective Studyの集計—

1. はじめに [問題の把握と今年度の課題]

統計学的な分析によれば高年妊娠、高年出産での合併症の発生率は高く、年齢が妊娠でのハイリスク要因の一つとして挙げられている。しかし、胎勢回旋異常など年齢依存性が証明されていないリスク要因も多い。これらの分析の多くは、個々の疾患に対してリスク要因がどのように寄与しているかといった詳細ではあるが“スタティック”なものである。

ところで我が国では、昭和49年を境にして生産率が低下傾向に転じ、その後一貫して減少してきた。また、純再生産率も、昭和49年に初めて1を割り、平成元年度には0.756までに落込んでいる。理由の一つに女性の社会進出の拡大と、出産適齢期層の未婚率の上昇が有る。結果的に晩婚化が進み、高齢妊娠、高齢出産の問題が高齢社会に於ける人口問題に関する社会的重要課題へと繋がっている。

高齢化によるリスク増大はある程度やむを得ない。それが避けられないリスクであるとするならば、本研究もまた、重篤な結果にならない為に何が必要となるのかということに重要視する必要があるであろう。その結果は、社会基盤の拡充に向けて具体的な施策へと反映されることを念頭に置いておく必要がある。この場合のリスクの分析では、リスク因子とそれによって生じる結果の時間的関係が重要となる。個々の疾患をターゲットにし、それに関連する因子を詳細に分析する従来の方法に対して、分娩結果や予後といった数量化が比較的困難な内容をターゲットにし、妊娠期間中に発生したいろいろなリスク要因がこれらのターゲット及ぼす影響の分析、さらに患者の満足

度など感覚的な内容を加味した分析、など、妊娠前の状態、妊娠期間中のエピソード、分娩後の状態と幅広い期間を取り扱った“ダイナミック”な分析も重要となる。ところで、これらのダイナミックな分析に共通して言えることは、無作為に抽出された被検者について妊娠の初期から分娩後までの長期に渡っての経過情報が必要となること、個々の過程での経過情報がそれぞれの過程を代表しかつ分析に耐えるほど十分簡素であること、評価方法についてもまだ確立していないこと、などである。また、分析のためには多大のデータ量が必要となり作業量も大きい。さらに、集められる情報が分娩結果などによって影響を受けない為にも、個々の経過情報はそれが発生した時点で集められることが望ましい。理想的にはProspectiveな研究とならざるを得ない。しかし短い期間に十分な量のデータを収集し分析することは不可能に近い。また、調査項目が分析に耐え得るほど十分簡素でかつ代表的であることを検証する意味も有って、Prospectiveな研究と並行して過去のデータを使ったRetrospectiveな調査も行った。本稿は、Retrospectiveな調査に関するものである。来年度に本格化するProspective Studyを補佐し、集められる情報の質などに関する問題点を明らかにし、Prospective Study成功の可能性を予測することが今年度の主な課題である。

2. 調査項目と調査方法

調査項目は、大きく分けて、既往歴、今回の妊娠中のエピソード、今回の分娩経過のエピソード、今回の分娩後の状態、そして医師による今回の妊娠と分娩に関する総合評価、の5つの部分か

ら成り立っている。各部分での代表的な項目は、質問事項として掲げ、その事項があったか無かったかについて問うている。不明という解答項目も挙げ、記入漏れが無いように設計している。さらに、例外的な内容やより詳細な項目については「その他」とか「疾患名」という形で自由形式の文章で答えられるようになってきている(表1)。自由形

表1: Retrospective Study 調査票での項目 (抜粋)

[既往歴に関するもの]

- 回数に関して
 - 妊娠回数
 - 分娩回数 (妊娠37週以上)
 - 自然産産 (妊娠28週未満)
 - 早期産 (妊娠22 - 36週)
 - 後期死産 (妊娠28週以上)
- 妊娠合併症および分娩時異常に関して
 - 頸管無力症の有無
 - 妊娠中毒症の有無
 - 吸引・鉗子分娩の有無
 - 帝王切開の有無
 - 分娩時異常出血 (500ml超)の有無
 - 前置胎盤の有無
 - 常位胎盤早期剥離の有無
 - その他の妊娠合併症・分娩時異常の有無とその詳細
- 他科疾患および妊娠偶発合併症に関して
 - 腎炎
 - 糖尿病
 - 甲状腺疾患
 - 本態性高血圧
 - 子宮筋腫
 - 不妊症
 - その他の他科疾患・偶発合併症と疾患名
 - 他科疾患および妊娠偶発合併症があった場合のコントロールについて
- 新生児の異常の経緯に関して
 - 低体重児 (2500g未満、IUGRを含む)
 - 新生児死亡 (生後1ヶ月以内)
 - 先天異常とその疾患名
 - その他の異常とその疾患名

[今回の妊娠中のエピソードに関して]

- 妊娠の経過に於けるエピソード
 - 流産後の入院治療の有無
 - 流産以外の入院治療の有無とその理由
 - 妊娠中毒症軽症の有無と有りと判断した事項の有無 (高血圧 [140/90以上]、尿蛋白 [1+以上が2回])
 - 妊娠中重症症の有無と有りと判断した事項の有無 (高血圧 [160/110以上]、尿蛋白 [1日尿200mg/dl以上、全身浮腫])
 - 妊娠後期ヘマトクリット 40%以上
 - 妊娠中胎児死亡
 - 子宮内胎児死亡
 - その他の妊娠合併症とその疾患名
 - 妊娠糖尿病
 - 不規則性抗体陽性
 - ヘモグロビン 9.0g/dl以下
 - その他の妊娠偶発合併症とその疾患名
 - 里帰り分娩
 - 妊娠中の喫煙 (1日10本以上)
 - 妊娠中の飲酒の程度
- 羊水穿刺または絨毛採取による胎児の出生前診断に関して
 - 出生前診断の実施の有無
 - 染色体またはその他の異常の有無

[今回の分娩経過のエピソードに関して]

- 全般的情報
 - 妊娠の初診日、分娩予定日、母親の年齢、入院日、入院事情
 - 分娩時母体状態、分娩週数、分娩胎位、分娩所要時間、出血量
 - 分娩時異常出血 (500ml超)の有無と異常出血がある場合の原因
- 分娩経過の異常に関して
 - 震盪陣痛の有無
 - 分娩遅延・分娩停止の有無
 - 数産遅延症
 - CFD・狭骨盤の有無
 - 前期破水 (陣痛発来前の破水)
 - 前期破水から分娩までの時間
 - その他の異常の有無とその疾患名

- 分娩時の処置に関して
 - 陣痛誘発の有無とその理由
 - 陣痛促進の有無
 - 吸引・鉗子分娩の有無
 - 帝王切開 (予定)の有無
 - 帝王切開 (緊急)の有無
 - 輸血の有無
- 分娩時の母体異常
 - 3度以上の会陰裂傷
 - 過剰出血
 - 分娩時ショック
 - 羊水塞栓
 - 静脈痛
 - 肺塞栓症
 - 母体死亡
 - その他の母体異常の有無とその疾患名
- 分娩時の胎児・胎児付属物の異常の有無
 - 羊水混濁
 - 分娩時胎児仮死
 - 分娩時胎児死亡
 - 前置胎盤
 - 胎盤早期剥離
 - その他の胎盤異常の有無とその疾患名
 - 臍帯の異常の有無とその疾患名

[今回の分娩後の状態]

- 新生児の所見に関するもの
 - 性別、体重、身長、頭圍長、1分と5分のアプガースコア
- 新生児の経過・処置に関するもの
 - けいれんの有無
 - 先天異常の有無と異常の種類
 - 気管内挿管の有無
 - 入院の有無、NICUへの入院が否か、入院した場合その理由
 - 新生児死亡 (28日未満)の有無、死亡時期とその理由
 - その他の経過異常の有無とその疾患名

[医師による総合評価に関するもの]

- 妊娠中の経過に関する総合的評価
- 分娩経過と子供の状態に関する総合的評価
- 長期的に見た、母体の産後の健康状態に関する総合的評価

式の記事の中へ書かれる内容が少なければ、設問の仕方がより妥当であり、逆の場合には問題があることを意味している。作成した調査票を班員の各施設に送付し、過去1年間のデータについて記入してもらって回収した。例数の差による歪みを少なくするため、分娩時の母体年齢を29才以下、30 - 34才まで、35才以上の3群に分け、29才以下、30 - 34才までの2群については各施設毎にそれぞれ100症例とし、35才以上は全件、記入してもらったことにした。平成5年2月末で、3374件のデータが集められたが、その内7件については追跡調査の結果、外国籍と判った。総合的な評価を行う場合に、習慣の違いや各項目の定義の違いなどによる歪みが大きいかも知れず、これを避ける為に入力の後に集計から除外した。ここで使うデータは残りの3367件である。集められたデータは、研究班の別のグループでも使用するため、必要な部分を切出して郵送した。

3. 集計結果

表2に各設問事項の解答の状況を母体の年齢が29才以下、30-34才、35才以上の3群について別々に集計している。夫々の群に含まれる件数はそれぞれ1353件、1215件、799件であった。この表から次のようなことが判る。

入院の中で治療入院を除けば、緊急入院の割合は、30-35才が12.5%と最も少なく、35才以上が15.4%と最も高い。しかし、これら両方とも東京都のデータによる緊急入院の割合(17.8%)に較べて明らかに低い。ところが、治療入院を入れると、緊急及び治療入院の全入院に占める割合は、29才、30-34才、35才以上のそれぞれの群で24.4%、23.5%、30.6%となる。明らかに、治療を目的として入院する患者の割合が高い施設のデータであることが判る。

既往歴で見た場合、新生児死亡の既往歴のある患者は、29才以下、30-35才、35才以上のそれぞれで0.8%、1.2%、2.5%となり、東京都のデータ(0.8%)より明らかに高い。妊娠中毒症の既往の有無でも、それぞれ3.0%、4.1%、4.7%となっており、この値も東京都のデータ(1.8%)より高くなっている。しかし、前置胎盤ではそれぞれの群で0.2%、0.4%、0.5%であるが、この値は東京都のデータ(0.3%)と大差無く、前置胎盤の既往が緊急や治療入院の直接のきっかけにはなっていない。

妊娠中の異常を見ると、例えば重症妊娠中毒症の発現頻度は、29才以下、30-35才、35才以上のそれぞれ群で2.1%、2.5%、3.9%となっており、東京都のデータ(1.8%)より若干高い。

帝王切開の頻度を上の3つの群でみると、予定がそれぞれ4.4%、6.9%、12.8%緊急がそれぞれ8.8%、8.6%、14.0%となっている。ともに加齢とともに増大する。ところが、帝王切開をした症例の中で緊急が占める割合を見ると、この3群でそれ

ぞれ66.5%、55.6%、52.3%と逆に下がってきており、加齢または加齢に伴う合併症などにより最初から帝王切開を予定する割合が高年妊娠群で高いことが判る。

妊娠週数、分娩に要する時間、出血量、前期破水から分娩までの時間、新生児の体重、身長、頭囲長、など連続量の比較は表2をみただけでは判りにくい。帝王切開の例を省いて、3つの年齢群を比較した。3つの群の間で差が認められたのは分娩時間、新生児の体重と頭囲であった。(表3)

表3: 連続量の3群での比較

項目	29才以下	30-34才	35才以上
分娩時間(分)			
n	1170	1020	584
μ	632.8	503.3	485.9
σ	544.4	407.3	498.3
p		0.000	0.000
出血量(ml)			
n	1170	1018	582
μ	367.6	340.0	350.5
σ	290.6	309.2	311.4
p		0.032	0.260
前置破水から分娩までの時間(分)			
n	263	164	98
μ	1470.4	1742.0	1495.1
σ	3137.6	3878.7	2492.4
p		0.450	0.938
週数			
n	1171	1026	584
μ	38.6	38.8	38.5
σ	2.7	2.1	2.3
p		0.210	0.358
新生児体重(g)			
n	1172	1027	586
μ	3001.2	3057.7	3032.6
σ	512.5	497.5	528.3
p		0.009	0.235
新生児の身長(cm)			
n	1132	987	562
μ	488.8	492.2	490.7
σ	32.1	29.0	28.8
p		0.011	0.219
新生児の頭囲(cm)			
n	1103	972	560
μ	330.7	333.3	334.7
σ	19.2	18.2	24.0
p		0.001	0.001
			0.226

4. 既往歴と今回の妊娠との関係

データの中から、不明と無記入の項目を除外し、既往歴と今回の妊娠との関係を調べた。表4は、既往歴と今回の妊娠データとの間で相関係数が0.1以上の項目をリスト・アップしている。表中、前期破水から分娩までの時間は、前期破水の

表4：既往歴と今回の妊娠データとの相関 [相関係数が0.1以上のもののリスト]

項目	件数	相関係数
共にデータがあった場合について		
妊娠回数		
母体の年齢	2415	0.271
分娩所要時間	2062	-0.157
前期破水から分娩までの時間	382	0.114
分娩回数		
母体の年齢	1815	0.300
新生児死亡時期	24	0.200
自然流産		
新生児死亡時期	12	-0.212
流早産以外の入院治療	699	-0.182
流早産の入院治療	698	-0.177
不規則性抗体陽性	463	-0.150
分娩回数	707	-0.138
前期破水から分娩までの時間	118	0.133
帝王切開(緊急)	708	-0.132
3度以上の会陰裂傷	706	-0.130
分娩時異常出血	682	-0.122
早期産		
新生児死亡時期	4	-0.905
新生児の体重	133	-0.312
入院の事情	132	0.244
NICUへの入院	110	-0.233
その他の胎盤異常	132	-0.228
アプガースコア1分	131	-0.208
分娩回数	133	-0.195
アプガースコア5分	109	-0.191
その他の母体異常	131	-0.169
軟産道強硬	130	-0.164
帝王切開(緊急)	133	-0.147
入院	132	-0.146
流早産以外の入院治療	131	-0.142
妊娠前の母体体重	122	0.142
妊娠中胎児仮死	130	-0.138
その他の妊娠合併症	129	0.137
気管内挿管	132	-0.128
分娩時異常出血	126	-0.124
早期産(狭き)		
新生児の身長	121	-0.119
微動陣痛	131	0.112
母体の年齢	133	0.110
妊娠中毒症重症	132	-0.109
初産日の妊娠週数	130	-0.106
後期死産		
不規則性抗体陽性	22	-0.690
母体の年齢	33	-0.395
分娩所要時間	22	0.375
前期破水から分娩までの時間	7	0.363
その他の胎盤異常	33	-0.361
陣痛誘発	32	-0.360
ヘモグロビン 9.0g/dl 以下	31	-0.358
新生児の頭圍	27	-0.354
新生児の身長	28	-0.313
妊娠中胎児仮死	31	-0.262
前期破水	32	-0.207
その他の母体異常	33	-0.206
出血量	27	-0.162
妊娠中毒症軽症	33	-0.160
母体の身長	33	0.144
その他の妊娠合併症	32	0.138
流早産以外の入院治療	33	0.134
帝王切開(予定)	33	0.134
アプガースコア1分	32	0.126
分娩時異常出血	28	0.129
羊水過剰	33	-0.124
NICUへの入院	33	-0.124
流早産の入院治療	32	-0.120
その他の異常経過	30	0.111
新生児の体重	33	-0.109
妊娠中の飲酒	21	0.106
気管内挿管	32	-0.103
顕性無力症の既往		
新生児死亡時期	35	0.224
前期破水から分娩までの時間	555	-0.174
染色体またはその他の異常	2478	-0.166
流早産の入院治療	3177	0.138
妊娠中毒症の既往		
妊娠中毒症重症	3199	0.244
妊娠中毒症軽症	3209	0.224
新生児死亡時期	85	-0.178
入院の事情	3203	-0.112
吸引・鉗子分娩の既往		
新生児死亡時期	35	-0.198
帝王切開の既往		
帝王切開(予定)	3243	0.492
新生児死亡時期	35	-0.198
出血量	3116	-0.197
帝王切開(緊急)	3246	0.181
母体の年齢	3251	-0.142
分娩胎位	3238	-0.142
分娩時異常出血	3159	0.129
C.P.D.・狭骨盤	3219	0.119
入院の事情	3223	-0.110
陣痛促進	3230	-0.104
分娩回数	3242	0.100

項目	件数	相関係数
共にデータがあった場合について		
分娩時異常出血の既往		
分娩時異常出血	3071	0.214
出血量	3028	-0.192
逸脱出血	3136	0.162
前置胎盤の既往		
帝王切開(予定)	3221	0.127
前置胎盤	3222	0.109
常位胎盤早期剥離の既往		
胎盤早期剥離	3219	0.144
子宮内胎児死亡	3180	0.137
糖尿病		
妊娠糖尿病	3294	0.133
その他の妊娠合併症	3282	0.108
甲状腺疾患		
その他の妊娠合併症	3284	0.103
本態性高血圧		
妊娠中毒症重症	3294	0.215
新生児死亡時期	36	-0.178
妊娠中毒症軽症	3303	0.145
入院の事情	3300	-0.122
子宮筋腫		
新生児死亡時期	36	0.223
帝王切開(予定)	3318	0.149
母体の年齢	3327	-0.107
不妊症		
新生児死亡時期	86	0.223
低出生体重児		
新生児の体重	3212	0.286
NICUへの入院	3187	0.217
分娩回数	3208	0.212
新生児の身長	3045	0.183
前期破水から分娩までの時間	554	-0.160
新生児死亡時期	34	0.138
入院	3193	0.134
入院の事情	3189	-0.131
新生児の頭圍	2982	0.125
妊娠中毒症重症	3186	0.124
気管内挿管	3142	0.118
アプガースコア1分	3160	0.115
帝王切開(緊急)	3212	0.114
分娩胎位	3205	-0.104
新生児死亡の既往		
新生児死亡	2914	0.125
先天異常		
出生前診断の実施	3098	0.203
先天異常	3187	0.103

異常があった症例についての時間である。新生児の死亡時期は、1が7日未満、2が28日未満として与えられる。入院の事情は、1：通常入院、2：緊急入院、3：分娩前より治療入院である。分娩胎位は、1：頭位、2：骨盤位、3：その他で与えている。先天異常は、1：有り、2：無し、3：疑い、妊娠中の飲酒は、1：よく飲む、2：たまに飲む、3：飲まないとなっている。上記以外の選択項目は、1：有り、2：無しである。この表から幾つかの特徴を知ることができる。その一部をリスト・アップすると、例えば次のようになる。

[妊娠回数]

妊娠回数と母体の年齢が相関することは自明として、回数が増えるほど一般に分娩所要時間は減少する。しかし、前期破水の異常がある時には、逆に分娩までの時間が増える傾向にある。

[自然流産の既往]

自然流産の経験が多いほど、入院治療が必要となる度合いが増える傾向にある。不規則性抗体が陽性となる割合も増え、緊急の帝王切開を行うことが増える。

[早期産]

早期産と新生児の体重との逆相関、及びNICUへの入院が増えること、アプガースコアとの逆相関などから、過去に早期産の経験の多いものほど今回も早期産となる可能性が高いことを示唆している。緊急入院や治療入院となる度合いも高い。緊急の帝王切開や妊娠中に胎児仮死となる割合も高い。

[妊娠中毒症の既往]

妊娠中毒症の既往がある場合、今回の妊娠でも妊娠中毒症になる頻度が高い。

[帝王切開の既往]

帝王切開の経験のある場合、帝王切開が最初から予定される傾向がある。CPD・狭骨盤とも正相関しているが、入院は緊急入院よりむしろ通常の入院となる場合が多い。

[分娩時異常出血の既往]

分娩時に異常出血した経験のある者は、今回の妊娠でも出血量は多く、弛緩出血の頻度も高い。

[前置胎盤の既往]

過去に前置胎盤を経験したもののほど今回も前置胎盤となる割合が高い。

[常位胎盤早期剥離の既往]

過去に胎盤早期剥離の経験をしたものは、今回も胎盤早期剥離になる割合が高く、結果として子宮内胎児死亡との相関も高くなる。

[低出生体重児]

過去に低出生体重児を出産したことのある者ほど今回も低出生体重児となる割合が高い。これらの内容をもっと詳細に知るためには、既

往歴の有無で個々の内容がどのようになっているかを集計することが判りやすい。資料1は、既往歴の中で有りの件数が比較的多いものについて、集計したものである。

5. 考察 [今後の課題]

調査項目が非常に多く、そのため各施設からの返送が遅れ、結果的にデータ収集が時間的に困難であった。そのため、今回の研究では幾つか大きな項目が積み残しとなっている。

その第1が、調査項目の妥当性の検討である。必要なものをほぼすべて網羅しているか否かは、疾患名などの自由形式の手書き部分の中に今回の調査目的に対してどれだけ重要な内容が書かれているかに依っている。ところで、自由形式で書かれた文章にはすべて整理番号がつけられ、整理番号と共にコンピュータ入力されている。入力の段階で内容が同じと判ったもの（例えば英語と日本語の表現）は、可能な限り同一の整理番号としている。しかし、同じ内容でも少し表現が異なり、ニュアンスの違いが有ると思われた場合には異なる整理番号となる。外国籍のレコードの7件も含めた全件(3374件)の中で使われている手書き文章は1288種類であった。表5は、手書き文章の書かれている場所毎の使用頻度である。表5の右端は、各場所毎に使用頻度順に並べ、上位3つが占める件数とそれを取り去った場合の残りの手書き文章の使用頻度である。この表から次のことが予測される。各場所毎によく現れる文章は、それぞれの場所毎にほぼ決まっており、その数も3種類ほどである。ところで、これらの文章の中には、設問項目と重複しているものもある。例えば、分娩時異常出血の原因の中で最も多いものは、「弛緩出血」の122件であるが、これはすでに分娩時の母体異常の質問項目の中に入っている。このように手書き文章の中から不必要な物を抜き去る作

表5. 自由形式での文章の種類の数と件数

箇所	文章の件数	種類数	使用頻度の上位3種類の占める件数と残りの平均使用頻度
[既往歴に関するもの]			
・妊娠合併症および分娩時異常			
その他の妊娠合併症の詳細	136	93	1.9 (1.30)
・他科疾患および妊娠偶発合併症			
その他の他科疾患の疾患名	127	95	1.9 (1.17)
・新生児の異常			
先天異常の疾患名	55	47	1.0 (1.02)
その他の異常の疾患名	26	23	6 (1.00)
[今回の妊娠中のエピソードに関して]			
・妊娠の経過に於けるエピソード			
流産以外の入院治療の理由	216	129	3.9 (1.40)
その他の妊娠合併症の疾患名	67	56	2.4 (1.13)
その他の妊娠偶発合併症名	139	89	2.6 (1.29)
[今回の分娩経過のエピソードに関して]			
・全般的情報			
その他の分娩胎位の内容	41	7	3.5 (1.50)
分娩時異常出血の原因	337	50	2.13 (2.64)
・分娩経過の異常			
その他の異常の疾患名	65	36	2.4 (1.24)
・分娩時の処置に関して			
陣痛誘発の理由	219	51	1.29 (1.88)
・分娩時の母体異常			
その他の母体異常の疾患名	42	32	6 (1.24)
・分娩時の胎児・胎児付属物の異常			
その他の胎盤異常の疾患名	53	23	1.8 (1.75)
臍帯の異常の有無とその疾患名	89	12	7.8 (1.22)
[今回の分娩後の状態]			
・新生児の経過・処置			
先天異常の種類	52	43	8 (1.10)
入院した場合の理由	163	70	5.6 (1.60)
新生児死亡の理由	8	7	4 (1.00)
その他の経過異常の疾患名	104	56	4.5 (1.11)
[医師による総合評価に関するもの]			
・分娩経過と子供の状態	2	2	
・長期的に見た母体の産後の健康状態	4	4	3 (1.00)

業が必要である。

第2として、評価方法の確立である。既往歴と今回の妊娠との間にはかなり強い相関があることが認められたが、既往歴で異常が無い場合でもハイリスク妊娠は起こる。個々のデータそのものにも不確定要素が含まれている。設問項目の多くは、有り・無し・不明の3者選択となっているが、有りとか無しにもレベルがあり、その内容が手書き文章となって現れている。これらの不確定要素を加味して、妊娠と分娩の経過を総合的に評価する方法についてはこれからの課題である。

山本 皓二

件 数	帝王切開の経験 : 有り 274					帝王切開の経験 : 無し 2977				
	入院の事情	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院
	5	163	39	67	(38.41)	23	2240	357	357	(24.17)
分娩週数 (修正後)	週数: 件数 (%)					週数: 件数 (%)				
	1 - 27:	6 (2.21)				1 - 27:	40 (1.35)			
	28:	2 (0.74)				28:	10 (0.34)			
	29:	(0.00)				29:	14 (0.47)			
	30:	3 (1.10)				30:	22 (0.74)			
	31:	1 (0.37)				31:	10 (0.34)			
	32:	3 (1.10)				32:	23 (0.77)			
	33:	4 (1.47)				33:	24 (0.81)			
	34:	5 (1.84)				34:	33 (1.11)			
	35:	3 (1.10)				35:	54 (1.82)			
	36:	14 (5.15)				36:	81 (2.73)			
	37:	50 (18.38)				37:	226 (7.61)			
	38:	89 (32.72)				38:	557 (18.75)			
	39:	60 (22.06)				39:	862 (29.02)			
	40:	19 (6.99)				40:	679 (22.86)			
	41:	13 (4.78)				41:	285 (9.60)			
	42:	(0.00)				42:	47 (1.58)			
	43:	(0.00)				43:	3 (0.10)			
	44:	(0.00)				44:	(0.00)			
分娩胎位	無 記 入	頭 位	骨 盤 位	そ の 他	骨盤位 その他 の割合	無 記 入	頭 位	骨 盤 位	そ の 他	骨盤位 その他 の割合
	5	227	18	24	(15.61)	8	2803	126	40	(5.59)
分娩時の異常出血の有無	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
	16	96	155	7	(38.25)	36	551	2357	33	(18.85)
出血量 1-3期合計	出血量: C/S以外 C/Sの場合 (ml): 件数 (%) 件数 (%)					出血量: C/S以外 C/Sの場合 (ml): 件数 (%) 件数 (%)				
	1- 99:	14 (23.3) 4 (2.3)				1- 99:	624 (24.1) 2 (0.8)			
	100-199:	16 (26.6) 8 (4.7)				100-199:	713 (27.5) 6 (2.4)			
	200-299:	10 (16.6) 20 (11.8)				200-299:	483 (18.6) 26 (10.7)			
	300-399:	6 (10.0) 15 (8.8)				300-399:	316 (12.2) 37 (15.2)			
	400-499:	3 (5.0) 20 (11.8)				400-499:	156 (6.0) 27 (11.1)			
	500-599:	4 (6.6) 17 (10.0)				500-599:	96 (3.7) 27 (11.1)			
	600-699:	(0.0) 14 (8.2)				600-699:	62 (2.4) 24 (9.8)			
	700-799:	5 (8.3) 15 (8.8)				700-799:	39 (1.5) 16 (6.5)			
	800-899:	2 (3.3) 19 (11.2)				800-899:	27 (1.0) 17 (7.0)			
	900-999:	(0.0) 3 (1.7)				900-999:	17 (0.6) 12 (4.9)			
	1000-1099:	(0.0) 6 (3.5)				1000-1099:	15 (0.5) 13 (5.3)			
	1100-1199:	(0.0) 4 (2.3)				1100-1199:	7 (0.2) 5 (2.0)			
	1200-1299:	(0.0) 3 (1.7)				1200-1299:	3 (0.1) 7 (2.8)			
	1300-1399:	(0.0) 3 (1.7)				1300-1399:	9 (0.3) 4 (1.6)			
	1400-1499:	(0.0) 2 (1.1)				1400-1499:	4 (0.1) 3 (1.2)			
	1500 - :	(0.0) 16 (9.4)				1500 - :	14 (0.5) 17 (7.0)			

	帝王切開の経験 : 有り				帝王切開の経験 : 無し			
[新生児所見]								
性別	不男	女	男性の割合	不男	女	男性の割合		
	3	150	121	(55.35)	8	1525	1444	(51.36)
体重	体重 (g) : 件数 (%)				体重 (g) : 件数 (%)			
	1 - 1499	: 15	(5.49)		1 - 1499	: 92	(3.09)	
	1500 - 1599	: 2	(0.73)		1500 - 1599	: 8	(0.27)	
	1600 - 1699	: (0.00)			1600 - 1699	: 11	(0.37)	
	1700 - 1799	: 2	(0.73)		1700 - 1799	: 10	(0.34)	
	1800 - 1899	: 4	(1.47)		1800 - 1899	: 20	(0.67)	
	1900 - 1999	: 1	(0.37)		1900 - 1999	: 17	(0.57)	
	2000 - 2099	: 2	(0.73)		2000 - 2099	: 20	(0.67)	
	2100 - 2199	: 1	(0.37)		2100 - 2199	: 21	(0.71)	
	2200 - 2299	: 6	(2.20)		2200 - 2299	: 38	(1.28)	
	2300 - 2399	: 12	(4.40)		2300 - 2399	: 59	(1.98)	
	2400 - 2499	: 6	(2.20)		2400 - 2499	: 82	(2.76)	
	2500 - 2599	: 13	(4.76)		2500 - 2599	: 124	(4.17)	
	2600 - 2699	: 11	(4.03)		2600 - 2699	: 143	(4.81)	
	2700 - 2799	: 17	(6.23)		2700 - 2799	: 216	(7.33)	
	2800 - 2899	: 17	(6.23)		2800 - 2899	: 247	(8.31)	
	2900 - 2999	: 27	(9.89)		2900 - 2999	: 246	(8.27)	
	3000 - 3099	: 24	(8.79)		3000 - 3099	: 272	(9.15)	
	3100 - 3199	: 19	(6.96)		3100 - 3199	: 275	(9.25)	
	3200 - 3299	: 24	(8.79)		3200 - 3299	: 263	(8.85)	
	3300 - 3399	: 23	(8.42)		3300 - 3399	: 220	(7.40)	
	3400 - 3499	: 11	(4.03)		3400 - 3499	: 163	(6.16)	
	3500 -	36	(13.19)		3500 -	404	(13.59)	
身長	身長 (cm) : 件数 (%)				身長 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 29	: (0.00)			1 - 29	: 11	(0.39)	
	30 - 34	: 2	(0.78)		30 - 34	: 12	(0.42)	
	35 - 39	: 5	(1.95)		35 - 39	: 32	(1.13)	
	40 - 44	: 14	(5.47)		40 - 44	: 97	(3.43)	
	45 - 49	: 141	(55.08)		45 - 49	: 1471	(52.09)	
	50 - 54	: 93	(36.33)		50 - 54	: 1182	(41.86)	
	55 - 59	: 1	(0.39)		55 - 59	: 16	(0.57)	
	60 -	(0.00)			60 -	3	(0.11)	
頭囲	頭囲 (cm) : 件数 (%)				頭囲 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 24	: 2	(0.81)		1 - 24	: 15	(0.54)	
	25 - 29	: 9	(3.64)		25 - 29	: 73	(2.64)	
	30 - 34	: 182	(73.68)		30 - 34	: 2265	(81.77)	
	35 - 39	: 54	(21.86)		35 - 39	: 414	(14.95)	
	40 - 44	: (0.00)			40 - 44	: (0.00)		
	45 - 49	: (0.00)			45 - 49	: 1	(0.04)	
	50 -	(0.00)			50 -	2	(0.07)	
アプガースコア	1分	5分			1分	5分		
	スコア: 件数 (%)	件数 (%)			スコア: 件数 (%)	件数 (%)		
	1 : 2 (0.7)	(0.0)			1 : 14 (0.4)	3 (0.1)		
	2 : 2 (0.7)	1 (0.4)			2 : 13 (0.4)	1 (0.0)		
	3 : 7 (2.6)	(0.0)			3 : 21 (0.7)	3 (0.1)		
	4 : 2 (0.7)	1 (0.4)			4 : 19 (0.6)	6 (0.2)		
	5 : 3 (1.1)	3 (1.3)			5 : 42 (1.4)	8 (0.3)		
	6 : 4 (1.5)	2 (0.9)			6 : 50 (1.7)	21 (0.9)		
	7 : 26 (9.7)	4 (1.8)			7 : 133 (4.5)	32 (1.4)		
	8 : 92 (34.4)	19 (8.6)			8 : 702 (24.0)	170 (7.4)		
	9 : 117 (43.8)	100 (45.2)			9 : 1713 (58.5)	1015 (44.4)		
	10 : 12 (4.4)	91 (41.1)			10 : 217 (7.4)	1023 (44.8)		

	帝王切開の経験 : 有り					帝王切開の経験 : 無し				
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
[分娩時所見]										
陣痛誘発	1	16	257		(5.86)	10	541	2417	9	(18.29)
陣痛促進	5	16	253		(5.95)	4	618	2343	12	(20.87)
吸引・鉗子分娩	4	17	253		(6.30)	3	292	2682		(9.82)
帝王切開(予定)	3	136	135		(50.18)	4	105	2867	1	(3.53)
(緊急)	2	76	195	1	(28.04)	2	250	2725		(8.40)
輸血	1	6	266	1	(2.21)	3	30	2943	1	(1.01)
[分娩時の異常]										
微弱陣痛	11	15	248		(5.70)	7	455	2507	8	(15.36)
分娩遷延・中止	11	12	251		(4.56)	7	191	2773	6	(6.44)
軟産道強靱	11	5	253	5	(1.94)	6	110	2849	12	(3.72)
CPD・狭骨盤	11	20	238	5	(7.75)	9	46	2915	7	(1.55)
前期破水	10	23	240	1	(8.75)	7	506	2457	7	(17.08)
その他の異常	14	21	238	1	(8.11)	36	133	2804	4	(4.53)
[分娩時の母体異常]										
3度以上の会陰裂傷	6		268		(0.00)	5	14	2957	1	(0.47)
弛緩出血	3	11	256	4	(4.12)	6	170	2791	10	(5.74)
分娩時ショック	3	2	269		(0.74)	4	7	2965	1	(0.24)
羊水塞栓	3		271		(0.00)	4		2972	1	(0.00)
静脈瘤	4	1	263	6	(0.38)	4	8	2890	75	(0.28)
肺塞栓症	3		271		(0.00)	4		2972	1	(0.00)
母体死亡	3		271		(0.00)	4	1	2972		(0.03)
その他の母体異常	4	14	256		(5.19)	18	82	2874	3	(2.77)
[分娩時の胎児・胎児付属物の異常]										
羊水混濁	2	28	235	9	(10.65)	2	388	2549	38	(13.21)
分娩時胎児仮死	2	38	231	3	(14.13)	5	355	2605	12	(11.99)
死亡	2	3	268	1	(1.11)	2	31	2942	2	(1.04)
前置胎盤	2	5	266	1	(1.85)	2	26	2946	3	(0.87)
胎盤早期剥離	2	4	266	2	(1.48)	5	27	2940	5	(0.91)
その他の胎盤異常	4	8	261	1	(2.97)	9	65	2901	2	(2.19)
臍帯の異常	6	10	257	1	(3.75)	17	211	2747	2	(7.13)
[新生児の経過・処置]										
けいれん	3	1	263	7	(0.38)	11	4	2925	37	(0.14)
* 先天異常	5	5	261		3(1.88)	17	76	2854	8	22(2.59)
気管内挿管	4	17	247	6	(6.44)	13	90	2820	54	(3.09)
入院	3	64	206	1	(23.70)	13	512	2443	9	(17.33)
N I C Uへの入院	3	33	238		(12.18)	16	250	2698	13	(8.48)
新生児死亡(28日未満)	2	1	246	25	(0.40)	14	13	2673	277	(0.48)
** 死亡時期	271		1	2	(0.00)	2945	11	8	13	(57.89)
その他の異常経過	3	18	245	8	(6.84)	15	183	2736	43	(6.27)

	帝王切開の経験 : 有り					帝王切開の経験 : 無し					
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	
【今回の妊娠経過】											
流早産の入院治療	1	41	229	3	(15.19)	13	454	2493	17	(15.41)	
流早産以外の入院		41	231	2	(15.07)	24	352	2586	15	(11.98)	
妊娠中毒症・軽症	1	23	249	1	(8.46)	9	236	2718	14	(7.99)	
・重傷	3	17	252	2	(6.32)	11	66	2863	17	(2.24)	
ヘマトクリット40%以上	1	5	240	28	(2.04)	26	34	2638	279	(1.27)	
妊娠中胎児仮死	5	20	243	6	(7.60)	37	88	2814	38	(3.03)	
子宮内胎児死亡	6	4	263	1	(1.50)	39	37	2895	6	(1.26)	
その他妊娠合併症	3	24	245	2	(8.92)	23	242	2646	66	(8.38)	
妊娠糖尿病	1	11	258	4	(4.09)	5	58	2866	28	(1.97)	
不規則性抗体陽性	1		179	94	(0.00)	56	24	1811	1066	(1.31)	
ヘモグロビン9g/dl以下	2	12	240	20	(4.76)	22	66	2675	214	(2.41)	
その他の妊娠偶発合併症		22	250	2	(8.09)	20	285	2648	24	(9.72)	
里帰り分娩		15	252	7	(5.62)	6	218	2702	51	(7.47)	
妊娠中の喫煙	1	8	177	88	(4.32)	4	93	1969	911	(4.51)	
*** 妊娠中の飲酒	3	2	28	129	112(6.67)	9	24	283	1370	1281(7.57)	
【出生前診断について】											
出生前診断の実施	2	29	235	8	(10.98)	4	157	2718	98	(5.46)	
染色体その他の異常の有無	8		225	41	(0.00)	85	15	2274	603	(0.66)	
【既往歴】											
回数	妊 娠	分 娩	自 然 流 産	早 期 産	後 期 産	回数	妊 娠	分 娩	自 然 流 産	早 期 産	後 期 産
1:	95	146	48	32	10	1:	947	1009	470	83	20
2:	74	74	11	3	1	2:	623	460	120	11	2
3:	50	11	5	1		3:	340	84	35	1	
4:	24	3		1		4:	132	17	8		
5:	9		3			5:	51	4	1		
6:	7					6:	18	1			
7:	1					7:	8	1	1		
8:	1					8:	3				
9:						9:	2				
10:	1		1			10:	1				
【既往の妊娠合併症および分娩時異常】											
無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
頸管無力症	2	5	264	3	(1.86)	5	38	2902	32	(1.29)	
妊娠中毒症	1	37	230	6	(13.86)	1	86	2876	14	(2.90)	
吸引・鉗子分娩	3	15	254	2	(5.58)	3	169	2799	6	(5.69)	
帝王切開		274			(100.00)		2977			(0.00)	
分娩時異常出血	2	36	206	28	(15.57)	4	89	2821	63	(3.06)	
前置胎盤	1	10	258	5	(3.73)	4	1	2858	14	(0.03)	
常位胎盤早期剥離	1	4	265	4	(1.49)	3	2	2959	13	(0.07)	
その他の異常	2	67	198	7	(25.28)	12	214	2711	40	(7.32)	
【他科の疾患および妊娠偶発合併症の既往】											
無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
腎炎	1	7	266		(2.56)	4	47	2920	6	(1.58)	
糖尿病	1	2	271		(0.73)	5	21	2946	5	(0.71)	
甲状腺疾患	1	5	268		(1.83)	5	47	2922	3	(1.58)	
本態性高血圧	2	4	268		(1.47)	5	24	2943	5	(0.81)	
子宮筋腫	1	13	260		(4.76)	5	61	2903	8	(2.06)	
不妊症	1	6	267		(2.20)	6	84	2863	4	(2.83)	
他他科疾患・偶発合併症	1	34	238	1	(12.50)	13	309	2648	7	(10.45)	
*** コントロールの状態	223	37	5	9	(88.10)	2508	337	47	85	(87.76)	

	帝王切開の経験：有り					帝王切開の経験：無し				
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
【新生児異常の既往】										
低体重児	3	61	205	5	(22.95)	26	194	2733	24	(6.63)
新生児死亡(生後1月以内)	3	13	257	1	(4.81)	26	30	2894	27	(1.03)
先天異常	4	12	251	7	(4.56)	31	78	2843	25	(2.67)
その他異常	5	10	253	6	(3.80)	84	51	2797	45	(1.79)
【総合的評価】										
【妊娠中の経過の総合的評価】	スコア：件数 (%)		件数 (%)			スコア：件数 (%)		件数 (%)		
順調であった		1	152 (55.68)				1	1696 (56.99)		
軽度の異常、治療は不要		2	36 (13.19)				2	341 (11.46)		
異常の為、生活制限と治療		3	27 (9.89)				3	343 (11.53)		
入院治療を要した		4	56 (20.51)				4	538 (18.08)		
妊娠中絶を要した		5	1 (0.37)				5	16 (0.54)		
その他		6	(0.00)				6	21 (0.71)		
不明		7	1 (0.37)				7	21 (0.71)		
【今回の分娩経過と子供の状態の評価】	スコア：件数 (%)		件数 (%)			スコア：件数 (%)		件数 (%)		
順調で問題無し		1	144 (52.75)				1	1843 (62.07)		
わずかな問題があった		2	72 (26.37)				2	704 (23.71)		
かなりの問題があった		3	42 (15.38)				3	305 (10.27)		
子供の健康にかなりの障害		4	5 (1.83)				4	24 (0.81)		
周産期死亡 重篤な結果		5	3 (1.10)				5	48 (1.62)		
その他		6	3 (1.10)				6	15 (0.51)		
不明		7	4 (1.47)				7	30 (1.01)		
【長期的に見た母体の産後の健康状態評価】	スコア：件数 (%)		件数 (%)			スコア：件数 (%)		件数 (%)		
妊娠前と変わらない		1	226 (83.09)				1	2623 (88.26)		
少し健康状態が悪化した		2	35 (12.87)				2	239 (8.04)		
かなり健康状態が悪化した		3	4 (1.47)				3	19 (0.64)		
重篤な健康障害が発生		4	1 (0.37)				4	(0.00)		
死亡した		5	(0.00)				5	1 (0.03)		
その他		6	2 (0.74)				6	7 (0.24)		
不明		7	4 (1.47)				7	83 (2.79)		

件 数	低出生体重児の経験 : 有り					低出生体重児の経験 : 無し				
	260					2957				
入院の事情	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療 入院 の割 合	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療 入院 の割 合
	4	134	64	58	(47.66)	24	2239	329	365	(23.66)
分娩週数 (修正後)	週数: 件数 (%)					週数: 件数 (%)				
	1 - 27:	7 (2.69)				1 - 27:	36 (1.22)			
		28: 3 (1.15)					28: 8 (0.27)			
		29: 6 (2.31)					29: 8 (0.27)			
		30: 8 (3.08)					30: 16 (0.54)			
		31: 4 (1.54)					31: 8 (0.27)			
		32: 10 (3.85)					32: 16 (0.54)			
		33: 9 (3.46)					33: 19 (0.64)			
		34: 13 (5.00)					34: 24 (0.81)			
		35: 10 (3.85)					35: 46 (1.56)			
		36: 22 (8.46)					36: 73 (2.48)			
		37: 31 (11.92)					37: 245 (8.31)			
		38: 59 (22.69)					38: 586 (19.95)			
		39: 44 (16.92)					39: 864 (29.31)			
		40: 30 (11.54)					40: 656 (22.32)			
		41: 2 (0.77)					41: 291 (9.87)			
		42: 1 (0.38)					42: 46 (1.56)			
		43: 1 (0.38)					43: 2 (0.07)			
		44: (0.00)					44: (0.00)			
分娩胎位	無 記 入	頭 位	骨 盤 位	そ の 他	骨盤位 その他 の割 合	無 記 入	頭 位	骨 盤 位	そ の 他	骨盤位 その他 の割 合
		221	25	14	(15.00)	12	2779	116	50	(5.64)
分娩時の異常出血の有無	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
	7	40	211	2	(15.94)	42	607	2271	37	(21.09)
出血量 1-3期合計	出血量: C/S以外 C/Sの場合					出血量: C/S以外 C/Sの場合				
	(ml):	件数 (%)	件数 (%)			(ml):	件数 (%)	件数 (%)		
	1- 99:	49 (28.1)	1 (1.8)			1- 99:	577 (23.6)	5 (1.4)		
	100- 199:	51 (29.3)	1 (1.8)			100- 199:	666 (27.2)	13 (3.6)		
	200- 299:	36 (20.6)	5 (9.4)			200- 299:	456 (18.6)	41 (11.4)		
	300- 399:	20 (11.4)	11 (20.7)			300- 399:	297 (12.1)	41 (11.4)		
	400- 499:	6 (3.4)	8 (15.0)			400- 499:	153 (6.2)	38 (10.6)		
	500- 599:	6 (3.4)	4 (7.5)			500- 599:	96 (3.9)	40 (11.1)		
	600- 699:	2 (1.1)	4 (7.5)			600- 699:	59 (2.4)	34 (9.5)		
	700- 799:	1 (0.5)	6 (11.3)			700- 799:	43 (1.7)	25 (6.9)		
	800- 899:	1 (0.5)	5 (9.4)			800- 899:	28 (1.1)	32 (8.9)		
	900- 999:	2 (1.1)	1 (1.8)			900- 999:	15 (0.6)	14 (3.9)		
	1000-1099:	(0.0)	1 (1.8)			1000-1099:	14 (0.5)	18 (5.0)		
	1100-1199:	(0.0)	1 (1.8)			1100-1199:	7 (0.2)	8 (2.2)		
	1200-1299:	(0.0)	1 (1.8)			1200-1299:	3 (0.1)	9 (2.5)		
	1300-1399:	(0.0)	1 (1.8)			1300-1399:	9 (0.3)	6 (1.6)		
	1400-1499:	(0.0)	(0.0)			1400-1499:	4 (0.1)	5 (1.4)		
	1500 - :	(0.0)	3 (5.6)			1500 - :	14 (0.5)	29 (8.1)		

	低出生体重児の経験 : 有り				低出生体重児の経験 : 無し			
[新生児所見]								
性別	不 明	男 性	女 性	男性の 割合	不 明	男 性	女 性	男性の 割合
	135	125		(51.92)	11	1516	1430	(51.46)
体重	体重 (g) : 件数 (%)				体重 (g) : 件数 (%)			
	1 - 1499 :	32	(12.31)		1 - 1499 :	70	(2.37)	
	1500 - 1599 :	3	(1.15)		1500 - 1599 :	7	(0.24)	
	1600 - 1699 :	5	(1.92)		1600 - 1699 :	6	(0.20)	
	1700 - 1799 :	5	(1.92)		1700 - 1799 :	8	(0.27)	
	1800 - 1899 :	9	(3.46)		1800 - 1899 :	15	(0.51)	
	1900 - 1999 :	7	(2.69)		1900 - 1999 :	12	(0.41)	
	2000 - 2099 :	10	(3.85)		2000 - 2099 :	13	(0.44)	
	2100 - 2199 :	7	(2.69)		2100 - 2199 :	15	(0.51)	
	2200 - 2299 :	17	(6.54)		2200 - 2299 :	28	(0.95)	
	2300 - 2399 :	25	(9.62)		2300 - 2399 :	46	(1.56)	
	2400 - 2499 :	20	(7.69)		2400 - 2499 :	67	(2.27)	
	2500 - 2599 :	10	(3.85)		2500 - 2599 :	127	(4.30)	
	2600 - 2699 :	11	(4.23)		2600 - 2699 :	141	(4.78)	
	2700 - 2799 :	13	(5.00)		2700 - 2799 :	216	(7.32)	
	2800 - 2899 :	14	(5.38)		2800 - 2899 :	243	(8.23)	
	2900 - 2999 :	20	(7.69)		2900 - 2999 :	255	(8.64)	
	3000 - 3099 :	12	(4.62)		3000 - 3099 :	261	(9.52)	
	3100 - 3199 :	5	(1.82)		3100 - 3199 :	290	(9.82)	
	3200 - 3299 :	13	(5.00)		3200 - 3299 :	270	(9.15)	
	3300 - 3399 :	6	(2.31)		3300 - 3399 :	232	(7.86)	
	3400 - 3499 :	6	(2.31)		3400 - 3499 :	166	(6.30)	
	3500 -	10	(3.85)		3500 -	424	(14.36)	
身長	身長 (cm) : 件数 (%)				身長 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 29 :		(0.00)		1 - 29 :	11	(0.39)	
	30 - 34 :	4	(1.81)		30 - 34 :	9	(0.32)	
	35 - 39 :	8	(3.62)		35 - 39 :	26	(0.92)	
	40 - 44 :	28	(12.67)		40 - 44 :	83	(2.94)	
	45 - 49 :	142	(64.25)		45 - 49 :	1464	(51.84)	
	50 - 54 :	39	(17.65)		50 - 54 :	1211	(42.88)	
	55 - 59 :		(0.00)		55 - 59 :	17	(0.60)	
	60 -		(0.00)		60 -	3	(0.11)	
頭圍	頭圍 (cm) : 件数 (%)				頭圍 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 24 :	3	(1.41)		1 - 24 :	13	(0.47)	
	25 - 29 :	24	(11.27)		25 - 29 :	56	(2.02)	
	30 - 34 :	170	(79.81)		30 - 34 :	2246	(81.11)	
	35 - 39 :	15	(7.04)		35 - 39 :	452	(16.32)	
	40 - 44 :		(0.00)		40 - 44 :		(0.00)	
	45 - 49 :		(0.00)		45 - 49 :	1	(0.04)	
	50 -	1	(0.47)		50 -	1	(0.04)	
アプガースコア	1分	5分			1分	5分		
	スコア : 件数 (%)	件数 (%)			スコア : 件数 (%)	件数 (%)		
	1 : 5 (1.9)	1 (0.4)			1 : 11 (0.3)	2 (0.0)		
	2 : 1 (0.4)	(0.0)			2 : 14 (0.4)	2 (0.0)		
	3 : 5 (1.9)	(0.0)			3 : 23 (0.7)	3 (0.1)		
	4 : 2 (0.8)	(0.0)			4 : 19 (0.6)	7 (0.3)		
	5 : 13 (5.1)	2 (0.9)			5 : 33 (1.1)	9 (0.4)		
	6 : 9 (3.5)	3 (1.4)			6 : 46 (1.5)	20 (0.8)		
	7 : 25 (9.9)	10 (4.6)			7 : 136 (4.6)	27 (1.1)		
	8 : 63 (25.1)	23 (10.7)			8 : 724 (24.8)	166 (7.3)		
	9 : 113 (45.0)	97 (45.1)			9 : 1695 (58.2)	1021 (44.9)		
	10 : 15 (5.9)	79 (36.7)			10 : 208 (7.1)	1014 (44.6)		

	低出生体重児の経験 : 有り					低出生体重児の経験 : 無し				
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
[分娩時所見]										
陣痛誘発	2	36	221	1	(14.01)	9	517	2423	8	(17.59)
陣痛促進	3	39	218		(15.18)	6	590	2349	12	(20.07)
吸引・鉗子分娩	2	8	250		(3.10)	5	299	2653		(10.13)
帝王切開(予定)	1	22	237		(8.49)	6	220	2730	1	(7.46)
(緊急)		56	204		(21.54)	4	266	2686	1	(9.01)
輸血	1	4	255		(1.54)	3	31	2921	2	(1.05)
[分娩時の異常]										
微弱陣痛	2	28	229	1	(10.89)	15	441	2494	7	(15.03)
分娩遅延・中止	2	7	251		(2.71)	15	194	2742	6	(6.61)
軟産道強靱	2	6	252		(2.33)	14	108	2819	16	(3.69)
CPD・狭骨盤	2		257	1	(0.00)	17	64	2865	11	(2.19)
前期破水	2	40	218		(15.50)	14	486	2449	8	(16.56)
その他の異常	6	11	242	1	(4.35)	43	146	2764	4	(5.02)
[分娩時の母体異常]										
3度以上の会陰裂傷	2		258		(0.00)	9	14	2933	1	(0.48)
弛緩出血		9	250	1	(3.47)	9	171	2764	13	(5.83)
分娩時ショック			260		(0.00)	7	9	2940	1	(0.31)
羊水塞栓			260		(0.00)	7		2949	1	(0.00)
静脈瘤	1		257	2	(0.00)	7	9	2873	68	(0.31)
肺塞栓症			260		(0.00)	7		2949	1	(0.00)
母体死亡		1	259		(0.38)	7		2950		(0.00)
その他の母体異常	1	10	249		(3.66)	20	85	2849	3	(2.90)
[分娩時の胎児・胎児付属物の異常]										
羊水混濁		30	223	7	(11.86)	3	381	2532	41	(13.08)
分娩時胎児仮死		44	212	4	(17.19)	6	350	2592	9	(11.90)
死亡		3	256	1	(1.16)	3	29	2923	2	(0.98)
前置胎盤		4	255	1	(1.54)	3	27	2924	3	(0.91)
胎盤早期剥離		8	251	1	(3.09)	6	23	2922	6	(0.78)
その他の胎盤異常	1	7	251	1	(2.71)	11	66	2878	2	(2.24)
臍帯の異常	3	17	239	1	(6.64)	19	189	2737	2	(6.76)
[新生児の経過・処置]										
けいれん	1	1	246	10	(0.40)	11	4	2909	33	(0.14)
* 先天異常	4	8	244	1	3(3.17)	16	71	2841	7	22(2.44)
気管内挿管	2	27	224	7	(10.76)	13	81	2810	53	(2.80)
入院	2	91	167		(35.27)	12	483	2452	10	(16.46)
NICUへの入院	1	76	163		(29.34)	16	203	2725	13	(6.93)
新生児死亡(28日未満)	1	4	228	27	(1.72)	13	10	2661	273	(0.37)
** 死亡時期	253	4		3	(100.00)	2930	7	9	11	(43.75)
その他の異常経過	3	23	226	8	(9.24)	13	176	2728	40	(6.06)

	低出生体重児の経験 : 有り					低出生体重児の経験 : 無し						
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
【今回の妊娠経過】												
流早産の入院治療	1	65	194		(25.10)	14	424	2500	19	(14.50)		
流早産以外の入院	4	45	211		(17.58)	19	348	2574	16	(11.91)		
妊娠中毒症・軽症	2	25	231	2	(9.77)	9	233	2703	12	(7.94)		
・重傷	1	24	233	2	(9.34)	13	60	2669	15	(2.05)		
ヘマトクリット40%以上	2	3	235	20	(1.26)	25	33	2613	286	(1.25)		
妊娠中胎児仮死	2	21	234	3	(8.24)	41	87	2790	39	(3.02)		
子宮内胎児死亡	3	5	252		(1.95)	43	33	2874	7	(1.14)		
その他妊娠合併症	1	28	229	2	(10.89)	24	235	2636	62	(8.19)		
妊娠糖尿病	1	4	253	2	(1.56)	5	65	2858	29	(2.22)		
不規則性抗体陽性	5	2	171	82	(1.16)	51	21	1795	1090	(1.16)		
ヘモグロビン9g/dl以下	3	9	228	20	(3.80)	23	66	2655	213	(2.43)		
その他の妊娠偶発合併症		21	236	3	(8.17)	20	271	2644	22	(9.30)		
里帰り分娩		10	240	10	(4.00)		6	223	2681	47	(7.68)	
妊娠中の喫煙		11	182	67	(5.70)		4	88	1934	931	(4.35)	
*** 妊娠中の飲酒		2	18	142	98(10.00)		11	24	304	1331	1287(7.32)	
【出生前診断について】												
出生前診断の実施		25	223	12	(10.08)		6	152	2704	95	(5.32)	
染色体その他の異常の有無	4	3	216	37	(1.37)	84	12	2252	609	(0.53)		
【既往歴】												
	回	妊 娠	分 娩	自 然 流 産	早 期 産 後 期 産 後 期 産 後 期 産 後 期 産		回	妊 娠	分 娩	自 然 流 産	早 期 産 後 期 産 後 期 産 後 期 産	
	数						数					
	1:	79	103	57	63	12	1:	954	1034	453	49	16
	2:	72	64	10	11	2	2:	612	462	115	3	1
	3:	49	11	2	1		3:	332	81	37	1	
	4:	22	2	1	1		4:	132	17	7		
	5:	7					5:	51	4	4		
	6:	5	1				6:	19				
	7:	1					7:	7	1			
	8:	1					8:	3				
	9:						9:	2				
	10:						10:	2		1		
【既往の妊娠合併症および分娩時異常】												
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	
頸管無力症	8	17	230	5	(6.88)	19	25	2890	23	(0.86)		
妊娠中毒症	5	39	212	4	(15.54)	17	84	2841	15	(2.87)		
吸引・鉗子分娩	6	11	243		(4.33)	21	171	2758	7	(5.84)		
帝王切開	5	61	194		(23.92)	18	205	2733	1	(6.98)		
分娩時異常出血	6	13	229	12	(5.37)	21	113	2758	65	(3.94)		
前置胎盤	6	3	249	2	(1.19)	20	7	2915	15	(0.24)		
常位胎盤早期剥離	6	2	250	2	(0.79)	19	3	2922	13	(0.10)		
その他の異常	7	41	206	6	(16.60)	28	231	2665	33	(7.98)		
【他科の疾患および妊娠偶発合併症の既往】												
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	
腎炎	1	4	254	1	(1.55)	7	49	2897	4	(1.66)		
糖尿病	1		258	1	(0.00)	8	21	2925	3	(0.71)		
甲状腺疾患	1	3	255	1	(1.16)	8	47	2901	1	(1.59)		
本態性高血圧	1	6	252	1	(2.33)	9	22	2923	3	(0.75)		
子宮筋腫	1	5	253	1	(1.94)	9	69	2873	6	(2.35)		
不妊症	2	3	254	1	(1.17)	9	85	2861	2	(2.89)		
他の他科疾患・偶発合併症	1	32	226	1	(12.40)	14	305	2633	5	(10.38)		
*** コントロールの状態	219	26	5	10	(83.87)	2488	343	47	79	(87.95)		

	低出生体重児の経験 : 有り					低出生体重児の経験 : 無し				
[新生児異常の既往]	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
低体重児		260			(100.00)		2857			(0.00)
新生児死亡 (生後1月以内)	1	27	225	7	(10.71)	1	15	2832	9	(0.51)
先天異常	4	23	219	8	(11.69)	6	58	2872	21	(1.96)
その他異常	4	10	233	13	(4.12)	62	49	2809	37	(1.71)
[総合的評価]										
[妊娠中の経過の総合的評価]	スコア: 件数 (%)				件数 (%)	スコア: 件数 (%)				件数 (%)
順調であった	1 :				92 (35.52)	1 :				1746 (59.07)
軽度の異常、治療は不要	2 :				29 (11.20)	2 :				332 (11.23)
異常の為、生活制限と治療	3 :				37 (14.29)	3 :				327 (11.06)
入院治療を要した	4 :				92 (35.52)	4 :				502 (16.98)
妊娠中絶を要した	5 :				4 (1.54)	5 :				12 (0.41)
その他	6 :				4 (1.54)	6 :				17 (0.58)
不明	7 :				1 (0.39)	7 :				20 (0.68)
[今回の分娩経過と子供の状態の評価]										
	スコア: 件数 (%)				件数 (%)	スコア: 件数 (%)				件数 (%)
順調で問題無し	1 :				101 (39.00)	1 :				1868 (63.34)
わずかな問題があった	2 :				76 (29.34)	2 :				693 (23.50)
かなりの問題があった	3 :				58 (22.39)	3 :				284 (9.63)
子供の健康にかなりの障害	4 :				7 (2.70)	4 :				22 (0.75)
周産期死亡 重篤な結果	5 :				9 (3.47)	5 :				40 (1.36)
その他	6 :				1 (0.39)	6 :				17 (0.58)
不明	7 :				7 (2.70)	7 :				25 (0.85)
[長期的に見た母体の産後の健康状態評価]										
	スコア: 件数 (%)				件数 (%)	スコア: 件数 (%)				件数 (%)
妊娠前と変わらない	1 :				206 (79.54)	1 :				2618 (88.72)
少し健康状態が悪化した	2 :				37 (14.29)	2 :				230 (7.79)
かなり健康状態が悪化した	3 :				4 (1.54)	3 :				19 (0.64)
重篤な健康障害が発生	4 :				(0.00)	4 :				1 (0.03)
死亡した	5 :				1 (0.39)	5 :				(0.00)
その他	6 :				2 (0.77)	6 :				7 (0.24)
不明	7 :				9 (3.47)	7 :				76 (2.58)

件 数	吸引・鉗子分娩の経験 : 有り					吸引・鉗子分娩の経験 : 無し				
	184					3055				
入院の事情	無 記 入	通 常 入	緊 急 入	治 療 入	緊急・ 治療入 院の割 合	無 記 入	通 常 入	緊 急 入	治 療 入	緊急・ 治療入 院の割 合
	1	127	22	34	(30.60)	27	2267	374	387	(25.13)
分娩週数 (修正後)	週数 : 件数 (%)					週数 : 件数 (%)				
	1 - 27 :	3 (1.64)				1 - 27 :	43 (1.41)			
		28 : 1 (0.55)					28 : 11 (0.36)			
		29 : (0.00)					29 : 14 (0.46)			
		30 : 1 (0.55)					30 : 23 (0.75)			
		31 : (0.00)					31 : 11 (0.36)			
		32 : 1 (0.55)					32 : 25 (0.82)			
		33 : (0.00)					33 : 28 (0.92)			
		34 : 3 (1.64)					34 : 35 (1.15)			
		35 : 5 (2.73)					35 : 52 (1.71)			
		36 : 3 (1.64)					36 : 90 (2.95)			
		37 : 20 (10.93)					37 : 256 (8.40)			
		38 : 33 (18.03)					38 : 609 (19.99)			
		39 : 49 (26.78)					39 : 869 (28.52)			
		40 : 34 (18.58)					40 : 663 (21.76)			
		41 : 28 (15.30)					41 : 270 (8.86)			
		42 : 1 (0.55)					42 : 46 (1.51)			
		43 : 1 (0.55)					43 : 2 (0.07)			
		44 : (0.00)					44 : (0.00)			
分娩胎位	無 記 入	頭 位 入	骨 盤 位	そ の 他	骨盤位 その他 の割合	無 記 入	頭 位 入	骨 盤 位	そ の 他	骨盤位 その他 の割合
		178	5	1	(3.26)	13	2841	139	62	(6.61)
分娩時の異常出血の有無	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
	1	45	136	2	(24.86)	51	600	2366	38	(20.23)
出血量 1-3期合計	出血量 : C/S以外 C/Sの場合					出血量 : C/S以外 C/Sの場合				
	(ml) : 件数 (%) 件数 (%)					(ml) : 件数 (%) 件数 (%)				
	1- 99:	31 (19.2) (0.0)				1- 99:	606 (24.4) 6 (1.5)			
	100- 199:	37 (22.9) 1 (5.2)				100- 199:	689 (27.8) 13 (3.3)			
	200- 299:	31 (19.2) 1 (5.2)				200- 299:	461 (18.6) 44 (11.3)			
	300- 399:	24 (14.9) 2 (10.5)				300- 399:	298 (12.0) 50 (12.8)			
	400- 499:	15 (9.3) (0.0)				400- 499:	143 (5.7) 46 (11.8)			
	500- 599:	11 (6.8) 2 (10.5)				500- 599:	89 (3.5) 41 (10.5)			
	600- 699:	4 (2.4) 1 (5.2)				600- 699:	58 (2.3) 37 (9.5)			
	700- 799:	3 (1.8) 1 (5.2)				700- 799:	41 (1.6) 30 (7.7)			
	800- 899:	1 (0.6) 2 (10.5)				800- 899:	28 (1.1) 34 (8.7)			
	900- 999:	2 (1.2) 1 (5.2)				900- 999:	15 (0.6) 14 (3.6)			
	1000-1099:	1 (0.6) 1 (5.2)				1000-1099:	14 (0.5) 18 (4.6)			
	1100-1199:	(0.0) 1 (5.2)				1100-1199:	7 (0.2) 8 (2.0)			
	1200-1299:	(0.0) 1 (5.2)				1200-1299:	3 (0.1) 8 (2.0)			
	1300-1399:	1 (0.6) 1 (5.2)				1300-1399:	8 (0.3) 6 (1.5)			
	1400-1499:	(0.0) (0.0)				1400-1499:	4 (0.1) 5 (1.2)			
	1500 - :	(0.0) 4 (21.0)				1500 - :	14 (0.5) 28 (7.2)			

	吸引・鉗子分娩の経験 : 有り			吸引・鉗子分娩の経験 : 無し		
[新生児所見]						
性別	不 明	男 性	女 性	男性の 割合	不 明	男 性
	87	97		(47.28)	11	1582 1462
				男性の 割合	(51.97)	
体重	体重 (g) : 件数 (%)			体重 (g) : 件数 (%)		
	1 - 1499 :	4	(2.17)	1 - 1499 :	102	(3.34)
	1500 - 1599 :		(0.00)	1500 - 1599 :	10	(0.33)
	1600 - 1699 :		(0.00)	1600 - 1699 :	11	(0.36)
	1700 - 1799 :		(0.00)	1700 - 1799 :	12	(0.39)
	1800 - 1899 :	3	(1.63)	1800 - 1899 :	21	(0.69)
	1900 - 1999 :	1	(0.54)	1900 - 1999 :	17	(0.56)
	2000 - 2099 :	2	(1.09)	2000 - 2099 :	20	(0.66)
	2100 - 2199 :	1	(0.54)	2100 - 2199 :	21	(0.69)
	2200 - 2299 :	2	(1.09)	2200 - 2299 :	41	(1.34)
	2300 - 2399 :	3	(1.63)	2300 - 2399 :	68	(2.23)
	2400 - 2499 :	2	(1.09)	2400 - 2499 :	86	(2.82)
	2500 - 2599 :	4	(2.17)	2500 - 2599 :	133	(4.36)
	2600 - 2699 :	8	(4.35)	2600 - 2699 :	144	(4.72)
	2700 - 2799 :	5	(2.72)	2700 - 2799 :	229	(7.51)
	2800 - 2899 :	15	(8.15)	2800 - 2899 :	248	(8.13)
	2900 - 2999 :	14	(7.61)	2900 - 2999 :	257	(8.43)
	3000 - 3099 :	24	(13.04)	3000 - 3099 :	272	(8.92)
	3100 - 3199 :	15	(8.15)	3100 - 3199 :	278	(9.11)
	3200 - 3299 :	9	(4.89)	3200 - 3299 :	278	(9.11)
	3300 - 3399 :	22	(11.96)	3300 - 3399 :	219	(7.18)
	3400 - 3499 :	10	(5.43)	3400 - 3499 :	163	(6.00)
	3500 -	40	(21.74)	3500 -	400	(13.11)
身長	身長 (cm) : 件数 (%)			身長 (cm) : 件数 (%)		
	1 - 29 :		(0.00)	1 - 29 :	11	(0.38)
	30 - 34 :		(0.00)	30 - 34 :	14	(0.48)
	35 - 39 :	2	(1.14)	35 - 39 :	34	(1.18)
	40 - 44 :	2	(1.14)	40 - 44 :	109	(3.77)
	45 - 49 :	85	(48.30)	45 - 49 :	1518	(52.49)
	50 - 54 :	85	(48.30)	50 - 54 :	1188	(41.08)
	55 - 59 :	2	(1.14)	55 - 59 :	15	(0.52)
	60 -		(0.00)	60 -	3	(0.10)
頭圍	頭圍 (cm) : 件数 (%)			頭圍 (cm) : 件数 (%)		
	1 - 24 :		(0.00)	1 - 24 :	17	(0.60)
	25 - 29 :	2	(1.21)	25 - 29 :	79	(2.78)
	30 - 34 :	133	(80.61)	30 - 34 :	2304	(81.13)
	35 - 39 :	30	(18.18)	35 - 39 :	437	(15.39)
	40 - 44 :		(0.00)	40 - 44 :		(0.00)
	45 - 49 :		(0.00)	45 - 49 :	1	(0.04)
	50 -		(0.00)	50 -	2	(0.07)
アプガースコア	1分	5分		1分	5分	
	スコア: 件数 (%)	件数 (%)		スコア: 件数 (%)	件数 (%)	
	1 : 1 (0.5)	(0.0)		1 : 15 (0.5)	3 (0.1)	
	2 : 2 (1.1)	(0.0)		2 : 13 (0.4)	2 (0.0)	
	3 : (0.0)	(0.0)		3 : 28 (0.9)	3 (0.1)	
	4 : 1 (0.5)	(0.0)		4 : 20 (0.6)	7 (0.3)	
	5 : 2 (1.1)	2 (1.3)		5 : 43 (1.4)	9 (0.3)	
	6 : 4 (2.2)	(0.0)		6 : 49 (1.6)	22 (0.9)	
	7 : 11 (6.0)	3 (1.9)		7 : 146 (4.8)	33 (1.4)	
	8 : 58 (32.0)	17 (11.1)		8 : 733 (24.4)	172 (7.3)	
	9 : 91 (50.2)	73 (48.0)		9 : 1734 (57.8)	1038 (44.4)	
	10 : 11 (6.0)	57 (37.5)		10 : 217 (7.2)	1049 (44.8)	

	吸引・鉗子分娩の経験：有り					吸引・鉗子分娩の経験：無し				
[分娩時所見]	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
陣痛誘発		37	147		(20.11)	11	521	2514	9	(17.17)
陣痛促進		36	148		(19.57)	9	597	2437	12	(19.68)
吸引・鉗子分娩		39	145		(21.20)	7	269	2779		(8.83)
帝王切開(予定)		9	175		(4.89)	7	227	2820	1	(7.45)
(緊急)		12	172		(6.52)	4	313	2737	1	(10.26)
輸血		1	183		(0.54)	4	35	3014	2	(1.15)
[分娩時の異常]	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
微弱陣痛	1	28	155		(15.30)	17	442	2588	8	(14.59)
分娩遅延・中止		15	169		(8.15)	18	186	2843	6	(6.20)
軟産道強硬		5	179		(2.72)	17	110	2911	17	(3.64)
CPD・狭骨盤		2	180	2	(1.10)	20	64	2961	10	(2.12)
前期破水		22	161	1	(12.02)	17	507	2524	7	(16.73)
その他の異常	1	13	170		(7.10)	49	141	2860	5	(4.70)
[分娩時の母体異常]	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
3度以上の会陰裂傷			184		(0.00)	11	14	3029	1	(0.46)
弛緩出血	12	171		1	(6.56)	9	170	2863	13	(5.61)
分娩時ショック		1	183		(0.54)	7	8	3039	1	(0.26)
羊水塞栓			184		(0.00)	7		3047	1	(0.00)
静脈瘤	1	179		4	(0.56)	8	8	2962	77	(0.27)
肺塞栓症			184		(0.00)	7		3047	1	(0.00)
母体死亡			184		(0.00)	7	1	3047		(0.03)
その他の母体異常	8	176			(4.35)	21	87	2944	3	(2.87)
[分娩時の胎児・胎児付属物の異常]	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
羊水混濁		27	155	2	(14.84)	4	388	2620	43	(12.90)
分娩時胎児仮死		31	153		(16.85)	7	360	2674	14	(11.87)
死亡			184		(0.00)	4	34	3015	2	(1.12)
前置胎盤		2	182		(1.09)	4	29	3019	3	(0.95)
胎盤早期剥離		2	182		(1.09)	7	29	3013	6	(0.95)
その他の胎盤異常		5	179		(2.72)	13	68	2972	2	(2.24)
臍帯の異常	2	19	163		(10.44)	20	202	2831	2	(6.66)
[新生児の経過・処置]	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
けいれん			181	3	(0.00)	14	5	2995	41	(0.17)
* 先天異常		3	179		2(1.65)	22	78	2925	8	22(2.60)
気管内挿管		7	168	9	(4.00)	17	100	2889	49	(3.35)
入院		41	143		(22.28)	16	532	2497	10	(17.56)
NICUへの入院	1	12	171		(6.56)	18	269	2755	13	(8.90)
新生児死亡(28日未満)			166	18	(0.00)	16	14	2742	283	(0.51)
** 死亡時期	181		1	2	(0.00)	3023	11	8	13	(57.89)
その他の異常経過		13	167	4	(7.22)	18	189	2802	46	(6.32)

【今回の妊娠経過】	吸引・鉗子分娩の経験 : 有り					吸引・鉗子分娩の経験 : 無し						
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
流早産の入院治療	1	24	159		(13.11)	13	469	2554	19	(15.51)		
流早産以外の入院	2	31	151		(17.03)	22	360	2656	17	(11.94)		
妊娠中毒症・軽症		24	160		(13.04)	10	235	2795	15	(7.76)		
・重傷		4	180		(2.17)	14	77	2945	19	(2.55)		
ヘマトクリット40%以上	1	1	170	12	(0.58)	25	38	2698	294	(1.39)		
妊娠中胎児仮死	3	9	171	1	(5.00)	39	99	2874	43	(3.33)		
子宮内胎児死亡	3		180	1	(0.00)	42	41	2966	6	(1.36)		
その他妊娠合併症		15	168	1	(8.20)	26	250	2712	67	(8.44)		
妊娠糖尿病	1	9	173	1	(4.95)	5	60	2959	31	(1.99)		
不規則性抗体陽性	1	2	127	54	(1.55)	56	21	1852	1126	(1.12)		
ヘモグロビン9g/dl以下		2	171	11	(1.16)	24	75	2733	223	(2.67)		
その他の妊娠偶発合併症	1	22	161		(12.02)	19	285	2725	26	(9.47)		
里帰り分娩		20	162	2	(10.99)	6	213	2781	55	(7.11)		
妊娠中の喫煙		10	122	52	(7.58)	5	91	2017	942	(4.32)		
*** 妊娠中の飲酒		2	28	90	64(6.67)	12	24	291	1406	1322(7.62)		
【出生前診断について】												
出生前診断の実施		8	171	5	(4.47)	6	175	2773	101	(5.94)		
染色体その他の異常の有無	3		138	43	(0.00)	90	15	2349	601	(0.63)		
【既往歴】												
	回	妊	分	自	早	後	回	妊	分	自	早	後
	数	娠	娩	然	期	期	数	娠	娩	然	期	期
				流	産	死				流	産	死
				産	産	産				産	産	産
	1:	60	96	34	8		1:	978	1055	482	107	27
	2:	64	61	6			2:	630	471	125	14	3
	3:	31	8				3:	359	85	40	2	
	4:	14	4				4:	141	15	8	1	
	5:	4					5:	55	4	4		
	6:	1					6:	23	1			
	7:						7:	8	1	1		
	8:	1					8:	3				
	9:						9:	2				
	10:						10:	2		1		
【既往の妊娠合併症および分娩時異常】												
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
頸管無力症	1	2	175	6	(1.13)	2	41	2985	27	(1.35)		
妊娠中毒症		14	167	3	(7.73)	1	107	2933	14	(3.52)		
吸引・鉗子分娩		184			(100.00)		3055			(0.00)		
帝王切開		15	169		(8.15)	1	254	2799	1	(8.32)		
分娩時異常出血	1	17	151	15	(10.12)	2	111	2872	70	(3.72)		
前置胎盤	1		179	4	(0.00)	1	11	3033	10	(0.36)		
常位胎盤早期剥離	1		179	4	(0.00)		6	3041	8	(0.20)		
その他の異常		40	134	10	(22.99)	13	238	2771	33	(7.91)		
【他科の疾患および妊娠偶発合併症の既往】												
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
腎炎		7	177		(3.80)	5	45	2989	6	(1.48)		
糖尿病		2	182		(1.09)	6	21	3023	5	(0.69)		
甲状腺疾患		2	182		(1.09)	6	50	2996	3	(1.64)		
本態性高血圧		2	182		(1.09)	7	25	3018	5	(0.82)		
子宮筋腫		3	181		(1.63)	6	69	2972	8	(2.27)		
不妊症		2	182		(1.09)	7	88	2956	4	(2.89)		
他の他科疾患・偶発合併症		23	161		(12.50)	14	318	2715	8	(10.48)		
*** コントロールの状態	148	26	6	4	(81.25)	2575	345	45	90	(88.46)		

	吸引・鉗子分娩の経験：有り					吸引・鉗子分娩の経験：無し				
[新生児異常の既往]	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
低体重児・・・・・・・・・・	1	11	171	1	(6.04)	28	243	2758	26	(8.10)
新生児死亡(生後1月以内)	1	5	177	1	(2.75)	28	38	2965	24	(1.27)
先天異常・・・・・・・・・・	1	5	176	2	(2.76)	34	85	2907	29	(2.84)
その他異常・・・・・・・・・・	6	6	167	5	(3.47)	83	55	2871	46	(1.88)
[総合的評価]										
[妊娠中の経過の総合的評価]	スコア：件数 (%)					スコア：件数 (%)				
順調であった・・・・・・・・			1 :	96 (53.26)				1 :	1742 (57.06)	
軽度の異常、治療は不要			2 :	24 (13.04)				2 :	350 (11.46)	
異常の為、生活制限と治療			3 :	25 (13.59)				3 :	345 (11.30)	
入院治療を要した・・・			4 :	36 (19.57)				4 :	557 (18.24)	
妊娠中絶を要した・・・			5 :	1 (0.54)				5 :	16 (0.52)	
その他・・・・・・・・・・			6 :	(0.00)				6 :	21 (0.69)	
不明・・・・・・・・・・			7 :	(0.00)				7 :	22 (0.72)	
[今回の分娩経過と子供の状態の評価]										
	スコア：件数 (%)					スコア：件数 (%)				
順調で問題無し・・・・・・・・			1 :	112 (60.87)				1 :	1867 (61.29)	
わずかな問題があった・・			2 :	44 (23.91)				2 :	730 (23.97)	
かなりの問題があった・・			3 :	25 (13.59)				3 :	320 (10.51)	
子供の健康にかなりの障害			4 :	3 (1.63)				4 :	26 (0.85)	
周産期死亡 重篤な結果			5 :	(0.00)				5 :	51 (1.67)	
その他・・・・・・・・・・			6 :	(0.00)				6 :	18 (0.59)	
不明・・・・・・・・・・			7 :	(0.00)				7 :	34 (1.12)	
[長期的に見た母体の産後の健康状態評価]										
	スコア：件数 (%)					スコア：件数 (%)				
妊娠前と変わらない・・			1 :	164 (89.13)				1 :	2675 (87.76)	
少し健康状態が悪化した			2 :	11 (5.98)				2 :	261 (8.56)	
かなり健康状態が悪化した			3 :	2 (1.09)				3 :	21 (0.69)	
重篤な健康障害が発生・・			4 :	(0.00)				4 :	1 (0.03)	
死亡した・・・・・・・・・・			5 :	(0.00)				5 :	1 (0.03)	
その他・・・・・・・・・・			6 :	1 (0.54)				6 :	8 (0.26)	
不明・・・・・・・・・・			7 :	6 (3.26)				7 :	81 (2.66)	

件 数	分娩時異常出血の既往 : 有り					分娩時異常出血の既往 : 無し				
	128					3028				
入院の事情	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合
	1	89	13	25	(29.92)	27	2251	372	378	(24.99)
分娩週数 (修正後)	週数: 件数 (%)					週数: 件数 (%)				
	1 - 27 :	2	(1.56)			1 - 27 :	42	(1.39)		
	28 :	1	(0.78)			28 :	11	(0.36)		
	29 :		(0.00)			29 :	14	(0.46)		
	30 :	1	(0.78)			30 :	23	(0.76)		
	31 :		(0.00)			31 :	10	(0.33)		
	32 :	1	(0.78)			32 :	23	(0.76)		
	33 :		(0.00)			33 :	26	(0.83)		
	34 :	2	(1.56)			34 :	36	(1.19)		
	35 :	3	(2.34)			35 :	53	(1.76)		
	36 :	4	(3.13)			36 :	89	(2.95)		
	37 :	11	(8.59)			37 :	253	(8.38)		
	38 :	34	(26.56)			38 :	590	(19.54)		
	39 :	34	(26.56)			39 :	859	(28.45)		
	40 :	23	(17.97)			40 :	657	(21.76)		
	41 :	12	(9.38)			41 :	284	(9.41)		
	42 :		(0.00)			42 :	45	(1.49)		
	43 :		(0.00)			43 :	2	(0.07)		
	44 :		(0.00)			44 :		(0.00)		
分娩胎位	無 記 入	頭 位	骨 盤 位	そ の 他	骨盤位 その他 の割合	無 記 入	頭 位	骨 盤 位	そ の 他	骨盤位 その他 の割合
	1	120	4	3	(5.51)	12	2829	132	55	(6.20)
分娩時の異常出血の有無	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
	3	77	47	1	(62.10)	47	543	2404	34	(18.43)
出血量 1-3期合計	出血量: C/S以外 C/Sの場合					出血量: C/S以外 C/Sの場合				
	(ml): 件数 (%) 件数 (%)					(ml): 件数 (%) 件数 (%)				
	1- 99:	12	(13.6)	3	(9.0)	1- 99:	610	(24.4)	3	(0.8)
	100- 199:	15	(17.0)	1	(3.0)	100- 199:	697	(27.9)	13	(3.6)
	200- 299:	9	(10.2)	1	(3.0)	200- 299:	471	(18.8)	45	(12.5)
	300- 399:	15	(17.0)	1	(3.0)	300- 399:	302	(12.1)	50	(13.9)
	400- 499:	6	(6.8)	1	(3.0)	400- 499:	149	(5.9)	44	(12.2)
	500- 599:	9	(10.2)	2	(6.0)	500- 599:	90	(3.6)	40	(11.1)
	600- 699:	1	(1.1)	3	(9.0)	600- 699:	55	(2.2)	34	(9.5)
	700- 799:	5	(5.6)	5	(15.1)	700- 799:	39	(1.5)	21	(5.8)
	800- 899:	5	(5.6)	6	(18.1)	800- 899:	22	(0.8)	27	(7.5)
	900- 999:	4	(4.5)	1	(3.0)	900- 999:	13	(0.5)	14	(3.9)
	1000-1099:	2	(2.2)	1	(3.0)	1000-1099:	13	(0.5)	17	(4.7)
	1100-1199:	2	(2.2)	1	(3.0)	1100-1199:	5	(0.2)	7	(1.9)
	1200-1299:	1	(1.1)	1	(3.0)	1200-1299:	2	(0.0)	8	(2.2)
	1300-1399:		(0.0)	1	(3.0)	1300-1399:	9	(0.3)	5	(1.4)
	1400-1499:		(0.0)		(0.0)	1400-1499:	4	(0.1)	5	(1.4)
	1500 - :	2	(2.2)	5	(15.1)	1500 - :	12	(0.4)	25	(6.9)

	分娩時異常出血の既往 : 有り				分娩時異常出血の既往 : 無し			
[新生児所見]								
性別	不 明	男 性	女 性	男性の 割合 (50.39)	不 明	男 性	女 性	男性の 割合 (51.76)
	1	64	63		10	1562	1456	
体重	体重 (g) : 件数 (%)				体重 (g) : 件数 (%)			
	1 - 1499 :	5	(3.91)		1 - 1499 :	98	(3.24)	
	1500 - 1599 :	(0.00)			1500 - 1599 :	10	(0.33)	
	1600 - 1699 :	(0.00)			1600 - 1699 :	11	(0.36)	
	1700 - 1799 :	(0.00)			1700 - 1799 :	12	(0.40)	
	1800 - 1899 :	1	(0.78)		1800 - 1899 :	23	(0.76)	
	1900 - 1999 :	1	(0.78)		1900 - 1999 :	16	(0.53)	
	2000 - 2099 :	1	(0.78)		2000 - 2099 :	21	(0.69)	
	2100 - 2199 :	1	(0.78)		2100 - 2199 :	20	(0.66)	
	2200 - 2299 :	2	(1.56)		2200 - 2299 :	41	(1.36)	
	2300 - 2399 :	2	(1.56)		2300 - 2399 :	68	(2.25)	
	2400 - 2499 :	(0.00)			2400 - 2499 :	85	(2.81)	
	2500 - 2599 :	10	(7.81)		2500 - 2599 :	123	(4.07)	
	2600 - 2699 :	2	(1.56)		2600 - 2699 :	146	(4.83)	
	2700 - 2799 :	4	(3.13)		2700 - 2799 :	224	(7.41)	
	2800 - 2899 :	5	(3.91)		2800 - 2899 :	254	(8.40)	
	2900 - 2999 :	10	(7.81)		2900 - 2999 :	250	(8.27)	
	3000 - 3099 :	18	(14.06)		3000 - 3099 :	273	(9.03)	
	3100 - 3199 :	13	(10.16)		3100 - 3199 :	270	(8.98)	
	3200 - 3299 :	11	(8.59)		3200 - 3299 :	268	(8.87)	
	3300 - 3399 :	11	(8.59)		3300 - 3399 :	223	(7.38)	
	3400 - 3499 :	7	(5.47)		3400 - 3499 :	182	(6.02)	
	3500 -	24	(18.75)		3500 -	405	(13.40)	
身長	身長 (cm) : 件数 (%)				身長 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 29 :	1	(0.81)		1 - 29 :	10	(0.35)	
	30 - 34 :	(0.00)			30 - 34 :	14	(0.49)	
	35 - 39 :	2	(1.61)		35 - 39 :	33	(1.15)	
	40 - 44 :	5	(4.03)		40 - 44 :	104	(3.63)	
	45 - 49 :	58	(46.77)		45 - 49 :	1501	(52.39)	
	50 - 54 :	58	(46.77)		50 - 54 :	1184	(41.33)	
	55 - 59 :	(0.00)			55 - 59 :	16	(0.56)	
	60 -	(0.00)			60 -	3	(0.10)	
頭囲	頭囲 (cm) : 件数 (%)				頭囲 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 24 :	1	(0.81)		1 - 24 :	16	(0.57)	
	25 - 29 :	4	(3.25)		25 - 29 :	76	(2.71)	
	30 - 34 :	96	(78.05)		30 - 34 :	2277	(81.21)	
	35 - 39 :	22	(17.89)		35 - 39 :	432	(15.41)	
	40 - 44 :	(0.00)			40 - 44 :	(0.00)		
	45 - 49 :	(0.00)			45 - 49 :	1	(0.04)	
	50 -	(0.00)			50 -	2	(0.07)	
アプガースコア	1分	5分			1分	5分		
	スコア : 件数 (%)	件数 (%)			スコア : 件数 (%)	件数 (%)		
	1 :	1 (0.8)	1 (0.9)		1 :	14 (0.4)	2 (0.0)	
	2 :	(0.0)	(0.0)		2 :	14 (0.4)	2 (0.0)	
	3 :	3 (2.4)	(0.0)		3 :	24 (0.8)	3 (0.1)	
	4 :	2 (1.6)	1 (0.9)		4 :	18 (0.6)	6 (0.2)	
	5 :	(0.0)	(0.0)		5 :	44 (1.4)	11 (0.4)	
	6 :	2 (1.6)	1 (0.9)		6 :	50 (1.6)	21 (0.9)	
	7 :	10 (8.0)	1 (0.9)		7 :	146 (4.9)	34 (1.4)	
	8 :	31 (25.0)	7 (6.5)		8 :	741 (24.9)	178 (7.6)	
	9 :	68 (54.8)	45 (42.0)		9 :	1711 (57.5)	1054 (45.1)	
	10 :	7 (5.6)	51 (47.6)		10 :	212 (7.1)	1022 (43.8)	

	分娩時異常出血の既往 : 有り					分娩時異常出血の既往 : 無し				
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
[分娩時所見]										
陣痛誘発		22	106		(17.19)	11	527	2482	8	(17.51)
陣痛促進	1	19	108		(14.96)	8	608	2401	11	(20.21)
吸引・鉗子分娩	2	11	115		(8.73)	5	295	2728		(9.76)
帝王切開(予定)	1	23	104		(18.11)	6	198	2823	1	(6.55)
(緊急)		16	112		(12.50)	4	301	2722	1	(9.96)
輸血	2	125		1	(1.57)	4	34	2989	1	(1.12)
[分娩時の異常]										
微弱陣痛	2	17	109		(13.49)	16	447	2558	7	(14.88)
分娩遅延・中止	2	5	121		(3.97)	16	195	2811	6	(6.49)
軟産道強硬	2	6	120		(4.76)	15	105	2892	16	(3.50)
C P D・狭骨盤	2	3	120	3	(2.44)	18	59	2944	7	(1.96)
前期破水	2	19	106	1	(15.20)	15	496	2510	7	(16.50)
その他の異常	2	3	122	1	(2.40)	47	149	2828	4	(5.01)
[分娩時の母体異常]										
3度以上の会陰裂傷	2		126		(0.00)	8	13	3007		(0.43)
弛緩出血	1	30	96	1	(23.81)	8	145	2865	10	(4.82)
分娩時ショック	1	1	126		(0.79)	6	8	3014		(0.26)
羊水塞栓	1		127		(0.00)	6		3022		(0.00)
静脈瘤	1		123	4	(0.00)	6	7	2953	62	(0.24)
肺塞栓症	1		127		(0.00)	6		3022		(0.00)
母体死亡	1		127		(0.00)	6	1	3021		(0.03)
その他の母体異常	1	7	120		(5.51)	20	85	2921	2	(2.83)
[分娩時の胎児・胎児付属物の異常]										
羊水混濁	2	18	106	2	(14.52)	2	389	2594	43	(13.04)
分娩時胎児仮死	2	22	102	2	(17.74)	5	364	2848	11	(12.08)
死亡	1	1	126		(0.79)	3	33	2990	2	(1.09)
前置胎盤	1	2	125		(1.57)	3	27	2995	3	(0.89)
胎盤早期剥離	1	2	125		(1.57)	6	29	2988	5	(0.96)
その他の胎盤異常	1	1	126		(0.79)	12	66	2948	2	(2.19)
臍帯の異常	3	5	120		(4.00)	20	205	2801	2	(6.82)
[新生児の経過・処置]										
けいれん	1	1	124	2	(0.80)	13	4	2973	38	(0.13)
* 先天異常	1	6	120		1(4.76)	21	71	2906	8	22(2.36)
気管内挿管	1	7	111	9	(5.98)	16	96	2872	44	(3.23)
入院	1	23	103	1	(18.25)	15	541	2463	9	(18.01)
N I C Uへの入院	1	11	115	1	(8.73)	18	263	2735	12	(8.77)
新生児死亡(28日未満)	1		118	9	(0.00)	15	13	2710	290	(0.48)
** 死亡時期	128				(0.00)	2995	10	9	14	(52.63)
その他の異常経過	1	10	113	4	(8.13)	17	184	2787	40	(6.19)

	分娩時異常出血の既往：有り					分娩時異常出血の既往：無し							
[今回の妊娠経過]	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合			
流早産の入院治療	2	22	101	3	(17.89)	12	453	2548	15	(15.09)			
流早産以外の入院	1	21	106		(16.54)	23	358	2631	16	(11.98)			
妊娠中毒症・軽症	1	16	111		(12.60)	8	235	2770	15	(7.82)			
・重傷	1	7	120		(5.51)	13	73	2924	18	(2.44)			
ヘマトクリット40%以上	2	1	115	10	(0.86)	22	36	2681	289	(1.32)			
妊娠中胎児仮死	3	4	119	2	(3.25)	39	102	2847	40	(3.46)			
子宮内胎児死亡	3	1	124		(0.80)	42	39	2940	7	(1.31)			
その他妊娠合併症	1	7	114	6	(5.79)	24	250	2696	58	(8.49)			
妊娠糖尿病		2	125	1	(1.57)	5	66	2928	29	(2.20)			
不規則性抗体陽性	4		100	24	(0.00)	51	23	1836	1118	(1.24)			
ヘモグロビン9g/dl以下	1	7	110	10	(5.98)	22	66	2722	216	(2.37)			
その他の妊娠偶発合併症	2	11	114	1	(8.80)	18	281	2706	23	(9.41)			
里帰り分娩		8	117	3	(6.40)	6	218	2751	53	(7.34)			
妊娠中の喫煙	1	6	82	39	(6.82)	4	93	2014	917	(4.41)			
*** 妊娠中の飲酒	1	1	17	66	43(5.56)	11	25	298	1393	1301(7.74)			
[出生前診断について]													
出生前診断の実施		7	119	2	(5.56)	5	160	2760	103	(5.48)			
染色体その他の異常の有無	3		108	17	(0.00)	82	15	2315	616	(0.64)			
[既往歴]		妊 回 数	分 娩 数	自 然 流 産 産	早 期 産	後 期 死 産		妊 回 数	分 娩 数	自 然 流 産 産	早 期 産	後 期 死 産	
	1:	42	65	19	8	2		1:	958	1037	485	102	24
	2:	30	34	7				2:	642	477	122	14	3
	3:	20	4	2				3:	358	83	36	1	
	4:	12	1		1			4:	139	16	8		
	5:	3	1	1				5:	53	3	3		
	6:	3						6:	19	1			
	7:	1						7:	5	1	1		
	8:							8:	4				
	9:							9:	2				
	10:							10:	2		1		
[既往の妊娠合併症および分娩時異常]	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合			
頸管無力症		3	123	2	(2.38)	3	37	2969	19	(1.23)			
妊娠中毒症	1	22	104	1	(17.46)		94	2929	5	(3.11)			
吸引・鉗子分娩		17	111		(13.28)	3	151	2872	2	(5.00)			
帝王切開	1	38	89		(29.92)		206	2821	1	(6.81)			
分娩時異常出血		128			(100.00)		3028			(0.00)			
前置胎盤	1	3	123	1	(2.38)		7	3020	1	(0.23)			
常位胎盤早期剥離		3	124	1	(2.36)		3	3025		(0.10)			
その他の異常	1	29	95	3	(23.39)	11	233	2778	6	(7.74)			
[他科の疾患および妊娠偶発合併症の既往]	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合			
腎炎		2	126		(1.56)	5	48	2969	6	(1.59)			
糖尿病			128		(0.00)	6	23	2994	5	(0.76)			
甲状腺疾患		2	126		(1.56)	6	49	2970	3	(1.62)			
本態性高血圧		3	125		(2.34)	6	24	2993	5	(0.80)			
子宮筋腫		5	122	1	(3.94)	6	67	2948	7	(2.22)			
不妊症			128		(0.00)	7	89	2928	4	(2.95)			
他の他科疾患・偶発合併症	1	15	111	1	(11.90)	13	317	2692	6	(10.54)			
**** コントロールの状態	103	13	5	7	(72.22)	2555	350	44	79	(88.83)			

	分娩時異常出血の既往 : 有り					分娩時異常出血の既往 : 無し				
[新生児異常の既往]	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
低体重児	2	13	113		(10.32)	27	229	2758	14	(7.67)
新生児死亡 (生後1月以内)	2	2	124		(1.59)	27	37	2946	18	(1.24)
先天異常	3	6	119		(4.80)	32	79	2888	29	(2.66)
その他異常	6	2	118	2	(1.67)	82	57	2844	45	(1.86)
[総合的評価]										
[妊娠中の経過の総合的評価]	スコア: 件数 (%)					スコア: 件数 (%)				
順調であった	1 : 67 (52.34)					1 : 1735 (57.34)				
軽度の異常、治療は不要	2 : 18 (14.06)					2 : 339 (11.20)				
異常の為、生活制限と治療	3 : 16 (12.50)					3 : 346 (11.43)				
入院治療を要した	4 : 24 (18.75)					4 : 550 (18.18)				
妊娠中絶を要した	5 : 2 (1.56)					5 : 15 (0.50)				
その他	6 : (0.00)					6 : 20 (0.66)				
不明	7 : 1 (0.78)					7 : 21 (0.69)				
[今回の分娩経過と子供の状態の評価]										
	スコア: 件数 (%)					スコア: 件数 (%)				
順調で問題無し	1 : 67 (52.34)					1 : 1874 (62.05)				
わずかな問題があった . . .	2 : 42 (32.81)					2 : 707 (23.41)				
かなりの問題があった . . .	3 : 14 (10.94)					3 : 318 (10.53)				
子供の健康にかなりの障害	4 : 1 (0.78)					4 : 26 (0.86)				
周産期死亡 重篤な結果	5 : 1 (0.78)					5 : 48 (1.59)				
その他	6 : 1 (0.78)					6 : 17 (0.56)				
不明	7 : 2 (1.56)					7 : 30 (0.99)				
[長期的に見た母体の産後の健康状態評価]										
	スコア: 件数 (%)					スコア: 件数 (%)				
妊娠前と変わらない	1 : 109 (85.16)					1 : 2669 (88.32)				
少し健康状態が悪化した	2 : 14 (10.94)					2 : 244 (8.07)				
かなり健康状態が悪化した	3 : 2 (1.56)					3 : 19 (0.63)				
重篤な健康障害が発生 . . .	4 : (0.00)					4 : 1 (0.03)				
死亡した	5 : (0.00)					5 : 1 (0.03)				
その他	6 : (0.00)					6 : 9 (0.30)				
不明	7 : 3 (2.34)					7 : 79 (2.61)				

件 数	妊娠中毒症の既往 : 有り					妊娠中毒症の既往 : 無し				
	123					3108				
入院の事情	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合
	67	16	40	(45.53)	28	2326	376	378	(24.48)	
分娩週数 (修正後)	週数 : 件数 (%)					週数 : 件数 (%)				
	1 - 27 :	3	(2.46)		1 - 27 :	41	(1.32)			
	28 :	2	(1.64)		28 :	10	(0.32)			
	29 :	1	(0.82)		29 :	13	(0.42)			
	30 :	3	(2.46)		30 :	22	(0.71)			
	31 :	1	(0.82)		31 :	9	(0.29)			
	32 :	3	(2.46)		32 :	22	(0.71)			
	33 :	2	(1.64)		33 :	25	(0.81)			
	34 :	1	(0.82)		34 :	37	(1.19)			
	35 :	5	(4.10)		35 :	52	(1.68)			
	36 :	8	(6.56)		36 :	87	(2.81)			
	37 :	15	(12.30)		37 :	257	(8.29)			
	38 :	24	(19.67)		38 :	619	(19.97)			
	39 :	36	(29.51)		39 :	882	(28.45)			
	40 :	10	(8.20)		40 :	685	(22.10)			
	41 :	8	(6.56)		41 :	290	(9.35)			
	42 :	(0.00)			42 :	47	(1.52)			
	43 :	(0.00)			43 :	2	(0.06)			
	44 :	(0.00)			44 :	(0.00)				
分娩胎位	無 記 入	頭 位	骨 盤 位	そ の 他	骨盤位 その他 の割合	無 記 入	頭 位	骨 盤 位	そ の 他	骨盤位 その他 の割合
	108	8	7	(12.20)	13	2906	133	56	(6.11)	
分娩時の異常出血の有無	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
	3	26	92	2	(22.03)	49	614	2409	36	(20.31)
出血量 1-3期合計	出血量 : C/S以外 C/Sの場合					出血量 : C/S以外 C/Sの場合				
	(ml) : 件数 (%) 件数 (%)					(ml) : 件数 (%) 件数 (%)				
	1- 99:	17	(21.5)	(0.0)		1- 99:	618	(24.2)	6	(1.6)
	100- 199:	23	(29.1)	2	(6.4)	100- 199:	706	(27.6)	11	(2.9)
	200- 299:	11	(13.9)	2	(6.4)	200- 299:	477	(18.6)	44	(11.7)
	300- 399:	11	(13.9)	5	(16.1)	300- 399:	310	(12.1)	47	(12.5)
	400- 499:	3	(3.8)	8	(25.8)	400- 499:	156	(6.1)	39	(10.3)
	500- 599:	5	(6.3)	2	(6.4)	500- 599:	94	(3.6)	42	(11.1)
	600- 699:	2	(2.5)	2	(6.4)	600- 699:	59	(2.3)	36	(9.5)
	700- 799:	2	(2.5)	2	(6.4)	700- 799:	41	(1.6)	28	(7.4)
	800- 899:	1	(1.2)	3	(9.6)	800- 899:	28	(1.1)	32	(8.5)
	900- 999:	1	(1.2)	1	(3.2)	900- 999:	16	(0.6)	14	(3.7)
	1000-1099:	(0.0)		1	(3.2)	1000-1099:	15	(0.5)	17	(4.5)
	1100-1199:	(0.0)		1	(3.2)	1100-1199:	7	(0.2)	8	(2.1)
	1200-1299:	1	(1.2)	(0.0)		1200-1299:	2	(0.0)	10	(2.6)
	1300-1399:	1	(1.2)	(0.0)		1300-1399:	8	(0.3)	7	(1.8)
	1400-1499:	(0.0)		(0.0)		1400-1499:	4	(0.1)	5	(1.3)
	1500 - :	1	(1.2)	2	(6.4)	1500 - :	13	(0.5)	30	(7.9)

	妊娠中毒症の既往 : 有り				妊娠中毒症の既往 : 無し			
[新生児所見]								
性別	不 明	男 性	女 性	男性の 割合	不 明	男 性	女 性	男性の 割合
	1	61	61	(50.00)	10	1600	1498	(51.65)
体重	体重 (g) : 件数 (%)				体重 (g) : 件数 (%)			
	1 - 1499 : 14 (11.38)				1 - 1499 : 90 (2.90)			
	1500 - 1599 : 2 (1.63)				1500 - 1599 : 8 (0.26)			
	1600 - 1699 : (0.00)				1600 - 1699 : 11 (0.35)			
	1700 - 1799 : 1 (0.81)				1700 - 1799 : 11 (0.35)			
	1800 - 1899 : 3 (2.44)				1800 - 1899 : 21 (0.68)			
	1900 - 1999 : 2 (1.63)				1900 - 1999 : 16 (0.52)			
	2000 - 2099 : 1 (0.81)				2000 - 2099 : 20 (0.64)			
	2100 - 2199 : 2 (1.63)				2100 - 2199 : 20 (0.64)			
	2200 - 2299 : 2 (1.63)				2200 - 2299 : 41 (1.32)			
	2300 - 2399 : 3 (2.44)				2300 - 2399 : 68 (2.19)			
	2400 - 2499 : 3 (2.44)				2400 - 2499 : 85 (2.74)			
	2500 - 2599 : 3 (2.44)				2500 - 2599 : 131 (4.22)			
	2600 - 2699 : 5 (4.07)				2600 - 2699 : 148 (4.77)			
	2700 - 2799 : 5 (4.07)				2700 - 2799 : 228 (7.35)			
	2800 - 2899 : 10 (8.13)				2800 - 2899 : 253 (8.15)			
	2900 - 2999 : 9 (7.32)				2900 - 2999 : 262 (8.44)			
	3000 - 3099 : 12 (9.76)				3000 - 3099 : 284 (9.15)			
	3100 - 3199 : 9 (7.32)				3100 - 3199 : 283 (9.12)			
	3200 - 3299 : 10 (8.13)				3200 - 3299 : 276 (8.89)			
	3300 - 3399 : 4 (3.25)				3300 - 3399 : 237 (7.64)			
	3400 - 3499 : 8 (6.50)				3400 - 3499 : 185 (5.96)			
	3500 - 15 (12.20)				3500 - 425 (13.70)			
身長	身長 (cm) : 件数 (%)				身長 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 29 : (0.00)				1 - 29 : 11 (0.37)			
	30 - 34 : 1 (0.93)				30 - 34 : 13 (0.44)			
	35 - 39 : 4 (3.74)				35 - 39 : 31 (1.05)			
	40 - 44 : 9 (8.41)				40 - 44 : 102 (3.45)			
	45 - 49 : 59 (55.14)				45 - 49 : 1541 (52.15)			
	50 - 54 : 34 (31.78)				50 - 54 : 1237 (41.86)			
	55 - 59 : (0.00)				55 - 59 : 17 (0.58)			
	60 - (0.00)				60 - 3 (0.10)			
頭圍	頭圍 (cm) : 件数 (%)				頭圍 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 24 : (0.00)				1 - 24 : 17 (0.59)			
	25 - 29 : 7 (6.93)				25 - 29 : 73 (2.52)			
	30 - 34 : 78 (77.23)				30 - 34 : 2355 (81.26)			
	35 - 39 : 16 (15.84)				35 - 39 : 450 (15.53)			
	40 - 44 : (0.00)				40 - 44 : (0.00)			
	45 - 49 : (0.00)				45 - 49 : 1 (0.03)			
	50 - (0.00)				50 - 2 (0.07)			
アプガースコア	1分		5分		1分		5分	
	スコア : 件数 (%)		件数 (%)		スコア : 件数 (%)		件数 (%)	
	1 :	1 (0.8)	(0.0)		1 :	15 (0.4)	3 (0.1)	
	2 :	(0.0)	(0.0)		2 :	14 (0.4)	2 (0.0)	
	3 :	6 (4.9)	(0.0)		3 :	22 (0.7)	3 (0.1)	
	4 :	(0.0)	1 (0.9)		4 :	21 (0.6)	6 (0.2)	
	5 :	5 (4.1)	1 (0.9)		5 :	39 (1.2)	10 (0.4)	
	6 :	2 (1.6)	3 (2.8)		6 :	50 (1.6)	20 (0.8)	
	7 :	9 (7.4)	2 (1.8)		7 :	147 (4.8)	33 (1.3)	
	8 :	31 (25.6)	10 (9.4)		8 :	759 (24.8)	176 (7.4)	
	9 :	62 (51.2)	41 (38.6)		9 :	1762 (57.7)	1068 (44.8)	
	10 :	5 (4.1)	48 (45.2)		10 :	222 (7.2)	1058 (44.4)	

	妊娠中毒症の既往 : 有り					妊娠中毒症の既往 : 無し				
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
[分娩時所見]										
陣痛誘発		16	107		(13.01)	11	538	2551	8	(17.42)
陣痛促進	2	16	105		(13.22)	7	614	2476	11	(19.87)
吸引・鉗子分娩	1	7	115		(5.74)	6	300	2802		(9.67)
帝王切開 (予定)		15	108		(12.20)	7	223	2877	1	(7.19)
(緊急)		27	96		(21.95)	4	295	2808	1	(9.51)
輸血		1	122		(0.81)	4	34	3068	2	(1.10)
[分娩時の異常]										
微弱陣痛	3	14	106		(11.67)	15	455	2631	7	(14.74)
分娩遅延・中止	2	5	116		(4.13)	16	197	2889	6	(6.38)
軟産道強靱	2	2	117	2	(1.68)	15	111	2968	14	(3.61)
CPD・狭骨盤	2	3	117	1	(2.50)	18	62	3018	10	(2.01)
前期破水	2	18	103		(14.88)	15	508	2577	8	(16.47)
その他の異常	4	9	110		(7.56)	46	143	2914	5	(4.68)
[分娩時の母体異常]										
3度以上の会陰裂傷	1		122		(0.00)	10	14	3084		(0.45)
弛緩出血		11	111	1	(9.02)	9	171	2917	11	(5.54)
分娩時ショック			123		(0.00)	7	9	3092		(0.29)
羊水塞栓			123		(0.00)	7		3101		(0.00)
静脈瘤			119	4	(0.00)	8	9	3015	76	(0.30)
肺塞栓症			123		(0.00)	7		3101		(0.00)
母体死亡			123		(0.00)	7	1	3100		(0.03)
その他の母体異常	1	7	115		(5.74)	20	89	2937	2	(2.86)
[分娩時の胎児・胎児付属物の異常]										
羊水混濁	1	19	100	3	(15.97)	3	393	2671	41	(12.83)
分娩時胎児仮死		26	94	3	(21.67)	7	362	2728	11	(11.72)
死亡		1	121	1	(0.82)	4	32	3071	1	(1.03)
前置胎盤		1	121	1	(0.82)	4	30	3072	2	(0.97)
胎盤早期剥離			122	1	(0.00)	7	30	3066	5	(0.97)
その他の胎盤異常	1	5	116	1	(4.13)	12	67	3028	1	(2.16)
臍帯の異常	1	9	112	1	(7.44)	22	210	2875	1	(6.81)
[新生児の経過・処置]										
けいれん	1		116	6	(0.00)	13	5	3054	36	(0.16)
* 先天異常	3	1	115		4(0.86)	19	79	2982	8	20(2.58)
気管内挿管	2	12	99	10	(10.81)	15	94	2951	48	(3.09)
入院	1	40	81	1	(33.06)	15	529	2555	9	(17.15)
N I C Uへの入院	1	26	96		(21.31)	18	255	2822	13	(8.29)
新生児死亡 (28日未満)	1		107	15	(0.00)	15	14	2793	286	(0.50)
** 死亡時期	122			1	(0.00)	3074	11	9	14	(55.00)
その他の異常経過	2	12	104	5	(10.34)	16	190	2859	43	(6.23)

[今回の妊娠経過]	妊娠中毒症の既往 : 有り					妊娠中毒症の既往 : 無し						
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
流早産の入院治療		18	102	3	(15.00)	14	473	2605	16	(15.37)		
流早産以外の入院		34	87	2	(28.10)	24	354	2715	15	(11.53)		
妊娠中毒症・軽症	1	47	74	1	(38.84)	7	211	2877	13	(6.83)		
・重傷	3	26	93	1	(21.85)	11	54	3026	17	(1.75)		
ヘマトクリット40%以上	1	7	106	9	(10.00)	25	32	2755	296	(1.15)		
妊娠中胎児仮死		12	108	3	(10.00)	42	94	2933	39	(3.11)		
子宮内胎児死亡		1	122		(0.81)	45	39	3017	7	(1.28)		
その他妊娠合併症	2	10	110	1	(8.33)	24	254	2763	67	(8.42)		
妊娠糖尿病	1	5	115	2	(4.17)	5	63	3012	28	(2.05)		
不規則性抗体陽性	3		83	37	(0.00)	54	23	1893	1138	(1.20)		
ヘモグロビン9g/dl以下		2	114	7	(1.72)	23	74	2787	224	(2.59)		
その他の妊娠偶発合併症		13	107	3	(10.83)	19	292	2775	22	(9.52)		
里帰り分娩		5	115	3	(4.17)	6	226	2821	55	(7.42)		
妊娠中の喫煙		4	93	26	(4.12)	5	95	2044	964	(4.44)		
*** 妊娠中の飲酒			17	69	37(0.00)	12	26	302	1425	1343(7.93)		
[出生前診断について]												
出生前診断の実施		8	112	3	(6.87)	6	177	2823	102	(5.90)		
染色体その他の異常の有無	6		97	20	(0.00)	85	15	2386	622	(0.62)		
[既往歴]												
	回 数	妊 娠	分 娩	自 然 流 産	早 期 産 産	後 期 死 産	回 数	妊 娠	分 娩	自 然 流 産	早 期 産 産	後 期 死 産
	1:	33	59	32	12	6	1:	1000	1068	483	102	24
	2:	34	33	5	2	1	2:	657	497	126	12	2
	3:	21	7	1	1		3:	368	86	39	1	
	4:	15			1		4:	141	20	8		
	5:	3					5:	57	4	4		
	6:	3					6:	22	1			
	7:	1					7:	7	1	1		
	8:						8:	4				
	9:						9:	2				
	10:						10:	2		1		
[既往の妊娠合併症および分娩時異常]												
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
頸管無力症	1	2	119	1	(1.65)	5	41	3032	30	(1.33)		
妊娠中毒症		123			(100.00)		3108			(0.00)		
吸引・鉗子分娩	1	14	107	1	(11.57)	4	167	2933	4	(5.39)		
帝王切開		37	86		(30.08)	1	230	2876	1	(7.41)		
分娩時異常出血		22	94	7	(18.97)	5	104	2929	70	(3.43)		
前置胎盤			121	2	(0.00)	4	11	3084	9	(0.36)		
常位胎盤早期剥離		1	120	2	(0.83)	3	5	3093	7	(0.16)		
その他の異常	1	23	94	5	(19.66)	12	254	2809	33	(8.29)		
[他科の疾患および妊娠偶発合併症の既往]												
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
腎炎		4	119		(3.25)	5	48	3050	5	(1.55)		
糖尿病		1	122		(0.81)	6	22	3076	4	(0.71)		
甲状腺疾患		3	120		(2.44)	6	49	3051	2	(1.58)		
本態性高血圧		11	112		(8.94)	7	16	3081	4	(0.52)		
子宮筋腫		3	120		(2.44)	6	71	3024	7	(2.29)		
不妊症		1	122		(0.81)	7	89	3009	3	(2.87)		
他の他科疾患・偶発合併症	1	22	100		(18.03)	13	317	2773	5	(10.26)		
**** コントロールの状態	87	24	7	5	(77.42)	2631	346	45	86	(88.49)		

	妊娠中毒症の既往 : 有り					妊娠中毒症の既往 : 無し				
[新生児異常の既往]	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
低体重児		39	84		(31.71)	28	212	2841	27	(6.94)
新生児死亡 (生後1月以内)		5	116	2	(4.13)	28	38	3017	25	(1.24)
先天異常		4	115	4	(3.36)	34	86	2960	28	(2.82)
その他異常	2	5	110	6	(4.35)	86	56	2920	46	(1.88)
[総合的評価]										
[妊娠中の経過の総合的評価]	スコア: 件数 (%)					スコア: 件数 (%)				
順調であった	1 : 38 (30.89)					1 : 1799 (57.92)				
軽度の異常、治療は不要	2 : 21 (17.07)					2 : 354 (11.40)				
異常の為、生活制限と治療	3 : 24 (19.51)					3 : 347 (11.17)				
入院治療を要した	4 : 39 (31.71)					4 : 547 (17.61)				
妊娠中絶を要した	5 : (0.00)					5 : 17 (0.55)				
その他	6 : (0.00)					6 : 21 (0.68)				
不明	7 : 1 (0.81)					7 : 21 (0.68)				
[今回の分娩経過と子供の状態の評価]										
	スコア: 件数 (%)					スコア: 件数 (%)				
順調で問題無し	1 : 50 (40.65)					1 : 1927 (62.18)				
わずかな問題があった	2 : 45 (36.59)					2 : 727 (23.46)				
かなりの問題があった	3 : 21 (17.07)					3 : 322 (10.39)				
子供の健康にかなりの障害	4 : 3 (2.44)					4 : 25 (0.81)				
周産期死亡 重篤な結果	5 : (0.00)					5 : 50 (1.61)				
その他	6 : (0.00)					6 : 18 (0.58)				
不明	7 : 4 (3.25)					7 : 30 (0.97)				
[長期的に見た母体の産後の健康状態評価]										
	スコア: 件数 (%)					スコア: 件数 (%)				
妊娠前と変わらない	1 : 90 (73.17)					1 : 2746 (88.55)				
少し健康状態が悪化した	2 : 26 (21.14)					2 : 246 (7.93)				
かなり健康状態が悪化した	3 : 1 (0.81)					3 : 18 (0.58)				
重篤な健康障害が発生	4 : (0.00)					4 : 1 (0.03)				
死亡した	5 : (0.00)					5 : 1 (0.03)				
その他	6 : (0.00)					6 : 9 (0.29)				
不明	7 : 6 (4.88)					7 : 80 (2.58)				

件 数	不妊症の既往 : 有り					不妊症の既往 : 無し				
	93					3237				
入院の事情	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合
	1	65	9	18	(29.35)	26	2398	393	418	(25.27)
分娩週数 (修正後)	週数: 件数 (%)					週数: 件数 (%)				
	1 - 27:	2 (2.15)				1 - 27:	46 (1.43)			
		28: (0.00)					28: 13 (0.40)			
		29: 1 (1.08)					29: 15 (0.46)			
		30: (0.00)					30: 25 (0.77)			
		31: (0.00)					31: 12 (0.37)			
		32: 1 (1.08)					32: 26 (0.81)			
		33: (0.00)					33: 27 (0.84)			
		34: (0.00)					34: 37 (1.15)			
		35: 2 (2.15)					35: 56 (1.73)			
		36: 3 (3.23)					36: 95 (2.94)			
		37: 8 (8.60)					37: 276 (8.55)			
		38: 22 (23.66)					38: 633 (19.61)			
		39: 26 (27.96)					39: 916 (28.38)			
		40: 17 (18.28)					40: 696 (21.56)			
		41: 9 (9.68)					41: 306 (9.48)			
		42: 2 (2.15)					42: 46 (1.43)			
		43: (0.00)					43: 3 (0.09)			
		44: (0.00)					44: (0.00)			
分娩胎位	無 記 入	頭 位	骨 盤	そ の 他	骨盤位 その他 の割合	無 記 入	頭 位	骨 盤	そ の 他	骨盤位 その他 の割合
	1	83	7	2	(9.78)	13	3021	141	62	(6.30)
分娩時の異常出血の有無	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
	1	19	71	2	(21.11)	49	650	2500	38	(20.63)
出血量 1-3期合計	出血量: C/S以外 C/Sの場合					出血量: C/S以外 C/Sの場合				
	(ml): 件数 (%) 件数 (%)					(ml): 件数 (%) 件数 (%)				
	1- 99:	4 (5.7) (0.0)				1- 99:	640 (24.1) 6 (1.4)			
	100-199:	25 (35.7) (0.0)				100-199:	721 (27.2) 13 (3.2)			
	200-299:	15 (21.4) 1 (7.6)				200-299:	493 (18.6) 44 (10.8)			
	300-399:	11 (15.7) 2 (15.3)				300-399:	320 (12.0) 51 (12.6)			
	400-499:	4 (5.7) 3 (23.0)				400-499:	167 (6.3) 44 (10.8)			
	500-599:	4 (5.7) (0.0)				500-599:	103 (3.8) 45 (11.1)			
	600-699:	1 (1.4) 3 (23.0)				600-699:	62 (2.3) 36 (8.9)			
	700-799:	4 (5.7) 1 (7.6)				700-799:	41 (1.5) 30 (7.4)			
	800-899:	1 (1.4) 2 (15.3)				800-899:	30 (1.1) 36 (8.9)			
	900-999:	(0.0) 1 (7.6)				900-999:	20 (0.7) 15 (3.7)			
	1000-1099:	1 (1.4) (0.0)				1000-1099:	14 (0.5) 19 (4.7)			
	1100-1199:	(0.0) (0.0)				1100-1199:	7 (0.2) 9 (2.2)			
	1200-1299:	(0.0) (0.0)				1200-1299:	4 (0.1) 11 (2.7)			
	1300-1399:	(0.0) (0.0)				1300-1399:	9 (0.3) 7 (1.7)			
	1400-1499:	(0.0) (0.0)				1400-1499:	4 (0.1) 5 (1.2)			
	1500 - :	(0.0) (0.0)				1500 - :	15 (0.5) 33 (8.1)			

	不妊症の既往 : 有り			不妊症の既往 : 無し		
[新生児所見]						
性別	不 明	男 性	女 性 (52.69)	不 明	男 性	女 性 (51.80)
体重	体重 (g) : 件数 (%)			体重 (g) : 件数 (%)		
	1 - 1499 :	3 (3.23)		1 - 1499 :	108 (3.34)	
	1500 - 1599 :	(0.00)		1500 - 1599 :	10 (0.31)	
	1600 - 1699 :	(0.00)		1600 - 1699 :	12 (0.37)	
	1700 - 1799 :	(0.00)		1700 - 1799 :	13 (0.40)	
	1800 - 1899 :	1 (1.08)		1800 - 1899 :	23 (0.71)	
	1900 - 1999 :	(0.00)		1900 - 1999 :	18 (0.56)	
	2000 - 2099 :	(0.00)		2000 - 2099 :	22 (0.68)	
	2100 - 2199 :	2 (2.15)		2100 - 2199 :	21 (0.65)	
	2200 - 2299 :	(0.00)		2200 - 2299 :	49 (1.52)	
	2300 - 2399 :	6 (6.45)		2300 - 2399 :	65 (2.01)	
	2400 - 2499 :	1 (1.08)		2400 - 2499 :	87 (2.69)	
	2500 - 2599 :	4 (4.30)		2500 - 2599 :	139 (4.30)	
	2600 - 2699 :	5 (5.38)		2600 - 2699 :	151 (4.67)	
	2700 - 2799 :	4 (4.30)		2700 - 2799 :	234 (7.24)	
	2800 - 2899 :	7 (7.53)		2800 - 2899 :	268 (8.29)	
	2900 - 2999 :	10 (10.75)		2900 - 2999 :	270 (8.35)	
	3000 - 3099 :	8 (8.60)		3000 - 3099 :	292 (9.03)	
	3100 - 3199 :	13 (13.98)		3100 - 3199 :	292 (9.03)	
	3200 - 3299 :	7 (7.53)		3200 - 3299 :	287 (8.88)	
	3300 - 3399 :	6 (6.45)		3300 - 3399 :	238 (7.36)	
	3400 - 3499 :	4 (4.30)		3400 - 3499 :	195 (6.03)	
	3500 -	12 (12.90)		3500 -	438 (13.55)	
身長	身長 (cm) : 件数 (%)			身長 (cm) : 件数 (%)		
	1 - 29 :	(0.00)		1 - 29 :	11 (0.36)	
	30 - 34 :	(0.00)		30 - 34 :	16 (0.52)	
	35 - 39 :	1 (1.14)		35 - 39 :	36 (1.17)	
	40 - 44 :	2 (2.27)		40 - 44 :	111 (3.62)	
	45 - 49 :	46 (52.27)		45 - 49 :	1613 (52.56)	
	50 - 54 :	38 (43.18)		50 - 54 :	1263 (41.15)	
	55 - 59 :	1 (1.14)		55 - 59 :	16 (0.52)	
	60 -	(0.00)		60 -	3 (0.10)	
頭囲	頭囲 (cm) : 件数 (%)			頭囲 (cm) : 件数 (%)		
	1 - 24 :	(0.00)		1 - 24 :	18 (0.60)	
	25 - 29 :	1 (1.18)		25 - 29 :	83 (2.76)	
	30 - 34 :	66 (77.65)		30 - 34 :	2445 (81.26)	
	35 - 39 :	18 (21.18)		35 - 39 :	460 (15.29)	
	40 - 44 :	(0.00)		40 - 44 :	(0.00)	
	45 - 49 :	(0.00)		45 - 49 :	1 (0.03)	
	50 -	(0.00)		50 -	2 (0.07)	
アプガースコア	1分	5分		1分	5分	
	スコア:件数 (%)	件数 (%)		スコア:件数 (%)	件数 (%)	
	1 :	(0.0) (0.0)		1 :	16 (0.5) 3 (0.1)	
	2 :	(0.0) (0.0)		2 :	15 (0.4) 2 (0.0)	
	3 :	(0.0) (0.0)		3 :	29 (0.9) 3 (0.1)	
	4 :	(0.0) (0.0)		4 :	22 (0.6) 7 (0.2)	
	5 :	2 (2.1) (0.0)		5 :	47 (1.4) 12 (0.4)	
	6 :	3 (3.2) 1 (1.3)		6 :	52 (1.6) 23 (0.9)	
	7 :	5 (5.3) 1 (1.3)		7 :	162 (5.1) 36 (1.4)	
	8 :	19 (20.4) 5 (6.6)		8 :	783 (24.6) 186 (7.4)	
	9 :	56 (60.2) 38 (50.6)		9 :	1821 (57.3) 1100 (43.9)	
	10 :	8 (8.6) 30 (40.0)		10 :	230 (7.2) 1130 (45.1)	

	不好症の既往 : 有り					不好症の既往 : 無し				
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
[分娩時所見]										
陣痛誘発		20	71	2	(21.86)	11	542	2674	10	(16.85)
陣痛促進		19	73	1	(20.65)	10	627	2587	13	(19.51)
吸引・鉗子分娩		11	82		(11.83)	8	314	2915		(9.72)
帝王切開 (予定)		9	83	1	(9.78)	8	233	2996		(7.22)
(緊急)		12	81		(12.90)	5	319	2912	1	(9.87)
輸血			93		(0.00)	5	36	3194	2	(1.11)
[分娩時の異常]										
微弱陣痛		16	77		(17.20)	18	466	2745	8	(14.51)
分娩遅延・中止		8	84	1	(8.70)	18	203	3011	5	(6.32)
軟産道強靱		11	81	1	(11.96)	17	108	3096	16	(3.37)
C P D・狭骨盤		2	90	1	(2.17)	20	66	3140	11	(2.06)
前期破水		15	78		(16.13)	17	534	2678	8	(16.63)
その他の異常	1	4	87	1	(4.40)	49	155	3029	4	(4.87)
[分娩時の母体異常]										
3度以上の会陰裂傷			93		(0.00)	11	16	3209	1	(0.50)
弛緩出血		5	88		(5.38)	9	184	3030	14	(5.72)
分娩時ショック			93		(0.00)	7	9	3220	1	(0.26)
羊水塞栓			93		(0.00)	7		3229	1	(0.00)
静脈瘤			87	6	(0.00)	8	10	3144	75	(0.32)
肺塞栓症			93		(0.00)	7		3229	1	(0.00)
母体死亡			93		(0.00)	7	1	3229		(0.03)
その他の母体異常	2	2	89		(2.20)	20	101	3113	3	(3.14)
[分娩時の胎児・胎児付属物の異常]										
羊水混濁		8	85		(8.60)	4	428	2758	47	(13.43)
分娩時胎児仮死		20	73		(21.51)	7	386	2829	15	(12.01)
死亡			93		(0.00)	4	33	3197	3	(1.02)
前置胎盤		1	92		(1.08)	4	31	3198	4	(0.96)
胎盤早期剥離			93		(0.00)	7	32	3191	7	(0.99)
その他の胎盤異常	1	3	89		(3.26)	12	70	3152	3	(2.17)
臍帯の異常		10	83		(10.75)	24	217	2993	3	(6.76)
[新生児の経過・処置]										
けいれん			92	1	(0.00)	14	5	3175	43	(0.16)
* 先天異常		2	90		1(2.17)	22	78	3105	8	24(2.45)
気管内挿管		4	88	1	(4.35)	17	109	3049	62	(3.45)
入院		19	74		(20.43)	16	567	2644	10	(17.66)
N I C Uへの入院		6	87		(6.45)	18	284	2920	14	(8.86)
新生児死亡 (28日未満)		1	90	2	(1.10)	16	13	2908	300	(0.45)
** 死亡時期	92	1			(100.00)	3202	10	10	15	(50.00)
その他の異常経過		7	85	1	(7.61)	18	200	2968	51	(6.31)

[今回の妊娠経過]	不妊症の既往 : 有り					不妊症の既往 : 無し							
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合			
流早産の入院治療	1	29	63		(31.52)	14	488	2713	22	(15.25)			
流早産以外の入院	1	15	77		(16.30)	23	394	2801	19	(12.33)			
妊娠中毒症・軽症	2	10	81		(10.99)	9	262	2950	16	(6.16)			
・重傷	2	3	86		(3.30)	13	84	3120	20	(2.62)			
ヘマトクリット40%以上	1	3	86	3	(3.37)	26	35	2873	303	(1.20)			
妊娠中胎児死	1	5	87		(5.43)	43	104	3045	45	(3.30)			
子宮内胎児死亡	1		92		(0.00)	45	40	3145	7	(1.26)			
その他妊娠合併症	1	12	79	1	(13.19)	25	258	2884	70	(8.21)			
妊娠糖尿病		5	88		(5.38)	6	68	3130	33	(2.13)			
不規則性抗体陽性	1	70	22		(1.41)	57	23	1891	1166	(1.14)			
ヘモグロビン9g/dl以下	4	86	1		(4.35)	26	75	2902	234	(2.52)			
その他の妊娠偶発合併症	9	84			(9.68)	21	310	2878	28	(8.72)			
聖滯り分娩	3	88	2		(3.30)	6	240	2931	60	(7.57)			
妊娠中の喫煙	1	65	27		(1.52)	5	100	2129	1003	(4.49)			
*** 妊娠中の飲酒		6	57	30	(0.00)	12	26	326	1478	1395 (7.39)			
[出生前診断について]													
出生前診断の実施		8	82	3	(8.89)	6	179	2947	105	(5.73)			
染色体その他の異常の有無	1	1	81	10	(1.22)	94	14	2479	650	(0.56)			
[既往歴]		妊 回	分 娩	自 然 流 産	早 期 産	後 期 死 産		妊 回	分 娩	自 然 流 産	早 期 産	後 期 死 産	
	1:	33	22	23	2	2		1:	1024	1132	485	114	28
	2:	18	4	6				2:	678	528	125	14	3
	3:	7		1				3:	383	95	39		2
	4:	2						4:	153	20	6	1	
	5:	1						5:	60	4	4		
	6:							6:	25	1			
	7:	1		1				7:	8	1			
	8:							8:	4				
	9:							9:	2				
	10:							10:	2		1		
[既往の妊娠合併症および分娩時異常]		無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	
頸管無力症	3	1	87	2	(1.14)	91	42	3070	34	(1.35)			
妊娠中毒症	3	1	89		(1.11)	66	122	3009	20	(3.90)			
吸引・鉗子分娩	3	2	88		(2.22)	90	182	2956	9	(5.80)			
帝王切開	3	6	84		(6.67)	85	267	2883	2	(8.48)			
分娩時異常出血	3		89	1	(0.00)	90	128	2928	91	(4.19)			
前置胎盤	3		90		(0.00)	89	11	3117	20	(0.35)			
常位胎盤早期剥離	3		90		(0.00)	88	6	3125	18	(0.19)			
その他の異常	5	9	79		(10.23)	96	272	2822	47	(8.79)			
[他科の疾患および妊娠偶発合併症の既往]		無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	
腎炎			3	90		(3.23)		54	3180	3	(1.67)		
糖尿病			2	91		(2.15)		22	3213	2	(0.68)		
甲状腺疾患			2	91		(2.15)		52	3185		(1.61)		
本態性高血圧			1	91	1	(1.09)	1	27	3207	2	(0.83)		
子宮筋腫			8	85		(8.60)		69	3163	5	(2.13)		
不妊症			93			(100.00)			3237		(0.00)		
他の他科疾患・偶発合併症	3	11	79		(12.22)	11	335	2885	6	(10.40)			
**** コントロールの状態	26	56	4	7	(93.33)	2770	328	50	89	(86.77)			

	不妊症の既往 : 有り					不妊症の既往 : 無し				
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
[新生児異常の既往]										
低体重児	5	3	85		(3.41)	93	254	2861	29	(8.15)
新生児死亡 (生後1月以内)	5		87	1	(0.00)	93	43	3074	27	(1.38)
先天異常	5		87	1	(0.00)	100	91	3015	31	(2.93)
その他異常	6	2	83	2	(2.35)	153	58	2976	50	(1.91)
[総合的評価]										
[妊娠中の経過の総合的評価]	スコア: 件数 (%)					スコア: 件数 (%)				
順調であった			1 :	42 (45.16)				1 :	1837 (56.80)	
軽度の異常、治療は不要			2 :	8 (8.60)				2 :	378 (11.69)	
異常の為、生活制限と治療			3 :	12 (12.90)				3 :	372 (11.50)	
入院治療を要した			4 :	30 (32.26)				4 :	586 (18.12)	
妊娠中絶を要した			5 :	(0.00)				5 :	17 (0.53)	
その他			6 :	(0.00)				6 :	21 (0.65)	
不明			7 :	1 (1.08)				7 :	23 (0.71)	
[今回の分娩経過と子供の状態の評価]	スコア: 件数 (%)					スコア: 件数 (%)				
順調で問題無し			1 :	59 (63.44)				1 :	1961 (60.77)	
わずかな問題があった			2 :	19 (20.43)				2 :	786 (24.36)	
かなりの問題があった			3 :	13 (13.88)				3 :	348 (10.78)	
子供の健康にかなりの障害			4 :	(0.00)				4 :	29 (0.90)	
周産期死亡 重篤な結果			5 :	1 (1.08)				5 :	49 (1.52)	
その他			6 :	(0.00)				6 :	17 (0.53)	
不明			7 :	1 (1.08)				7 :	37 (1.15)	
[長期的に見た母体の産後の健康状態評価]	スコア: 件数 (%)					スコア: 件数 (%)				
妊娠前と変わらない			1 :	83 (89.25)				1 :	2823 (87.43)	
少し健康状態が悪化した			2 :	6 (6.45)				2 :	285 (8.83)	
かなり健康状態が悪化した			3 :	1 (1.08)				3 :	22 (0.68)	
重篤な健康障害が発生			4 :	(0.00)				4 :	1 (0.03)	
死亡した			5 :	(0.00)				5 :	1 (0.03)	
その他			6 :	(0.00)				6 :	9 (0.28)	
不明			7 :	3 (3.23)				7 :	88 (2.73)	

件 数	先天異常児の経験 : 有り 91					先天異常児の経験 : 無し 3116													
	入院の事情	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合 (20.22)	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合 (25.37)								
分娩週数 (修正後)	週数 : 件数 (%)					週数 : 件数 (%)													
	1 - 27 :	28 :	29 :	30 :	31 :	32 :	33 :	34 :	35 :	36 :	37 :	38 :	39 :	40 :	41 :	42 :	43 :	44 :	
	1 (1.10)	(0.00)	(0.00)	1 (1.10)	1 (1.10)	2 (2.20)	2 (2.20)	(0.00)	1 (1.10)	2 (2.20)	9 (9.89)	23 (25.27)	21 (23.08)	21 (23.08)	7 (7.69)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	44 (1.42)	10 (0.32)	14 (0.45)	23 (0.74)	11 (0.35)	23 (0.74)	24 (0.77)	36 (1.16)	55 (1.77)	92 (2.96)	266 (8.56)	616 (19.83)	891 (28.68)	668 (21.50)	285 (9.17)	46 (1.48)	3 (0.10)	(0.00)	
分娩胎位	無 記 入	頭 位 入	骨 盤 位	そ の 他	骨盤位 その他 の割合 (4.40)	無 記 入	頭 位 入	骨 盤 位	そ の 他	骨盤位 その他 の割合 (6.41)									
分娩時の異常出血の有無	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合 (23.26)	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合 (20.49)									
出血量 1-3期合計	出血量 : C/S以外 C/Sの場合 (ml) : 件数 (%) 件数 (%)					出血量 : C/S以外 C/Sの場合 (ml) : 件数 (%) 件数 (%)													
	1- 99:	100-199:	200-299:	300-399:	400-499:	500-599:	600-699:	700-799:	800-899:	900-999:	1000-1099:	1100-1199:	1200-1299:	1300-1399:	1400-1499:	1500 - :			
	14 (20.5)	21 (30.8)	8 (11.7)	9 (13.2)	4 (5.8)	6 (8.8)	1 (1.4)	2 (2.9)	(0.0)	2 (2.9)	1 (1.4)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	
	(0.0)	(0.0)	3 (15.7)	1 (5.2)	1 (5.2)	2 (10.5)	1 (5.2)	(0.0)	4 (21.0)	2 (10.5)	2 (10.5)	(0.0)	(0.0)	1 (5.2)	1 (5.2)	1 (5.2)			
	610 (23.9)	703 (27.5)	481 (18.8)	305 (11.9)	156 (6.2)	96 (3.7)	60 (2.3)	42 (1.6)	29 (1.1)	15 (0.5)	13 (0.5)	7 (0.2)	3 (0.1)	9 (0.3)	4 (0.1)	14 (0.5)			
	6 (1.5)	14 (3.6)	43 (11.1)	50 (12.9)	43 (11.1)	41 (10.6)	36 (9.3)	30 (7.7)	33 (8.5)	13 (3.3)	17 (4.4)	9 (2.3)	10 (2.5)	6 (1.5)	4 (1.0)	31 (8.0)			

	先天異常児の経験 : 有り				先天異常児の経験 : 無し			
[新生児所見]								
性別	不 明	男 性	女 性	男性の 割合	不 明	男 性	女 性	男性の 割合
	2	42	47	(47.19)	9	1606	1501	(51.69)
体重	体重 (g) : 件数 (%)				体重 (g) : 件数 (%)			
	1 - 1499 : 2 (2.22)				1 - 1499 : 100 (3.21)			
	1500 - 1599 : (0.00)				1500 - 1599 : 10 (0.32)			
	1600 - 1699 : 1 (1.11)				1600 - 1699 : 10 (0.32)			
	1700 - 1799 : (0.00)				1700 - 1799 : 12 (0.39)			
	1800 - 1899 : 1 (1.11)				1800 - 1899 : 22 (0.71)			
	1900 - 1999 : (0.00)				1900 - 1999 : 19 (0.61)			
	2000 - 2099 : 4 (4.44)				2000 - 2099 : 18 (0.58)			
	2100 - 2199 : 1 (1.11)				2100 - 2199 : 21 (0.67)			
	2200 - 2299 : 2 (2.22)				2200 - 2299 : 43 (1.38)			
	2300 - 2399 : 2 (2.22)				2300 - 2399 : 66 (2.19)			
	2400 - 2499 : 2 (2.22)				2400 - 2499 : 83 (2.67)			
	2500 - 2599 : 2 (2.22)				2500 - 2599 : 133 (4.27)			
	2600 - 2699 : 1 (1.11)				2600 - 2699 : 152 (4.88)			
	2700 - 2799 : 8 (8.89)				2700 - 2799 : 225 (7.23)			
	2800 - 2899 : 5 (5.56)				2800 - 2899 : 251 (8.07)			
	2900 - 2999 : 9 (10.00)				2900 - 2999 : 264 (8.48)			
	3000 - 3099 : 10 (11.11)				3000 - 3099 : 282 (9.06)			
	3100 - 3199 : 7 (7.78)				3100 - 3199 : 286 (9.19)			
	3200 - 3299 : 9 (10.00)				3200 - 3299 : 278 (8.93)			
	3300 - 3399 : 6 (6.67)				3300 - 3399 : 230 (7.39)			
	3400 - 3499 : 3 (3.33)				3400 - 3499 : 190 (6.11)			
	3500 - 15 (16.67)				3500 - 415 (13.34)			
身長	身長 (cm) : 件数 (%)				身長 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 29 : (0.00)				1 - 29 : 11 (0.37)			
	30 - 34 : (0.00)				30 - 34 : 14 (0.47)			
	35 - 39 : 2 (2.56)				35 - 39 : 30 (1.01)			
	40 - 44 : 3 (3.85)				40 - 44 : 106 (3.58)			
	45 - 49 : 38 (48.72)				45 - 49 : 1564 (52.84)			
	50 - 54 : 33 (42.31)				50 - 54 : 1217 (41.11)			
	55 - 59 : 2 (2.56)				55 - 59 : 15 (0.51)			
	60 - (0.00)				60 - 3 (0.10)			
頭囲	頭囲 (cm) : 件数 (%)				頭囲 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 24 : 2 (2.60)				1 - 24 : 15 (0.52)			
	25 - 29 : 3 (3.90)				25 - 29 : 74 (2.55)			
	30 - 34 : 54 (70.13)				30 - 34 : 2365 (81.61)			
	35 - 39 : 18 (23.38)				35 - 39 : 441 (15.22)			
	40 - 44 : (0.00)				40 - 44 : (0.00)			
	45 - 49 : (0.00)				45 - 49 : 1 (0.03)			
	50 - (0.00)				50 - 2 (0.07)			
アプガースコア	1分		5分		1分		5分	
	スコア : 件数 (%)		件数 (%)		スコア : 件数 (%)		件数 (%)	
	1 :	1 (1.1)	1 :	1 (1.3)	1 :	15 (0.4)	2 (0.0)	
	2 :	1 (1.1)	2 :	(0.0)	2 :	14 (0.4)	2 (0.0)	
	3 :	(0.0)	3 :	(0.0)	3 :	28 (0.9)	3 (0.1)	
	4 :	(0.0)	4 :	(0.0)	4 :	21 (0.6)	7 (0.2)	
	5 :	1 (1.1)	5 :	(0.0)	5 :	44 (1.4)	11 (0.4)	
	6 :	3 (3.4)	6 :	2 (2.6)	6 :	52 (1.7)	21 (0.8)	
	7 :	5 (5.7)	7 :	(0.0)	7 :	152 (4.9)	35 (1.4)	
	8 :	19 (21.8)	8 :	6 (8.0)	8 :	768 (25.0)	181 (7.5)	
	9 :	50 (57.4)	9 :	26 (34.6)	9 :	1751 (57.1)	1080 (44.9)	
	10 :	7 (8.0)	10 :	40 (53.3)	10 :	217 (7.0)	1059 (44.1)	

[分娩時所見]	先天異常児の経験 : 有り					先天異常児の経験 : 無し				
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
陣痛誘発		17	73	1	(18.89)	11	529	2568	8	(17.08)
陣痛促進		17	73	1	(18.89)	8	609	2488	11	(19.66)
吸引・鉗子分娩		3	88		(3.30)	7	305	2804		(9.81)
帝王切開(予定)		16	75		(17.58)	7	221	2887	1	(7.11)
(緊急)		5	86		(5.49)	4	312	2800		(10.03)
輸血	1	2	88		(2.22)	3	32	3079	2	(1.03)
[分娩時の異常]	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
微弱陣痛		14	77		(15.38)	17	450	2641	8	(14.56)
分娩遅延・中止		4	87		(4.40)	17	197	2896	6	(6.37)
軟産道強靭		2	88	1	(2.22)	16	112	2873	15	(3.63)
CPD・狭骨盤		1	90		(1.10)	19	63	3023	11	(2.04)
前期破水		13	78		(14.29)	16	509	2583	8	(16.46)
その他の異常	1	3	87		(3.33)	45	149	2917	5	(4.86)
[分娩時の母体異常]	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
3度以上の会陰裂傷	2	1	88		(1.12)	9	13	3083	1	(0.42)
弛緩出血	1	7	82	1	(7.87)	8	172	2923	13	(5.56)
分娩時ショック	1	1	89		(1.11)	6	8	3101	1	(0.26)
羊水塞栓	1		90		(0.00)	6		3109	1	(0.00)
静脈瘤	2		86	3	(0.00)	6	9	3023	78	(0.30)
肺塞栓症	1		90		(0.00)	6		3109	1	(0.00)
母体死亡	1		90		(0.00)	6	1	3109		(0.03)
その他の母体異常	1	2	88		(2.22)	19	92	3002	3	(2.97)
[分娩時の胎児・胎児付属物の異常]	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
羊水混濁	1	10	78	2	(11.36)	2	403	2669	42	(13.12)
分娩時胎児仮死	1	9	79	2	(10.23)	5	381	2720	10	(12.29)
死亡	1	1	89		(1.11)	2	31	3081	2	(1.00)
前置胎盤	1	2	88		(2.22)	2	28	3083	3	(0.90)
胎盤早期剥離	1		90		(0.00)	5	31	3074	6	(1.00)
その他の胎盤異常	1	1	89		(1.11)	11	70	3033	2	(2.26)
臍帯の異常	1	7	83		(7.78)	21	207	2886	2	(6.69)
[新生児の経過・処置]	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
けいれん	3		83	5	(0.00)	9	5	3069	33	(0.16)
* 先天異常	3	15	72		(17.24)	17	64	3011	7	(2.08)
気管内挿管	2	6	79	4	(7.06)	12	102	2950	52	(3.34)
入院	3	21	65	2	(24.42)	11	546	2552	7	(17.62)
NICUへの入院	2	13	74	2	(14.94)	15	263	2827	11	(8.51)
新生児死亡(28日未満)	3	2	73	13	(2.67)	11	11	2814	280	(0.39)
** 死亡時期	87	2		2	(100.00)	3090	9		8	(50.00)
その他の異常経過	2	6	80	3	(6.98)	14	182	2877	43	(5.95)

【今回の妊娠経過】	先天異常児の経験 : 有り					先天異常児の経験 : 無し						
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
流早産の入院治療		9	78	4	(10.34)	15	475	2611	15	(15.39)		
流早産以外の入院		19	69	3	(21.59)	23	369	2711	13	(11.98)		
妊娠中毒症・軽症		7	82	2	(7.87)	11	251	2842	12	(8.12)		
・重傷			89	2	(0.00)	13	81	3006	16	(2.62)		
ヘマトクリット40%以上		2	81	8	(2.41)	27	36	2765	288	(1.29)		
妊娠中胎児仮死	2	3	82	4	(3.53)	40	104	2935	37	(3.42)		
子宮内胎児死亡	2	3	86		(3.37)	43	36	3031	6	(1.17)		
その他妊娠合併症	2	3	85	1	(3.41)	24	256	2775	61	(8.45)		
妊娠糖尿病		3	86	2	(3.37)	4	64	3019	29	(2.08)		
不規則性抗体陽性	1		50	40	(0.00)	54	22	1910	1130	(1.14)		
ヘモグロビン9g/dl以下	1	3	82	5	(3.53)	25	72	2795	224	(2.51)		
その他の妊娠偶発合併症	1	5	83	2	(5.68)	19	290	2785	22	(9.43)		
里帰り分娩		2	84	5	(2.33)	5	228	2832	51	(7.45)		
妊娠中の喫煙	1	5	63	22	(7.35)	3	92	2055	966	(4.29)		
*** 妊娠中の飲酒	2		10	52	27(0.00)	9	24	312	1423	1348(7.14)		
【出生前診断について】												
出生前診断の実施		30	59	2	(33.71)	5	153	2856	102	(5.08)		
染色体その他の異常の有無	1	2	75	13	(2.60)	89	12	2389	626	(0.50)		
【既往歴】												
	回	妊 娠	分 娩	自 然 流 産	早 期 産 産	後 期 死 産	回	妊 娠	分 娩	自 然 流 産	早 期 産 産	後 期 死 産
	数	1: 18	30	17	12	8	1: 1012	1106	493	100	19	
		2: 27	36	7	3		2: 649	486	116	11	3	
		3: 18	7				3: 369	86	40	2		
		4: 14	3				4: 138	16	8	1		
		5: 7					5: 51	4	4			
		6: 1					6: 22	1				
		7: 1					7: 7	1				
		8:					8: 4					
		9:					9: 2					
		10:					10: 2		1			
【既往の妊娠合併症および分娩時異常】												
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
頸管無力症		2	87	2	(2.25)	25	39	3021	31	(1.27)		
妊娠中毒症		4	86	1	(4.44)	22	115	2360	19	(3.74)		
吸引・鉗子分娩		5	85	1	(5.56)	26	176	2907	7	(5.71)		
帝王切開		12	78	1	(13.33)	22	251	2843		(8.11)		
分娩時異常出血		6	79	6	(7.06)	27	119	2888	82	(3.96)		
前置胎盤		1	89	1	(1.11)	26	9	3065	16	(0.29)		
常位胎盤早期剥離			90	1	(0.00)	25	5	3070	16	(0.16)		
その他の異常	1	7	81	2	(7.95)	33	254	2786	43	(8.36)		
【他科の疾患および妊娠偶発合併症の既往】												
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
腎炎		1	90		(1.10)	8	51	3052	5	(1.64)		
糖尿病			91		(0.00)	9	20	3083	4	(0.64)		
甲状腺疾患		2	89		(2.20)	9	48	3057	2	(1.55)		
本態性高血圧		1	90		(1.10)	10	26	3076	4	(0.84)		
子宮筋腫		2	89		(2.20)	10	72	3027	7	(2.32)		
不妊症			91		(0.00)	11	87	3015	3	(2.80)		
他科疾患・偶発合併症		3	88		(3.30)	13	331	2765	7	(10.69)		
**** コントロールの状態	83	4		4	(100.00)	2620	362	50	84	(87.86)		

	先天異常児の経験 : 有り					先天異常児の経験 : 無し				
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
[新生児異常の既往]										
低体重児	1	29	58	3	(33.33)	2	219	2872	23	(7.09)
新生児死亡(生後1月以内)	1	16	69	5	(18.82)	1	22	3079	14	(0.71)
先天異常		91			(100.00)			3116		(0.00)
その他異常	5	3	82	1	(3.53)	57	57	2375	27	(1.88)
[総合的評価]										
[妊娠中の経過の総合的評価]	スコア: 件数 (%)		件数 (%)			スコア: 件数 (%)		件数 (%)		
順調であった		1 :	51 (56.67)				1 :	1780 (57.14)		
軽度の異常、治療は不要		2 :	9 (10.00)				2 :	358 (11.49)		
異常の為、生活制限と治療		3 :	9 (10.00)				3 :	356 (11.43)		
入院治療を要した		4 :	16 (17.78)				4 :	567 (18.20)		
妊娠中絶を要した		5 :	3 (3.33)				5 :	13 (0.42)		
その他		6 :	2 (2.22)				6 :	19 (0.61)		
不明		7 :	(0.00)				7 :	22 (0.71)		
[今回の分娩経過と子供の状態の評価]	スコア: 件数 (%)		件数 (%)			スコア: 件数 (%)		件数 (%)		
順調で問題無し		1 :	55 (61.11)				1 :	1910 (61.45)		
わずかな問題があった		2 :	17 (18.89)				2 :	749 (24.10)		
かなりの問題があった		3 :	10 (11.11)				3 :	329 (10.59)		
子供の健康にかなりの障害		4 :	1 (1.11)				4 :	28 (0.90)		
周産期死亡 重篤な結果		5 :	5 (5.56)				5 :	45 (1.45)		
その他		6 :	1 (1.11)				6 :	17 (0.55)		
不明		7 :	1 (1.11)				7 :	30 (0.97)		
[長期的に見た母体の産後の健康状態評価]	スコア: 件数 (%)		件数 (%)			スコア: 件数 (%)		件数 (%)		
妊娠前と変わらない		1 :	76 (84.44)				1 :	2743 (88.20)		
少し健康状態が悪化した		2 :	10 (11.11)				2 :	258 (8.30)		
かなり健康状態が悪化した		3 :	(0.00)				3 :	23 (0.74)		
重篤な健康障害が発生		4 :	(0.00)				4 :	(0.00)		
死亡した		5 :	(0.00)				5 :	1 (0.03)		
その他		6 :	1 (1.11)				6 :	8 (0.26)		
不明		7 :	3 (3.33)				7 :	77 (2.48)		

件 数	子宮筋腫の既往 : 有り					子宮筋腫の既往 : 無し				
	77					3250				
入院の事情	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合
	1	52	4	20	(31.58)	26	2409	398	415	(25.23)
分娩週数 (修正後)	週数: 件数 (%)					週数: 件数 (%)				
	1 - 27 :	1 (1.30)				1 - 27 :	47 (1.45)			
	28 :	1 (1.30)				28 :	12 (0.37)			
	29 :	(0.00)				29 :	16 (0.49)			
	30 :	1 (1.30)				30 :	24 (0.74)			
	31 :	1 (1.30)				31 :	11 (0.34)			
	32 :	(0.00)				32 :	27 (0.83)			
	33 :	(0.00)				33 :	27 (0.83)			
	34 :	2 (2.60)				34 :	35 (1.08)			
	35 :	(0.00)				35 :	58 (1.79)			
	36 :	1 (1.30)				36 :	96 (2.96)			
	37 :	9 (11.69)				37 :	275 (8.49)			
	38 :	28 (36.36)				38 :	625 (19.28)			
	39 :	16 (20.78)				39 :	927 (28.60)			
	40 :	11 (14.29)				40 :	702 (21.66)			
	41 :	6 (7.79)				41 :	308 (9.50)			
	42 :	(0.00)				42 :	48 (1.48)			
	43 :	(0.00)				43 :	3 (0.09)			
	44 :	(0.00)				44 :	(0.00)			
分娩胎位	無 記 入	頭 位	骨 盤 位	そ の 他	骨盤位 その他 の割合	無 記 入	頭 位	骨 盤 位	そ の 他	骨盤位 その他 の割合
		66	3	8	(14.29)	14	3035	145	56	(6.21)
分娩時の異常出血の有無	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
	1	24	51	1	(32.00)	49	643	2519	39	(20.34)
出血量 1-3期合計	出血量: C/S以外 C/Sの場合					出血量: C/S以外 C/Sの場合				
	(ml):	件数 (%)	件数 (%)			(ml):	件数 (%)	件数 (%)		
	1- 99:	6 (15.0)	(0.0)			1- 99:	638 (23.8)	6 (1.5)		
	100- 199:	10 (25.0)	1 (3.2)			100- 199:	735 (27.4)	13 (3.3)		
	200- 299:	8 (20.0)	4 (12.9)			200- 299:	496 (18.6)	41 (10.5)		
	300- 399:	6 (15.0)	3 (9.6)			300- 399:	325 (12.1)	50 (12.9)		
	400- 499:	6 (15.0)	3 (9.6)			400- 499:	165 (6.1)	44 (11.3)		
	500- 599:	2 (5.0)	2 (6.4)			500- 599:	105 (3.9)	43 (11.1)		
	600- 699:	(0.0)	3 (9.6)			600- 699:	63 (2.3)	36 (9.3)		
	700- 799:	(0.0)	2 (6.4)			700- 799:	45 (1.6)	29 (7.4)		
	800- 899:	1 (2.5)	5 (16.1)			800- 899:	30 (1.1)	33 (8.5)		
	900- 999:	(0.0)	1 (3.2)			900- 999:	20 (0.7)	15 (3.8)		
	1000-1099:	(0.0)	2 (6.4)			1000-1099:	15 (0.5)	17 (4.3)		
	1100-1199:	(0.0)	1 (3.2)			1100-1199:	7 (0.2)	8 (2.0)		
	1200-1299:	(0.0)	1 (3.2)			1200-1299:	4 (0.1)	10 (2.5)		
	1300-1399:	(0.0)	(0.0)			1300-1399:	8 (0.3)	7 (1.8)		
	1400-1499:	(0.0)	1 (3.2)			1400-1499:	4 (0.1)	4 (1.0)		
	1500 - :	1 (2.5)	2 (6.4)			1500 - :	14 (0.5)	31 (8.0)		

	子宮筋腫の既往 : 有り				子宮筋腫の既往 : 無し			
[新生児所見]								
性別	不明	男性	女性	男性の割合	不明	男性	女性	男性の割合
	37	40		(48.05)	11	1681	1558	(51.90)
体重	体重 (g) : 件数 (%)				体重 (g) : 件数 (%)			
	1 - 1499	2	(2.60)		1 - 1499	109	(3.36)	
	1500 - 1599		(0.00)		1500 - 1599	10	(0.31)	
	1600 - 1699		(0.00)		1600 - 1699	12	(0.37)	
	1700 - 1799		(0.00)		1700 - 1799	13	(0.40)	
	1800 - 1899	1	(1.30)		1800 - 1899	22	(0.68)	
	1900 - 1999		(0.00)		1900 - 1999	18	(0.55)	
	2000 - 2099	1	(1.30)		2000 - 2099	22	(0.68)	
	2100 - 2199		(0.00)		2100 - 2199	23	(0.71)	
	2200 - 2299	2	(2.60)		2200 - 2299	47	(1.45)	
	2300 - 2399		(0.00)		2300 - 2399	71	(2.19)	
	2400 - 2499	1	(1.30)		2400 - 2499	87	(2.68)	
	2500 - 2599	2	(2.60)		2500 - 2599	140	(4.31)	
	2600 - 2699	3	(3.90)		2600 - 2699	153	(4.71)	
	2700 - 2799	3	(3.90)		2700 - 2799	235	(7.24)	
	2800 - 2899	8	(10.39)		2800 - 2899	266	(8.20)	
	2900 - 2999	10	(12.99)		2900 - 2999	269	(8.29)	
	3000 - 3099	8	(10.39)		3000 - 3099	292	(9.00)	
	3100 - 3199	8	(10.39)		3100 - 3199	297	(9.15)	
	3200 - 3299	4	(5.19)		3200 - 3299	290	(8.94)	
	3300 - 3399	8	(10.39)		3300 - 3399	236	(7.27)	
	3400 - 3499	7	(9.09)		3400 - 3499	192	(5.92)	
	3500 -	9	(11.69)		3500 -	441	(13.59)	
身長	身長 (cm) : 件数 (%)				身長 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 29		(0.00)		1 - 29	11	(0.36)	
	30 - 34		(0.00)		30 - 34	16	(0.52)	
	35 - 39	1	(1.35)		35 - 39	36	(1.17)	
	40 - 44	1	(1.35)		40 - 44	111	(3.60)	
	45 - 49	40	(54.05)		45 - 49	1617	(52.50)	
	50 - 54	31	(41.69)		50 - 54	1270	(41.23)	
	55 - 59	1	(1.35)		55 - 59	16	(0.52)	
	60 -		(0.00)		60 -	3	(0.10)	
頭囲	頭囲 (cm) : 件数 (%)				頭囲 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 24	1	(1.37)		1 - 24	17	(0.56)	
	25 - 29	1	(1.37)		25 - 29	82	(2.72)	
	30 - 34	56	(76.71)		30 - 34	2453	(81.28)	
	35 - 39	15	(20.55)		35 - 39	463	(15.34)	
	40 - 44		(0.00)		40 - 44		(0.00)	
	45 - 49		(0.00)		45 - 49	1	(0.03)	
	50 -		(0.00)		50 -	2	(0.07)	
アプガースコア	1分		5分		1分		5分	
	スコア	件数 (%)	件数 (%)		スコア	件数 (%)	件数 (%)	
	1	1 (1.3)	(0.0)		1	15 (0.4)	3 (0.1)	
	2	(0.0)	(0.0)		2	15 (0.4)	2 (0.0)	
	3	(0.0)	(0.0)		3	29 (0.9)	3 (0.1)	
	4	1 (1.3)	(0.0)		4	21 (0.6)	7 (0.2)	
	5	(0.0)	(0.0)		5	49 (1.5)	12 (0.4)	
	6	3 (3.9)	(0.0)		6	52 (1.6)	24 (0.9)	
	7	5 (6.5)	1 (1.4)		7	162 (5.0)	36 (1.4)	
	8	17 (22.3)	6 (8.9)		8	784 (24.5)	185 (7.3)	
	9	44 (57.8)	30 (44.7)		9	1831 (57.3)	1106 (44.1)	
	10	5 (6.5)	30 (44.7)		10	233 (7.3)	1129 (45.0)	

	子宮筋腫の既往 : 有り					子宮筋腫の既往 : 無し				
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
[分娩時所見]										
陣痛誘発		13	63	1	(17.11)	11	547	2681	11	(16.95)
陣痛促進		13	63	1	(17.11)	10	630	2597	13	(19.52)
吸引・鉗子分娩		4	73		(5.19)	8	320	2922		(9.87)
帝王切開(予定)		25	52		(32.47)	8	217	3024	1	(6.70)
(緊急)		12	65		(15.56)	5	320	2324	1	(9.86)
輸血			77		(0.00)	5	36	3207	2	(1.11)
[分娩時の異常]										
微弱陣痛		6	71		(7.79)	18	475	2749	8	(14.73)
分娩遅延・中止		4	73		(5.19)	18	207	3019	6	(6.42)
軟産道強靱		4	72	1	(5.26)	17	115	3102	16	(3.57)
C P D・狭骨盤		1	75	1	(1.32)	20	67	3152	11	(2.08)
前期破水		2	75		(2.60)	17	547	2676	8	(16.96)
その他の異常	1	4	72		(5.26)	49	155	3041	5	(4.85)
[分娩時の母体異常]										
3度以上の会陰裂傷		1	76		(1.30)	11	15	3223	1	(0.46)
弛緩出血		6	70	1	(7.89)	9	182	3046	13	(5.64)
分娩時ショック		1	76		(1.30)	7	8	3234	1	(0.25)
羊水塞栓			77		(0.00)	7		3242	1	(0.00)
肺塞栓			72	5	(0.00)	8	10	3157	75	(0.32)
肺塞栓症			77		(0.00)	7		3242	1	(0.00)
母体死亡			77		(0.00)	7	1	3242		(0.03)
その他の母体異常	1	3	73		(3.95)	21	100	3126	3	(3.10)
[分娩時の胎児・胎児付属物の異常]										
羊水混濁		14	62	1	(18.42)	4	421	2779	46	(13.16)
分娩時胎児仮死		9	66	2	(12.00)	7	397	2833	13	(12.29)
死亡			76	1	(0.00)	4	33	3211	2	(1.02)
前置胎盤		1	75	1	(1.32)	4	31	3212	3	(0.96)
胎盤早期剥離			76	1	(0.00)	7	32	3205	6	(0.99)
その他の胎盤異常	1	1	74	1	(1.33)	12	72	3164	2	(2.22)
臍帯の異常		7	69	1	(9.21)	24	219	3005	2	(6.79)
[新生児の経過・処置]										
けいれん			77		(0.00)	14	5	3167	44	(0.16)
* 先天異常		1	75		1(1.32)	22	79	3117	8	24(2.47)
気管内挿管		4	72	1	(5.26)	17	109	3062	62	(3.44)
入院		12	65		(15.58)	16	574	2650	10	(17.80)
N I C Uへの入院		5	72		(6.49)	19	285	2932	14	(8.86)
新生児死亡(28日未満)		1	69	7	(1.43)	16	13	2925	296	(0.44)
** 死亡時期	76	1			(100.00)	3215	10	10	15	(50.00)
その他の異常経過		6	68	3	(8.11)	18	201	2981	50	(6.32)

	子宮筋腫の既往 : 有り					子宮筋腫の既往 : 無し					
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	
[今回の妊娠経過]											
流早産の入院治療		28	49		(36.36)	15	488	2725	22	(15.19)	
流早産以外の入院	1	14	62		(18.42)	23	395	2813	19	(12.31)	
妊娠中毒症・軽症		4	73		(5.19)	11	268	2955	16	(8.32)	
・重傷		4	73		(5.19)	15	83	3132	20	(2.58)	
ヘマトクリット40%以上		5	67	5	(6.94)	27	34	2888	301	(1.16)	
妊娠中胎児仮死	1	3	72	1	(4.00)	43	106	3057	44	(3.35)	
子宮内胎児死亡	1	1	75		(1.32)	46	39	3158	7	(1.22)	
その他妊娠合併症		10	67		(12.99)	26	256	2897	71	(8.12)	
妊娠糖尿病			75	2	(0.00)	6	73	3141	30	(2.27)	
不規則性抗体陽性			47	30	(0.00)	57	24	2012	1157	(1.18)	
ヘモグロビン9g/dl以下	1	5	68	3	(6.85)	25	74	2919	232	(2.47)	
その他の妊娠偶発合併症		16	61		(20.78)	21	302	2899	28	(9.43)	
里帰り分娩		2	71	4	(2.74)	6	241	2944	59	(7.57)	
妊娠中の喫煙		2	58	17	(3.33)	5	98	2135	1012	(4.39)	
*** 妊娠中の飲酒		1	13	41	22(7.14)	12	25	319	1494	1400(7.27)	
[出生前診断について]											
出生前診断の実施	1	9	65	2	(12.16)	5	178	2961	106	(5.67)	
染色体その他の異常の有無	4		61	12	(0.00)	91	15	2496	648	(0.60)	
[既往歴]											
回数	1:	26	25	24	3	1:	1030	1129	494	113	30
	2:	13	9	4		2:	682	523	127	14	3
	3:	11	1			3:	379	94	40	2	
	4:	3				4:	152	20	8	1	
	5:	1				5:	60	4	4		
	6:					6:	25	1			
	7:					7:	9	1	1		
	8:					8:	4				
	9:					9:	2				
	10:					10:	2		1		
[既往の妊娠合併症および分娩時異常]											
頸管無力症	5	3	69		(4.17)	89	40	3085	36	(1.28)	
妊娠中毒症	3	3	71		(4.05)	86	120	3024	20	(3.82)	
吸引・鉗子分娩	5	3	69		(4.17)	88	181	2972	9	(5.74)	
帝王切開	3	13	61		(17.57)	85	260	2903	2	(8.22)	
分娩時異常出血	5	5	67		(6.94)	88	122	2948	92	(3.97)	
前置胎盤	4		73		(0.00)	88	11	3131	20	(0.35)	
常位胎盤早期剥離	4		73		(0.00)	87	6	3139	18	(0.19)	
その他の異常	4	15	56		(20.55)	97	266	2840	47	(8.56)	
[他科の疾患および妊娠偶発合併症の既往]											
腎炎		3	74		(3.90)		54	3193	3	(1.66)	
糖尿病		1	76		(1.30)		23	3225	2	(0.71)	
甲状腺疾患		4	73		(5.19)		50	3200		(1.54)	
本態性高血圧	1		76		(0.00)		28	3219	3	(0.86)	
子宮筋腫		77			(100.00)			3250		(0.00)	
不妊症		8	69		(10.39)	1	85	3163	1	(2.62)	
他の他科疾患・偶発合併症	2	11	63	1	(14.86)	12	335	2898	5	(10.36)	
**** コントロールの状態	18	48	3	8	(94.12)	2778	335	52	85	(86.56)	

	子宮筋腫の既往 : 有り					子宮筋腫の既往 : 無し				
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
[新生児異常の既往]										
低体重児	2	5	68	1	(6.76)	96	253	2873	28	(8.09)
新生児死亡 (生後1月以内)	2	1	73	1	(1.35)	96	42	3085	27	(1.34)
先天異常	2	2	72	1	(2.70)	103	89	3027	31	(2.86)
その他異常	2	2	71	2	(2.74)	157	59	2984	50	(1.94)
[総合的評価]										
[妊娠中の経過の総合的評価]	スコア : 件数 (%)					スコア : 件数 (%)				
順調であった	1 : 29 (37.66)					1 : 1848 (56.91)				
軽度の異常、治療は不要	2 : 16 (20.78)					2 : 370 (11.40)				
異常の為、生活制限と治療	3 : 9 (11.69)					3 : 374 (11.52)				
入院治療を要した . . .	4 : 22 (28.57)					4 : 594 (18.29)				
妊娠中絶を要した . . .	5 : 1 (1.30)					5 : 16 (0.49)				
その他	6 : (0.00)					6 : 21 (0.65)				
不明	7 : (0.00)					7 : 24 (0.74)				
[今回の分娩経過と子供の状態の評価]	スコア : 件数 (%)					スコア : 件数 (%)				
順調で問題無し	1 : 51 (66.23)					1 : 1967 (60.71)				
わずかな問題があった .	2 : 15 (19.48)					2 : 791 (24.41)				
かなりの問題があった .	3 : 10 (12.99)					3 : 349 (10.77)				
子供の健康にかなりの障害	4 : (0.00)					4 : 29 (0.90)				
周産期死亡 重篤な結果	5 : 1 (1.30)					5 : 49 (1.51)				
その他	6 : (0.00)					6 : 17 (0.52)				
不明	7 : (0.00)					7 : 36 (1.17)				
[長期的に見た母体の産後の健康状態評価]	スコア : 件数 (%)					スコア : 件数 (%)				
妊娠前と変わらない . .	1 : 65 (84.42)					1 : 2639 (87.57)				
少し健康状態が悪化した	2 : 11 (14.29)					2 : 279 (8.61)				
かなり健康状態が悪化した	3 : 1 (1.30)					3 : 22 (0.68)				
重篤な健康障害が発生 .	4 : (0.00)					4 : 1 (0.03)				
死亡した	5 : (0.00)					5 : 1 (0.03)				
その他	6 : (0.00)					6 : 9 (0.28)				
不明	7 : (0.00)					7 : 91 (2.81)				

件 数	腎炎の既往 : 有り					腎炎の既往 : 無し				
	57					3274				
入院の事情	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合
	1	36	5	15	(35.71)	26	2427	397	422	(25.23)
分娩週数 (修正後)	週数: 件数 (%)					週数: 件数 (%)				
	1 - 27: 2 (3.51)					1 - 27: 46 (1.41)				
	28: 1 (1.75)					28: 12 (0.37)				
	29: (0.00)					29: 16 (0.49)				
	30: 1 (1.75)					30: 24 (0.74)				
	31: (0.00)					31: 12 (0.37)				
	32: 1 (1.75)					32: 26 (0.80)				
	33: (0.00)					33: 27 (0.83)				
	34: (0.00)					34: 37 (1.13)				
	35: 1 (1.75)					35: 57 (1.75)				
	36: 1 (1.75)					36: 97 (2.97)				
	37: 6 (10.53)					37: 278 (8.51)				
	38: 13 (22.81)					38: 642 (19.66)				
	39: 12 (21.05)					39: 931 (28.51)				
	40: 10 (17.54)					40: 703 (21.53)				
	41: 8 (14.04)					41: 307 (9.40)				
	42: 1 (1.75)					42: 47 (1.44)				
	43: (0.00)					43: 3 (0.09)				
	44: (0.00)					44: (0.00)				
分娩胎位	無 記 入	頭 位	骨 盤	そ の 他	骨盤位 その他 の割合	無 記 入	頭 位	骨 盤	そ の 他	骨盤位 その他 の割合
	1	52	3	1	(7.14)	13	3053	145	63	(6.38)
分娩時の異常出血の有無	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
	1	16	38	2	(29.63)	49	652	2535	38	(20.46)
出血量 1-3期合計	出血量: C/S以外 C/Sの場合					出血量: C/S以外 C/Sの場合				
	(ml): 件数 (%)					(ml): 件数 (%)				
	1- 99: 9 (20.0) (0.0)					1- 99: 636 (23.7) 6 (1.4)				
	100- 199: 15 (33.3) (0.0)					100- 199: 731 (27.3) 14 (3.4)				
	200- 299: 6 (13.3) (0.0)					200- 299: 503 (18.8) 45 (10.9)				
	300- 399: 5 (11.1) 1 (16.6)					300- 399: 324 (12.1) 52 (12.6)				
	400- 499: 4 (8.8) 1 (16.6)					400- 499: 167 (6.2) 46 (11.1)				
	500- 599: 2 (4.4) 1 (16.6)					500- 599: 105 (3.9) 44 (10.6)				
	600- 699: 2 (4.4) 2 (33.3)					600- 699: 61 (2.2) 37 (8.9)				
	700- 799: (0.0) (0.0)					700- 799: 45 (1.6) 31 (7.5)				
	800- 899: 1 (2.2) 1 (16.6)					800- 899: 30 (1.1) 37 (8.9)				
	900- 999: (0.0) (0.0)					900- 999: 20 (0.7) 16 (3.8)				
	1000-1099: (0.0) (0.0)					1000-1099: 15 (0.5) 19 (4.6)				
	1100-1199: (0.0) (0.0)					1100-1199: 7 (0.2) 9 (2.1)				
	1200-1299: (0.0) (0.0)					1200-1299: 4 (0.1) 11 (2.6)				
	1300-1399: (0.0) (0.0)					1300-1399: 9 (0.3) 7 (1.7)				
	1400-1499: 1 (2.2) (0.0)					1400-1499: 3 (0.1) 5 (1.2)				
	1500 - : (0.0) (0.0)					1500 - : 15 (0.5) 33 (8.0)				

	腎炎の既往 : 有り				腎炎の既往 : 無し			
[新生児所見]								
性別	不明	男性	女性	男性の割合	不明	男性	女性	男性の割合
	26	31		(45.61)	11	1696	1567	(51.98)
体重	体重 (g) : 件数 (%)				体重 (g) : 件数 (%)			
	1 - 1499 :	4	(7.02)		1 - 1499 :	107	(3.27)	
	1500 - 1599 :		(0.00)		1500 - 1599 :	10	(0.31)	
	1600 - 1699 :	1	(1.75)		1600 - 1699 :	11	(0.34)	
	1700 - 1799 :		(0.00)		1700 - 1799 :	13	(0.40)	
	1800 - 1899 :		(0.00)		1800 - 1899 :	24	(0.73)	
	1900 - 1999 :		(0.00)		1900 - 1999 :	18	(0.55)	
	2000 - 2099 :		(0.00)		2000 - 2099 :	23	(0.70)	
	2100 - 2199 :		(0.00)		2100 - 2199 :	23	(0.70)	
	2200 - 2299 :	3	(5.26)		2200 - 2299 :	46	(1.41)	
	2300 - 2399 :	2	(3.51)		2300 - 2399 :	69	(2.11)	
	2400 - 2499 :		(0.00)		2400 - 2499 :	88	(2.69)	
	2500 - 2599 :	5	(8.77)		2500 - 2599 :	137	(4.19)	
	2600 - 2699 :	2	(3.51)		2600 - 2699 :	154	(4.71)	
	2700 - 2799 :	4	(7.02)		2700 - 2799 :	234	(7.16)	
	2800 - 2899 :	3	(5.26)		2800 - 2899 :	272	(8.32)	
	2900 - 2999 :	9	(15.79)		2900 - 2999 :	272	(8.32)	
	3000 - 3099 :	3	(5.26)		3000 - 3099 :	297	(9.09)	
	3100 - 3199 :	4	(7.02)		3100 - 3199 :	300	(9.18)	
	3200 - 3299 :	4	(7.02)		3200 - 3299 :	290	(8.87)	
	3300 - 3399 :	8	(14.04)		3300 - 3399 :	236	(7.22)	
	3400 - 3499 :	3	(5.26)		3400 - 3499 :	196	(6.00)	
	3500 -	2	(3.51)		3500 -	449	(13.74)	
身長	身長 (cm) : 件数 (%)				身長 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 29 :		(0.00)		1 - 29 :	11	(0.35)	
	30 - 34 :		(0.00)		30 - 34 :	16	(0.52)	
	35 - 39 :	2	(3.70)		35 - 39 :	35	(1.13)	
	40 - 44 :	1	(1.85)		40 - 44 :	112	(3.61)	
	45 - 49 :	31	(57.41)		45 - 49 :	1630	(52.51)	
	50 - 54 :	20	(37.04)		50 - 54 :	1280	(41.24)	
	55 - 59 :		(0.00)		55 - 59 :	17	(0.55)	
	60 -		(0.00)		60 -	3	(0.10)	
頭囲	頭囲 (cm) : 件数 (%)				頭囲 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 24 :		(0.00)		1 - 24 :	18	(0.59)	
	25 - 29 :	4	(7.55)		25 - 29 :	80	(2.63)	
	30 - 34 :	41	(77.36)		30 - 34 :	2471	(81.23)	
	35 - 39 :	8	(15.09)		35 - 39 :	470	(15.45)	
	40 - 44 :		(0.00)		40 - 44 :		(0.00)	
	45 - 49 :		(0.00)		45 - 49 :	1	(0.03)	
	50 -		(0.00)		50 -	2	(0.07)	
アブガースコア	1分		5分		1分		5分	
	スコア : 件数 (%)		スコア : 件数 (%)		スコア : 件数 (%)		スコア : 件数 (%)	
	1 : (0.0)		(0.0)		1 : 16 (0.5)		3 (0.1)	
	2 : 1 (1.7)		(0.0)		2 : 14 (0.4)		2 (0.0)	
	3 : (0.0)		(0.0)		3 : 29 (0.9)		3 (0.1)	
	4 : 2 (3.5)		(0.0)		4 : 20 (0.6)		7 (0.2)	
	5 : 2 (3.5)		(0.0)		5 : 47 (1.4)		12 (0.4)	
	6 : 1 (1.7)		2 (4.0)		6 : 54 (1.6)		22 (0.8)	
	7 : 4 (7.0)		(0.0)		7 : 163 (5.0)		37 (1.4)	
	8 : 14 (24.5)		7 (14.2)		8 : 790 (24.5)		184 (7.2)	
	9 : 30 (52.6)		22 (44.9)		9 : 1846 (57.4)		1118 (44.1)	
	10 : 3 (5.2)		18 (36.7)		10 : 235 (7.3)		1142 (45.1)	

	腎炎の既往 : 有り					腎炎の既往 : 無し				
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
[分娩時所見]										
陣痛誘発	1	10	45	1	(18.18)	10	553	2700	11	(17.00)
陣痛促進	1	12	43	1	(21.82)	9	636	2616	13	(19.56)
吸引・鉗子分娩	1	5	51		(8.93)	7	320	2947		(9.79)
帝王切開(予定)	1	4	52		(7.14)	7	238	3028	1	(7.29)
(緊急)	1	7	49		(12.50)	4	325	2944	1	(9.94)
輸血	1		55	1	(0.00)	4	36	3233	1	(1.10)
[分娩時の異常]										
微弱陣痛		4	53		(7.02)	18	478	2770	8	(14.72)
分娩遅延・中止	3	54			(5.26)	18	208	3042	6	(6.40)
軟産道強靱	5	52			(8.77)	17	114	3126	17	(3.52)
CPD・狭骨盤		57			(0.00)	20	68	3174	12	(2.10)
前期破水		7	50		(12.28)	17	541	2708	8	(16.65)
その他の異常	1		56		(0.00)	49	160	3060	5	(4.97)
[分娩時の母体異常]										
3度以上の会陰裂傷			57		(0.00)	11	16	3246	1	(0.49)
弛緩出血		5	52		(8.77)	9	184	3068	13	(5.66)
分娩時ショック			57		(0.00)	7	9	3257	1	(0.28)
羊水塞栓			57		(0.00)	7		3266	1	(0.00)
静脈瘤			56	1	(0.00)	8	10	3177	79	(0.31)
肺塞栓症			57		(0.00)	7		3266	1	(0.00)
母体死亡			57		(0.00)	7	1	3266		(0.03)
その他の母体異常	1	5	51		(8.93)	21	98	3152	3	(3.02)
[分娩時の胎児・胎児付属物の異常]										
羊水混濁	1	9	45	2	(16.67)	3	426	2300	45	(13.21)
分娩時胎児仮死	6	50	1		(10.71)	7	401	2852	14	(12.33)
死亡	1	55	1		(1.79)	4	32	3236	2	(0.88)
前置胎盤	2	54	1		(3.57)	4	30	3237	3	(0.92)
胎盤早期剥離			56	1	(0.00)	7	32	3229	6	(0.98)
その他の胎盤異常	4	52	1		(7.14)	13	69	3190	2	(2.12)
臍帯の異常	3	53	1		(5.36)	23	224	3025	2	(6.89)
[新生児の経過・処置]										
けいれん			55	2	(0.00)	14	5	3213	42	(0.16)
* 先天異常			55		2(0.00)	22	80	3141	8	23(2.48)
気管内挿管		4	50	3	(7.41)	17	109	3088	60	(3.41)
入院		17	40		(29.82)	16	571	2677	10	(17.58)
NICUへの入院		7	50		(12.28)	19	283	2958	14	(6.73)
新生児死亡(28日未満)			51	6	(0.00)	16	14	2946	298	(0.47)
** 死亡時期	56		1		(0.00)	3239	11	9	15	(55.00)
その他の異常経過		4	50	3	(7.41)	18	203	3003	50	(6.33)

【今回の妊娠経過】	腎炎の既往：有り					腎炎の既往：無し					
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	
流早産の入院治療		15	42		(26.32)	15	503	2734	22	(15.54)	
流早産以外の入院	1	13	43		(23.21)	23	397	2835	19	(12.28)	
妊娠中毒症・軽症		11	46		(19.30)	11	260	2987	16	(8.01)	
・重傷	1	6	49	1	(10.91)	14	81	3160	19	(2.50)	
ヘマトクリット40%以上	1	2	50	4	(3.85)	26	37	2909	302	(1.26)	
妊娠中胎児仮死		3	54		(5.26)	44	106	3079	45	(3.33)	
子宮内胎児死亡		1	56		(1.75)	47	39	3181	7	(1.21)	
その他妊娠合併症		4	52	1	(7.14)	26	265	2913	70	(8.34)	
妊娠糖尿病			57		(0.00)	6	73	3162	33	(2.26)	
不規則性抗体陽性			37	20	(0.00)	57	24	2025	1168	(1.17)	
ヘモグロビン9g/dl以下			53	4	(0.00)	26	78	2939	231	(2.59)	
その他の妊娠偶発合併症		11	46		(19.30)	21	308	2917	28	(9.55)	
里帰り分娩		6	50	1	(10.71)	6	238	2968	62	(7.42)	
妊娠中の喫煙		1	35	21	(2.78)	5	101	2160	1008	(4.47)	
*** 妊娠中の飲酒			7	18	32(0.00)	12	26	324	1519	1393(7.43)	
【出生前診断について】											
出生前診断の実施		1	55	1	(1.79)	6	185	2976	107	(5.85)	
染色体その他の異常の有無			46	11	(0.00)	95	15	2514	650	(0.59)	
【既往歴】											
回数	妊 娠	分 娩	自 然 流 産	早 期 産	後 期 死 産	回数	妊 娠	分 娩	自 然 流 産	早 期 産	後 期 死 産
1:	19	18	9	2		1:	1039	1137	510	114	30
2:	13	7	1	1		2:	682	524	130	13	3
3:	9	1	1			3:	381	94	39	2	
4:	1					4:	154	20	8	1	
5:						5:	61	4	4		
6:						6:	25	1			
7:	1		1			7:	8	1			
8:						8:	4				
9:						9:	2				
10:						10:	2		1		
【既往の妊娠合併症および分娩時異常】											
無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
頰管無力症	4	1	51	1	(1.92)	91	42	3106	35	(1.33)	
妊娠中毒症	3	4	48	2	(7.69)	67	119	3050	18	(3.76)	
吸引・鉗子分娩	4	7	45	1	(13.46)	90	177	2999	8	(5.57)	
帝王切開	3	7	47		(12.96)	86	266	2920	2	(8.35)	
分娩時異常出血	3	2	48	4	(4.00)	91	126	2969	88	(4.07)	
前置胎盤	3		53	1	(0.00)	90	11	3154	19	(0.35)	
常位胎盤早期剥離	3		53	1	(0.00)	89	6	3162	17	(0.19)	
その他の異常	3	4	48	2	(7.69)	99	277	2653	45	(8.85)	
【他科の疾患および妊娠偶発合併症の既往】											
無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
腎炎		57		(100.00)			3274		(0.00)		
糖尿病		1	56	(1.75)		1	23	3248	2	(0.70)	
甲状腺疾患		3	54	(5.26)		1	52	3221		(1.59)	
本態性高血圧			57	(0.00)		2	28	3241	3	(0.86)	
子宮筋腫		3	54	(5.26)		2	74	3193	5	(2.27)	
不妊症		3	54	(5.26)		3	90	3180	1	(2.75)	
他の他科疾患・偶発合併症		10	46	1	(17.86)	15	335	2919	5	(10.30)	
*** コントロールの状態	16	33	3	5	(91.67)	2781	352	52	89	(87.13)	

	腎炎の既往 : 有り					腎炎の既往 : 無し				
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
[新生児異常の既往]										
低体重児	3	4	49	1	(7.55)	95	254	2897	28	(8.06)
新生児死亡 (生後1月以内)	4		52	1	(0.00)	94	43	3110	27	(1.36)
先天異常	4	1	51	1	(1.92)	101	90	3052	31	(2.86)
その他異常	5		51	1	(0.00)	154	61	3008	51	(1.99)
[総合的評価]										
[妊娠中の経過の総合的評価]	スコア: 件数 (%)		件数 (%)			スコア: 件数 (%)		件数 (%)		
順調であった			1 :	20 (35.09)				1 :	1660 (56.66)	
軽度の異常、治療は不要			2 :	11 (19.30)				2 :	375 (11.46)	
異常の為、生活制限と治療			3 :	6 (10.53)				3 :	376 (11.49)	
入院治療を要した			4 :	20 (35.09)				4 :	598 (18.28)	
妊娠中絶を要した			5 :	(0.00)				5 :	17 (0.52)	
その他			6 :	(0.00)				6 :	21 (0.64)	
不明			7 :	(0.00)				7 :	24 (0.73)	
[今回の分娩経過と子供の状態の評価]	スコア: 件数 (%)		件数 (%)			スコア: 件数 (%)		件数 (%)		
順調で問題無し			1 :	29 (50.88)				1 :	1992 (61.03)	
わずかな問題があった			2 :	13 (22.81)				2 :	793 (24.30)	
かなりの問題があった			3 :	13 (22.81)				3 :	347 (10.63)	
子供の健康にかなりの障害			4 :	(0.00)				4 :	29 (0.89)	
周産期死亡 重篤な結果			5 :	(0.00)				5 :	50 (1.53)	
その他			6 :	(0.00)				6 :	17 (0.52)	
不明			7 :	2 (3.51)				7 :	36 (1.10)	
[長期的に見た母体の産後の健康状態評価]	スコア: 件数 (%)		件数 (%)			スコア: 件数 (%)		件数 (%)		
妊娠前と変わらない			1 :	41 (71.93)				1 :	2666 (87.81)	
少し健康状態が悪化した			2 :	15 (26.32)				2 :	275 (8.42)	
かなり健康状態が悪化した			3 :	(0.00)				3 :	22 (0.67)	
重篤な健康障害が発生			4 :	(0.00)				4 :	1 (0.03)	
死亡した			5 :	(0.00)				5 :	1 (0.03)	
その他			6 :	(0.00)				6 :	9 (0.28)	
不明			7 :	1 (1.75)				7 :	90 (2.76)	

件 数	甲状腺疾患の既往 : 有り					甲状腺疾患の既往 : 無し				
	55					3278				
入院の事情	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合
		37	6	12	(32.73)	29	2428	396	425	(25.27)
分娩週数 (修正後)	週数: 件数 (%)					週数: 件数 (%)				
		1 - 27:			(0.00)		1 - 27:			48 (1.47)
					(0.00)					13 (0.40)
					(0.00)					16 (0.49)
					1 (1.85)					24 (0.73)
					(0.00)					12 (0.37)
					1 (1.85)					26 (0.80)
					(0.00)					27 (0.83)
					1 (1.85)					36 (1.10)
					(0.00)					58 (1.77)
					2 (3.70)					96 (2.94)
					3 (5.56)					281 (8.59)
					12 (22.22)					643 (19.66)
					11 (20.37)					934 (28.56)
					16 (29.63)					697 (21.31)
					6 (11.11)					309 (9.45)
					(0.00)					48 (1.47)
					1 (1.85)					2 (0.06)
					(0.00)					(0.00)
分娩胎位	無 記 入	頭 位	骨 盤	そ の 他	骨盤位 その他 の割合	無 記 入	頭 位	骨 盤	そ の 他	骨盤位 その他 の割合
		50	3	2	(8.09)	14	3057	145	62	(6.34)
分娩時の異常出血の有無	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
		10	44	1	(18.52)	50	659	2530	39	(20.66)
出血量 1-3期合計	出血量: C/S以外 C/Sの場合					出血量: C/S以外 C/Sの場合				
	(ml): 件数 (%) 件数 (%)					(ml): 件数 (%) 件数 (%)				
		1- 99:	13 (30.9)		(0.0)		1- 99:	632 (23.5)		6 (1.4)
		100-199:	9 (21.4)		(0.0)		100-199:	737 (27.5)		14 (3.4)
		200-299:	5 (11.9)		2 (18.1)		200-299:	503 (18.7)		43 (10.5)
		300-399:	7 (16.6)		4 (36.3)		300-399:	324 (12.0)		49 (12.0)
		400-499:	4 (9.5)		(0.0)		400-499:	168 (6.2)		47 (11.5)
		500-599:	1 (2.3)		1 (9.0)		500-599:	106 (3.9)		44 (10.8)
		600-699:	(0.0)		1 (9.0)		600-699:	63 (2.3)		38 (9.3)
		700-799:	1 (2.3)		1 (9.0)		700-799:	44 (1.6)		30 (7.3)
		800-899:	1 (2.3)		(0.0)		800-899:	30 (1.1)		38 (9.3)
		900-999:	(0.0)		1 (9.0)		900-999:	20 (0.7)		15 (3.6)
		1000-1099:	(0.0)		(0.0)		1000-1099:	15 (0.5)		19 (4.6)
		1100-1199:	(0.0)		(0.0)		1100-1199:	7 (0.2)		9 (2.2)
		1200-1299:	(0.0)		1 (9.0)		1200-1299:	4 (0.1)		10 (2.4)
		1300-1399:	(0.0)		(0.0)		1300-1399:	9 (0.3)		7 (1.7)
		1400-1499:	(0.0)		(0.0)		1400-1499:	4 (0.1)		5 (1.2)
		1500 - :	1 (2.3)		(0.0)		1500 - :	14 (0.5)		33 (8.1)

	甲状腺疾患の既往 : 有り				甲状腺疾患の既往 : 無し			
[新生児所見]								
性別	不明	男性	女性	男性の割合	不明	男性	女性	男性の割合
	38	17		(69.09)	11	1683	1584	(51.52)
体重	体重 (g) : 件数 (%)				体重 (g) : 件数 (%)			
	1 - 1499 : (0.00)				1 - 1499 : 111 (3.39)			
	1500 - 1599 : (0.00)				1500 - 1599 : 10 (0.31)			
	1600 - 1699 : (0.00)				1600 - 1699 : 12 (0.37)			
	1700 - 1799 : 1 (1.82)				1700 - 1799 : 12 (0.37)			
	1800 - 1899 : (0.00)				1800 - 1899 : 24 (0.73)			
	1900 - 1999 : 1 (1.82)				1900 - 1999 : 17 (0.52)			
	2000 - 2099 : (0.00)				2000 - 2099 : 23 (0.70)			
	2100 - 2199 : (0.00)				2100 - 2199 : 23 (0.70)			
	2200 - 2299 : 2 (3.64)				2200 - 2299 : 47 (1.44)			
	2300 - 2399 : 2 (3.64)				2300 - 2399 : 69 (2.11)			
	2400 - 2499 : 1 (1.82)				2400 - 2499 : 87 (2.66)			
	2500 - 2599 : 4 (7.27)				2500 - 2599 : 139 (4.25)			
	2600 - 2699 : 2 (3.64)				2600 - 2699 : 154 (4.71)			
	2700 - 2799 : 6 (10.91)				2700 - 2799 : 232 (7.09)			
	2800 - 2899 : 3 (5.45)				2800 - 2899 : 272 (8.31)			
	2900 - 2999 : 4 (7.27)				2900 - 2999 : 277 (8.46)			
	3000 - 3099 : 7 (12.73)				3000 - 3099 : 283 (8.85)			
	3100 - 3199 : 7 (12.73)				3100 - 3199 : 299 (9.14)			
	3200 - 3299 : 3 (5.45)				3200 - 3299 : 291 (8.89)			
	3300 - 3399 : 4 (7.27)				3300 - 3399 : 240 (7.33)			
	3400 - 3499 : 1 (1.82)				3400 - 3499 : 196 (6.05)			
	3500 - : 7 (12.73)				3500 - : 443 (13.53)			
身長	身長 (cm) : 件数 (%)				身長 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 29 : (0.00)				1 - 29 : 11 (0.35)			
	30 - 34 : (0.00)				30 - 34 : 16 (0.51)			
	35 - 39 : (0.00)				35 - 39 : 37 (1.19)			
	40 - 44 : 1 (1.89)				40 - 44 : 112 (3.60)			
	45 - 49 : 26 (49.06)				45 - 49 : 1636 (52.66)			
	50 - 54 : 26 (49.06)				50 - 54 : 1275 (41.04)			
	55 - 59 : (0.00)				55 - 59 : 17 (0.55)			
	60 - : (0.00)				60 - : 3 (0.10)			
頭囲	頭囲 (cm) : 件数 (%)				頭囲 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 24 : 1 (1.89)				1 - 24 : 17 (0.56)			
	25 - 29 : 2 (3.77)				25 - 29 : 82 (2.69)			
	30 - 34 : 40 (75.47)				30 - 34 : 2474 (81.27)			
	35 - 39 : 10 (18.87)				35 - 39 : 468 (15.37)			
	40 - 44 : (0.00)				40 - 44 : (0.00)			
	45 - 49 : (0.00)				45 - 49 : 1 (0.03)			
	50 - : (0.00)				50 - : 2 (0.07)			
アプガースコア	1分		5分		1分		5分	
	スコア : 件数 (%)		件数 (%)		スコア : 件数 (%)		件数 (%)	
	1 : (0.0)		(0.0)		1 : 16 (0.5)		3 (0.1)	
	2 : (0.0)		(0.0)		2 : 15 (0.4)		2 (0.0)	
	3 : (0.0)		(0.0)		3 : 29 (0.9)		3 (0.1)	
	4 : (0.0)		(0.0)		4 : 22 (0.6)		7 (0.2)	
	5 : 1 (2.0)		(0.0)		5 : 48 (1.4)		12 (0.4)	
	6 : (0.0)		(0.0)		6 : 55 (1.7)		24 (0.9)	
	7 : 2 (4.0)		2 (4.3)		7 : 165 (5.1)		35 (1.3)	
	8 : 18 (36.7)		3 (6.5)		8 : 786 (24.3)		188 (7.4)	
	9 : 21 (42.6)		18 (39.1)		9 : 1857 (57.6)		1122 (44.2)	
	10 : 7 (14.2)		23 (50.0)		10 : 231 (7.1)		1138 (44.9)	

	甲状腺疾患の既往 : 有り					甲状腺疾患の既往 : 無し				
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
[分娩時所見]										
陣痛誘発		7	48		(12.73)	11	556	2699	12	(17.08)
陣痛促進		6	48	1	(11.11)	10	641	2614	13	(19.69)
吸引・鉗子分娩		2	53		(3.64)	8	323	2947		(9.88)
帝王切開 (予定)		5	50		(9.09)	8	237	3032	1	(7.25)
(緊急)		7	48		(12.73)	5	325	2947	1	(9.93)
輸血			55		(0.00)	5	36	3235	2	(1.10)
[分娩時の異常]										
微弱陣痛		6	49		(10.91)	18	476	2776	8	(14.64)
分娩遅延・中止		4	51		(7.27)	18	207	3047	6	(6.36)
軟産道強靱		3	52		(5.45)	17	116	3128	17	(3.58)
C P D・狭骨盤		3	52		(5.45)	20	65	3181	12	(2.00)
前期破水		4	51		(7.27)	17	545	2708	8	(16.75)
その他の異常	1	2	52		(3.70)	49	157	3067	5	(4.87)
[分娩時の母体異常]										
3度以上の会陰裂傷			55		(0.00)	11	16	3250	1	(0.49)
弛緩出血		1	54		(1.82)	9	188	3067	14	(5.78)
分娩時ショック			55		(0.00)	7	9	3261	1	(0.28)
羊水塞栓			55		(0.00)	7		3270	1	(0.00)
静脈瘤			55		(0.00)	8	10	3179	81	(0.31)
肺塞栓症			55		(0.00)	7		3270	1	(0.00)
母体死亡			55		(0.00)	7	1	3270		(0.03)
その他の母体異常	1	1	53		(1.85)	21	102	3152	3	(3.13)
[分娩時の胎児・胎児付属物の異常]										
羊水混濁		8	43	4	(15.69)	4	428	2803	43	(13.25)
分娩時胎児仮死		5	50		(9.09)	7	402	2854	15	(12.35)
死亡		1	54		(1.82)	4	32	3239	3	(0.96)
前置胎盤		1	54		(1.82)	4	31	3239	4	(0.95)
胎盤早期剥離		1	54		(1.82)	7	31	3233	7	(0.95)
その他の胎盤異常			55		(0.00)	13	73	3189	3	(2.24)
臍帯の異常		4	51		(7.27)	24	223	3028	3	(6.86)
[新生児の経過・処置]										
けいれん			55		(0.00)	14	5	3215	44	(0.16)
* 先天異常	1	1	53		(1.85)	21	79	3145	8	25(2.45)
気管内挿管		2	52	1	(3.70)	17	111	3086	62	(3.47)
入院		9	46		(16.36)	16	578	2674	10	(17.77)
N I C Uへの入院		7	48		(12.73)	19	283	2962	14	(8.72)
新生児死亡 (28日未満)			52	3	(0.00)	16	14	2948	300	(0.47)
** 死亡時期	55				(0.00)	3242	11	10	15	(52.38)
その他の異常経過		2	53		(3.64)	18	205	3002	53	(6.39)

[今回の妊娠経過]	甲状腺疾患の既往 : 有り					甲状腺疾患の既往 : 無し						
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
流早産の入院治療		13	42		(23.64)	15	504	2737	22	(15.55)		
流早産以外の入院		8	47		(14.55)	24	402	2833	19	(12.43)		
妊娠中毒症・軽症		9	46		(16.36)	11	263	2988	16	(8.09)		
・重傷		3	52		(5.45)	15	84	3159	20	(2.59)		
ヘマトクリット40%以上		3	48	4	(5.88)	27	36	2913	302	(1.22)		
妊娠中胎児仮死	1	3	50	1	(5.66)	43	106	3085	44	(3.32)		
子宮内胎児死亡		2	53		(3.64)	47	38	3186	7	(1.18)		
その他妊娠合併症	2	8	44	1	(15.38)	24	262	2922	70	(8.23)		
妊娠糖尿病		3	52		(5.45)	6	70	3169	33	(2.16)		
不規則性抗体陽性	1		34	20	(0.00)	56	24	2028	1170	(1.17)		
ヘモグロビン9g/dl以下			50	5	(0.00)	26	79	2943	230	(2.61)		
その他の妊娠偶発合併症	1	18	36		(33.33)	20	301	2929	28	(9.32)		
里帰り分娩		2	53		(3.64)	6	241	2968	63	(7.51)		
妊娠中の喫煙		1	37	17	(2.63)	5	100	2159	1014	(4.43)		
*** 妊娠中の飲酒			7	27	(0.00)	12	26	325	1509	1406(7.41)		
[出生前診断について]												
出生前診断の実施		2	53		(3.64)	6	185	2979	108	(5.65)		
染色体その他の異常の有無			45	10	(0.00)	95	15	2517	651	(0.59)		
[既往歴]												
	回	妊 娠	分 娩	自 然 流 産	早 期 産 産	後 期 産 産	回	妊 娠	分 娩	自 然 流 産	早 期 産 産	後 期 産 産
	数						数					
	1:	21	22	11	3	1	1:	1037	1133	507	113	29
	2:	10	5	2	1		2:	686	527	129	13	3
	3:	9	1	1			3:	381	94	39	2	
	4:	2	1				4:	153	19	8	1	
	5:	1					5:	60	4	4		
	6:						6:	25	1			
	7:						7:	9	1	1		
	8:						8:	4				
	9:						9:	2				
	10:						10:	2		1		
[既往の妊娠合併症および分娩時異常]												
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
頰管無力症	3		52		(0.00)	92	43	3107	36	(1.37)		
妊娠中毒症	3	3	49		(5.77)	87	120	3051	20	(3.78)		
吸引・鉗子分娩	3	2	50		(3.85)	91	182	2996	9	(5.73)		
帝王切開	3	5	47		(9.62)	86	268	2922	2	(8.40)		
分娩時異常出血	3	2	49	1	(3.92)	91	126	2970	91	(4.07)		
前置胎盤	3		52		(0.00)	90	11	3157	20	(0.35)		
常位胎盤早期剥離	3	1	51		(1.92)	89	5	3166	16	(0.16)		
その他の異常	4	7	42	2	(14.29)	98	274	2861	45	(8.74)		
[他科の疾患および妊娠偶発合併症の既往]												
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
腎炎		3	52		(5.45)		54	3221	3	(1.65)		
糖尿病		1	54		(1.82)		23	3253	2	(0.70)		
甲状腺疾患		55			(100.00)			3278		(0.00)		
本態性高血圧		1	54		(1.82)	1	27	3247	3	(0.82)		
子宮筋腫	1	4	50		(7.41)		73	3200	5	(2.23)		
不妊症	1	2	52		(3.70)	1	91	3185	1	(2.78)		
他の他科疾患・偶発合併症	2	7	46		(13.21)	13	339	2920	6	(10.40)		
*** コントロールの状態	14	33		8	(100.00)	2783	352	55	88	(86.49)		

	甲状腺疾患の既往 : 有り					甲状腺疾患の既往 : 無し				
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
[新生児異常の既往]										
低体重児	5	3	47		(6.00)	93	255	2901	29	(8.08)
新生児死亡 (生後1月以内)	4		51		(0.00)	94	43	3113	28	(1.36)
先天異常	5	2	48		(4.00)	100	89	3057	32	(2.83)
その他異常	8	1	46		(2.13)	151	60	3015	52	(1.95)
[総合的評価]										
[妊娠中の経過の総合的評価]	スコア : 件数 (%)		件数 (%)			スコア : 件数 (%)		件数 (%)		
順調であった			1 : 24 (43.64)					1 : 1857 (56.70)		
軽度の異常、治療は不要			2 : 10 (18.18)					2 : 376 (11.48)		
異常の為、生活制限と治療			3 : 5 (9.09)					3 : 379 (11.57)		
入院治療を要した			4 : 15 (27.27)					4 : 602 (18.38)		
妊娠中絶を要した			5 : (0.00)					5 : 17 (0.52)		
その他			6 : 1 (1.82)					6 : 20 (0.61)		
不明			7 : (0.00)					7 : 24 (0.73)		
[今回の分娩経過と子供の状態の評価]	スコア : 件数 (%)		件数 (%)			スコア : 件数 (%)		件数 (%)		
順調で問題無し			1 : 34 (61.82)					1 : 1988 (60.83)		
わずかな問題があった			2 : 12 (21.82)					2 : 794 (24.30)		
かなりの問題があった			3 : 5 (9.09)					3 : 356 (10.89)		
子供の健康にかなりの障害			4 : (0.00)					4 : 29 (0.89)		
周産期死亡 重篤な結果			5 : 2 (3.64)					5 : 48 (1.47)		
その他			6 : 1 (1.82)					6 : 16 (0.49)		
不明			7 : 1 (1.82)					7 : 37 (1.13)		
[長期的に見た母体の産後の健康状態評価]	スコア : 件数 (%)		件数 (%)			スコア : 件数 (%)		件数 (%)		
妊娠前と変わらない			1 : 49 (89.09)					1 : 2860 (87.46)		
少し健康状態が悪化した			2 : 5 (9.09)					2 : 286 (8.75)		
かなり健康状態が悪化した			3 : (0.00)					3 : 23 (0.70)		
重篤な健康障害が発生			4 : (0.00)					4 : 1 (0.03)		
死亡した			5 : (0.00)					5 : 1 (0.03)		
その他			6 : (0.00)					6 : 9 (0.28)		
不明			7 : 1 (1.82)					7 : 90 (2.75)		

** 年齢不明又は外国籍のレコード件数： 7 (今回の集計から除外) **

件数	頸管無力症の既往：有り 43					頸管無力症の既往：無し 3167				
入院の事情	無 記 入 院	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合	無 記 入 院	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合
	25	10	8		(41.86)	28	2346	383	410	(25.26)
分娩週数(修正後)	週数： 件数(%)					週数： 件数(%)				
	1 - 27 :	3	(6.98)			1 - 27 :	42	(1.33)		
		28 :	(0.00)				28 :	12	(0.38)	
		29 :	1 (2.33)				29 :	13	(0.41)	
		30 :	(0.00)				30 :	24	(0.76)	
		31 :	1 (2.33)				31 :	10	(0.32)	
		32 :	1 (2.33)				32 :	25	(0.79)	
		33 :	(0.00)				33 :	27	(0.85)	
		34 :	1 (2.33)				34 :	37	(1.17)	
		35 :	1 (2.33)				35 :	55	(1.74)	
		36 :	2 (4.65)				36 :	91	(2.88)	
		37 :	3 (6.98)				37 :	269	(8.52)	
		38 :	15 (34.88)				38 :	623	(19.73)	
		39 :	9 (20.93)				39 :	903	(28.59)	
		40 :	3 (6.98)				40 :	686	(21.72)	
		41 :	3 (6.98)				41 :	291	(9.21)	
		42 :	(0.00)				42 :	47	(1.49)	
		43 :	(0.00)				43 :	3	(0.09)	
		44 :	(0.00)				44 :	(0.00)		
分娩胎位	無 記 入	頭 位	骨 盤 位	そ の 他	骨盤位 その他 の割合	無 記 入	頭 位	骨 盤 位	そ の 他	骨盤位 その他 の割合
	40	2	1		(6.98)	13	2953	140	61	(6.37)
分娩時の異常出血の有無	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
	11	31	1		(26.19)	52	629	2449	37	(20.44)
出血量 1-3期合計	出血量： C/S以外 C/Sの場合					出血量： C/S以外 C/Sの場合				
	(ml) :	件数(%)		件数(%)		(ml) :	件数(%)		件数(%)	
	1- 99:	3 (8.8)		(0.0)		1- 99:	626 (24.2)		6 (1.4)	
	100-199:	9 (26.4)		(0.0)		100-199:	708 (27.4)		14 (3.4)	
	200-299:	7 (20.5)		(0.0)		200-299:	483 (18.7)		46 (11.4)	
	300-399:	3 (8.8)		1 (14.2)		300-399:	314 (12.1)		51 (12.6)	
	400-499:	5 (14.7)		1 (14.2)		400-499:	153 (5.9)		45 (11.1)	
	500-599:	2 (5.8)		1 (14.2)		500-599:	98 (3.8)		42 (10.4)	
	600-699:	1 (2.9)		1 (14.2)		600-699:	59 (2.2)		37 (9.2)	
	700-799:	1 (2.9)		(0.0)		700-799:	43 (1.6)		31 (7.7)	
	800-899:	1 (2.9)		3 (42.8)		800-899:	28 (1.0)		33 (8.2)	
	900-999:	(0.0)		(0.0)		900-999:	17 (0.6)		15 (3.7)	
	1000-1099:	1 (2.9)		(0.0)		1000-1099:	14 (0.5)		19 (4.7)	
	1100-1199:	(0.0)		(0.0)		1100-1199:	7 (0.2)		9 (2.2)	
	1200-1299:	(0.0)		(0.0)		1200-1299:	3 (0.1)		10 (2.4)	
	1300-1399:	(0.0)		(0.0)		1300-1399:	9 (0.3)		6 (1.4)	
	1400-1499:	(0.0)		(0.0)		1400-1499:	4 (0.1)		5 (1.2)	
	1500 - :	1 (2.9)		(0.0)		1500 - :	13 (0.5)		33 (8.2)	

	頰管無力症の既往 : 有り				頰管無力症の既往 : 無し			
[新生児所見]								
性別	不 明	男 性	女 性	男性の 割合	不 明	男 性	女 性	男性の 割合
	1	20	22	(47.62)	10	1633	1524	(51.73)
体重	体重 (g) : 件数 (%)				体重 (g) : 件数 (%)			
	1 - 1499 :	5 (11.63)			1 - 1499 :	101 (3.19)		
	1500 - 1599 :	(0.00)			1500 - 1599 :	10 (0.32)		
	1600 - 1699 :	1 (2.33)			1600 - 1699 :	10 (0.32)		
	1700 - 1799 :	(0.00)			1700 - 1799 :	12 (0.38)		
	1800 - 1899 :	(0.00)			1800 - 1899 :	24 (0.76)		
	1900 - 1999 :	(0.00)			1900 - 1999 :	17 (0.54)		
	2000 - 2099 :	(0.00)			2000 - 2099 :	21 (0.66)		
	2100 - 2199 :	(0.00)			2100 - 2199 :	22 (0.70)		
	2200 - 2299 :	1 (2.33)			2200 - 2299 :	41 (1.30)		
	2300 - 2399 :	1 (2.33)			2300 - 2399 :	70 (2.21)		
	2400 - 2499 :	1 (2.33)			2400 - 2499 :	87 (2.75)		
	2500 - 2599 :	1 (2.33)			2500 - 2599 :	135 (4.27)		
	2600 - 2699 :	4 (9.30)			2600 - 2699 :	147 (4.65)		
	2700 - 2799 :	2 (4.65)			2700 - 2799 :	230 (7.27)		
	2800 - 2899 :	4 (9.30)			2800 - 2899 :	256 (8.10)		
	2900 - 2999 :	1 (2.33)			2900 - 2999 :	269 (8.51)		
	3000 - 3099 :	5 (11.63)			3000 - 3099 :	289 (9.14)		
	3100 - 3199 :	5 (11.63)			3100 - 3199 :	286 (9.04)		
	3200 - 3299 :	3 (6.98)			3200 - 3299 :	281 (8.89)		
	3300 - 3399 :	3 (6.98)			3300 - 3399 :	233 (7.37)		
	3400 - 3499 :	1 (2.33)			3400 - 3499 :	192 (6.07)		
	3500 -	5 (11.63)			3500 -	429 (13.57)		
身長	身長 (cm) : 件数 (%)				身長 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 29 :	(0.00)			1 - 29 :	11 (0.37)		
	30 - 34 :	1 (2.50)			30 - 34 :	13 (0.43)		
	35 - 39 :	1 (2.50)			35 - 39 :	35 (1.17)		
	40 - 44 :	1 (2.50)			40 - 44 :	109 (3.63)		
	45 - 49 :	19 (47.50)			45 - 49 :	1572 (52.38)		
	50 - 54 :	18 (45.00)			50 - 54 :	1241 (41.35)		
	55 - 59 :	(0.00)			55 - 59 :	17 (0.57)		
	60 -	(0.00)			60 -	3 (0.10)		
頭圍	頭圍 (cm) : 件数 (%)				頭圍 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 24 :	1 (2.56)			1 - 24 :	16 (0.54)		
	25 - 29 :	2 (5.13)			25 - 29 :	79 (2.69)		
	30 - 34 :	30 (76.92)			30 - 34 :	2383 (81.08)		
	35 - 39 :	5 (12.82)			35 - 39 :	459 (15.62)		
	40 - 44 :	(0.00)			40 - 44 :	(0.00)		
	45 - 49 :	(0.00)			45 - 49 :	1 (0.03)		
	50 -	1 (2.56)			50 -	1 (0.03)		
アプガースコア	1分		5分		1分		5分	
	スコア : 件数 (%)		件数 (%)		スコア : 件数 (%)		件数 (%)	
	1 :	1 (2.3)	(0.0)		1 :	15 (0.4)	3 (0.1)	
	2 :	(0.0)	(0.0)		2 :	15 (0.4)	2 (0.0)	
	3 :	1 (2.3)	(0.0)		3 :	27 (0.8)	3 (0.1)	
	4 :	1 (2.3)	(0.0)		4 :	19 (0.6)	7 (0.2)	
	5 :	1 (2.3)	1 (2.7)		5 :	44 (1.4)	10 (0.4)	
	6 :	2 (4.6)	(0.0)		6 :	52 (1.6)	23 (0.9)	
	7 :	1 (2.3)	1 (2.7)		7 :	155 (4.9)	35 (1.4)	
	8 :	11 (25.5)	2 (5.5)		8 :	772 (24.8)	186 (7.6)	
	9 :	21 (48.8)	14 (36.8)		9 :	1789 (57.5)	1096 (44.8)	
	10 :	4 (9.3)	18 (50.0)		10 :	220 (7.0)	1080 (44.1)	

	頸管無力症の既往 : 有り					頸管無力症の既往 : 無し				
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
[分娩時所見]										
陣痛誘発		7	36		(16.28)	11	546	2603	7	(17.34)
陣痛促進		6	37		(13.95)	9	624	2523	11	(19.83)
吸引・鉗子分娩		1	42		(2.33)	7	306	2854		(9.68)
帝王切開 (予定)		2	41		(4.65)	6	235	2925	1	(7.44)
(緊急)		7	36		(16.28)	4	316	2846	1	(9.99)
輸血			43		(0.00)	4	35	3126	2	(1.11)
[分娩時の異常]										
微弱陣痛		5	38		(11.63)	18	460	2682	7	(14.64)
分娩遅延・中止		2	41		(4.65)	18	199	2944	6	(6.33)
軟産道強靱		1	42		(2.33)	17	113	3020	17	(3.61)
CPD・狭骨盤		1	42		(2.33)	20	64	3071	12	(2.04)
前期破水		8	35		(18.60)	17	519	2623	8	(16.52)
その他の異常	1	3	39		(7.14)	49	149	2964	5	(4.79)
[分娩時の母体異常]										
3度以上の会陰裂傷			43		(0.00)	11	14	3142		(0.44)
弛緩出血	3	40			(6.98)	9	175	2970	13	(5.56)
分娩時ショック			43		(0.00)	7	9	3151		(0.28)
羊水塞栓			43		(0.00)	7		3160		(0.00)
静脈瘤			43		(0.00)	8	9	3073	77	(0.29)
肺塞栓症			43		(0.00)	7		3160		(0.00)
母体死亡			43		(0.00)	7	1	3159		(0.03)
その他の母体異常	3	40			(6.98)	21	90	3054	2	(2.86)
[分娩時の胎児・胎児付属物の異常]										
羊水混濁		5	37	1	(11.90)	4	406	2715	42	(13.01)
分娩時胎児仮死		4	38	1	(9.52)	7	385	2763	12	(12.23)
死亡			43		(0.00)	4	33	3129	1	(1.04)
前置胎盤		1	42		(2.33)	4	30	3131	2	(0.95)
胎盤早期剥離			43		(0.00)	7	30	3125	5	(0.95)
その他の胎盤異常		2	41		(4.65)	13	71	3082	1	(2.25)
臍帯の異常		3	40		(6.98)	23	213	2930	1	(6.78)
[新生児の経過・処置]										
けいれん			41	2	(0.00)	13	4	3109	41	(0.13)
* 先天異常	1		41		(0.00)	21	80	3037	8	21(2.57)
気管内挿管		6	37		(13.95)	17	100	2994	56	(3.23)
入院		10	33		(23.26)	16	560	2581	10	(17.83)
N I C Uへの入院		9	34		(20.93)	19	272	2863	13	(8.68)
新生児死亡 (28日未満)		1	35	7	(2.78)	16	13	2845	293	(0.45)
** 死亡時期	42	1			(100.00)	3133	10	9	15	(52.63)
その他の異常経過	2	2	38	1	(5.00)	16	197	2906	48	(6.35)

[今回の妊娠経過]	頸管無力症の既往 : 有り					頸管無力症の既往 : 無し						
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
流早産の入院治療 . . .	2	24	17		(58.54)	12	461	2675	19	(14.70)		
流早産以外の入院 . . .	1	15	27		(35.71)	23	373	2755	16	(11.92)		
妊娠中毒症・軽症 . . .		1	42		(2.33)	10	257	2886	14	(8.18)		
・重傷 . . .		1	42		(2.33)	13	80	3056	18	(2.55)		
ヘマトクリット40%以上			38	5	(0.00)	26	39	2808	294	(1.37)		
妊娠中胎児仮死 . . .			43		(0.00)	42	108	2976	41	(3.50)		
子宮内胎児死亡 . . .			43		(0.00)	45	40	3075	7	(1.28)		
その他妊娠合併症 . . .		10	32	1	(23.81)	26	248	2828	65	(8.06)		
妊娠糖尿病		1	42		(2.33)	6	67	3064	30	(2.14)		
不規則性抗体陽性 . . .	1		22	20	(0.00)	56	23	1935	1153	(1.17)		
ヘモグロビン9g/dl以下		2	37	4	(5.13)	23	76	2841	227	(2.61)		
その他の妊娠偶発合併症		5	38		(11.63)	19	300	2824	24	(8.60)		
里帰り分娩		2	39	2	(4.88)	6	229	2876	56	(7.38)		
妊娠中の喫煙		1	34	8	(2.86)	5	99	2093	970	(4.52)		
*** 妊娠中の飲酒			2	25	16(0.00)	12	26	316	1461	1352(7.60)		
[出生前診断について]												
出生前診断の実施 . . .	1	3	37	2	(7.50)	5	180	2879	103	(5.88)		
染色体その他の異常の有無	3		28	12	(0.00)	89	15	2434	629	(0.61)		
[既往歴]												
	回 数	妊 娠	分 娩	自 然 流 産	早 期 産	後 期 死 産	回 数	妊 娠	分 娩	自 然 流 産	早 期 産	後 期 死 産
	1:	8	19	12	15	1	1:	1019	1117	496	97	28
	2:	11	7	1	5		2:	671	523	125	9	3
	3:	11	5	5	1		3:	375	87	35	1	
	4:	7		1			4:	147	19	7	1	
	5:	4					5:	54	4	4		
	6:						6:	24	1			
	7:	2					7:	7	1	1		
	8:						8:	4				
	9:						9:	2				
	10:						10:	2		1		
[既往の妊娠合併症および分娩時異常]												
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
頸管無力症		43			(100.00)		3167			(0.00)		
妊娠中毒症		2	41		(4.65)	1	119	3032	15	(3.78)		
吸引・鉗子分娩		2	41		(4.65)	2	175	2985	5	(5.54)		
帝王切開		5	38		(11.63)		264	2902	1	(8.34)		
分娩時異常出血		3	37	3	(7.50)	2	123	2969	73	(3.98)		
前置胎盤			42	1	(0.00)	1	10	3148	8	(0.32)		
常位胎盤早期剥離			43		(0.00)		6	3153	8	(0.19)		
その他の異常		7	35	1	(16.67)	13	263	2857	34	(8.43)		
[他科の疾患および妊娠偶発合併症の既往]												
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
腎炎		1	42		(2.33)	5	51	3106	5	(1.62)		
糖尿病			43		(0.00)	6	23	3134	4	(0.73)		
甲状腺疾患			43		(0.00)	6	52	3107	2	(1.65)		
本態性高血圧			43		(0.00)	7	28	3129	3	(0.89)		
子宮筋腫		3	40		(6.98)	6	69	3085	7	(2.19)		
不妊症		1	42		(2.33)	7	87	3070	3	(2.76)		
他の他科疾患・偶発合併症		2	41		(4.65)	14	332	2815	6	(10.55)		
*** コントロールの状態	38	5			(100.00)	2665	360	52	90	(87.38)		

	頸管無力症の既往 : 有り					頸管無力症の既往 : 無し				
[新生児異常の既往]	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
低体重児	1	17	25		(40.48)	26	230	2890	21	(7.37)
新生児死亡 (生後1月以内)	1	6	36		(14.29)	26	37	3083	21	(1.19)
先天異常	1	2	39	1	(4.88)	32	87	3021	27	(2.80)
その他異常	1	2	39	1	(4.88)	86	58	2980	43	(1.91)
[総合的評価]										
[妊娠中の経過の総合的評価]	スコア:件数 (%) 件数 (%)					スコア:件数 (%) 件数 (%)				
順調であった	1 : 4 (9.30)					1 : 1826 (57.69)				
軽度の異常、治療は不要	2 : 2 (4.65)					2 : 363 (11.47)				
異常の為、生活制限と治療	3 : 4 (9.30)					3 : 362 (11.44)				
入院治療を要した	4 : 31 (72.09)					4 : 556 (17.57)				
妊娠中絶を要した	5 : 1 (2.33)					5 : 16 (0.51)				
その他	6 : (0.00)					6 : 21 (0.66)				
不明	7 : 1 (2.33)					7 : 21 (0.66)				
[今回の分娩経過と子供の状態の評価]										
	スコア:件数 (%) 件数 (%)					スコア:件数 (%) 件数 (%)				
順調で問題無し	1 : 18 (41.86)					1 : 1948 (61.68)				
わずかな問題があった . .	2 : 14 (32.56)					2 : 750 (23.75)				
かなりの問題があった . .	3 : 6 (13.95)					3 : 336 (10.64)				
子供の健康にかなりの障害	4 : 2 (4.65)					4 : 27 (0.85)				
周産期死亡 重篤な結果	5 : 1 (2.33)					5 : 49 (1.55)				
その他	6 : (0.00)					6 : 17 (0.54)				
不明	7 : 2 (4.65)					7 : 31 (0.98)				
[長期的に見た母体の産後の健康状態評価]										
	スコア:件数 (%) 件数 (%)					スコア:件数 (%) 件数 (%)				
妊娠前と変わらない . . .	1 : 33 (76.74)					1 : 2784 (88.10)				
少し健康状態が悪化した	2 : 7 (16.28)					2 : 263 (8.32)				
かなり健康状態が悪化した	3 : 1 (2.33)					3 : 21 (0.66)				
重篤な健康障害が発生 . .	4 : (0.00)					4 : 1 (0.03)				
死亡した	5 : (0.00)					5 : 1 (0.03)				
その他	6 : (0.00)					6 : 9 (0.28)				
不明	7 : 2 (4.65)					7 : 81 (2.56)				

件 数	新生児死亡の経験 : 有り					新生児死亡の経験 : 無し				
	43					3175				
入院の事情	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合	無 記 入	通 常 入 院	緊 急 入 院	治 療 入 院	緊急・ 治療入 院の割 合
	1	28	5	9	(33.33)	27	2352	385	411	(25.29)
分娩週数 (修正後)	週数: 件数 (%)					週数: 件数 (%)				
	1 - 27:	2 (4.65)				1 - 27:	43 (1.36)			
	28:	(0.00)				28:	11 (0.35)			
	29:	(0.00)				29:	13 (0.41)			
	30:	(0.00)				30:	24 (0.76)			
	31:	(0.00)				31:	11 (0.35)			
	32:	1 (2.33)				32:	24 (0.76)			
	33:	2 (4.65)				33:	24 (0.76)			
	34:	(0.00)				34:	37 (1.17)			
	35:	(0.00)				35:	55 (1.74)			
	36:	5 (11.63)				36:	90 (2.84)			
	37:	7 (16.28)				37:	271 (8.56)			
	38:	12 (27.91)				38:	636 (20.09)			
	39:	8 (18.60)				39:	904 (28.55)			
	40:	5 (11.63)				40:	682 (21.54)			
	41:	1 (2.33)				41:	291 (9.19)			
	42:	(0.00)				42:	47 (1.48)			
	43:	(0.00)				43:	3 (0.09)			
	44:	(0.00)				44:	(0.00)			
分娩胎位	無 記 入	頭 位	骨 盤 位	そ の 他	骨盤位 その他 の割合	無 記 入	頭 位	骨 盤 位	そ の 他	骨盤位 その他 の割合
	1	35	3	4	(16.67)	10	2966	140	59	(6.29)
分娩時の異常出血の有無	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
	2	9	31	1	(22.50)	48	634	2454	39	(20.53)
出血量 1-3期合計	出血量: C/S以外 C/Sの場合					出血量: C/S以外 C/Sの場合				
	(ml):	件数 (%)			件数 (%)	(ml):	件数 (%)			件数 (%)
	1- 99:	6 (22.2)			(0.0)	1- 99:	625 (24.0)			6 (1.5)
	100- 199:	9 (33.3)			(0.0)	100- 199:	710 (27.3)			14 (3.5)
	200- 299:	5 (18.5)			(0.0)	200- 299:	487 (18.7)			46 (11.5)
	300- 399:	2 (7.4)			(0.0)	300- 399:	314 (12.1)			51 (12.8)
	400- 499:	2 (7.4)			(0.0)	400- 499:	158 (6.0)			46 (11.5)
	500- 599:	1 (3.7)			2 (22.2)	500- 599:	101 (3.8)			41 (10.3)
	600- 699:	1 (3.7)			1 (11.1)	600- 699:	59 (2.2)			36 (9.0)
	700- 799:	(0.0)			(0.0)	700- 799:	44 (1.7)			31 (7.7)
	800- 899:	1 (3.7)			(0.0)	800- 899:	28 (1.0)			36 (9.0)
	900- 999:	(0.0)			1 (11.1)	900- 999:	17 (0.6)			14 (3.5)
	1000-1099:	(0.0)			1 (11.1)	1000-1099:	14 (0.5)			18 (4.5)
	1100-1199:	(0.0)			1 (11.1)	1100-1199:	7 (0.2)			8 (2.0)
	1200-1299:	(0.0)			(0.0)	1200-1299:	3 (0.1)			10 (2.5)
	1300-1399:	(0.0)			1 (11.1)	1300-1399:	9 (0.3)			6 (1.5)
	1400-1499:	(0.0)			(0.0)	1400-1499:	4 (0.1)			5 (1.2)
	1500 - :	(0.0)			2 (22.2)	1500 - :	14 (0.5)			30 (7.5)

	新生児死亡の経験 : 有り				新生児死亡の経験 : 無し			
[新生児所見]								
性別	不明	男性	女性	男性の割合 (53.49)	不明	男性	女性	男性の割合 (51.55)
	23	20			11	1631	1533	
体重	体重 (g) : 件数 (%)				体重 (g) : 件数 (%)			
	1 - 1499	3	(6.96)		1 - 1499	99	(3.12)	
	1500 - 1599		(0.00)		1500 - 1599	10	(0.32)	
	1600 - 1699		(0.00)		1600 - 1699	11	(0.35)	
	1700 - 1799	1	(2.33)		1700 - 1799	12	(0.38)	
	1800 - 1899	2	(4.65)		1800 - 1899	22	(0.69)	
	1900 - 1999		(0.00)		1900 - 1999	19	(0.60)	
	2000 - 2099	1	(2.33)		2000 - 2099	21	(0.66)	
	2100 - 2199		(0.00)		2100 - 2199	21	(0.66)	
	2200 - 2299		(0.00)		2200 - 2299	45	(1.42)	
	2300 - 2399	1	(2.33)		2300 - 2399	70	(2.21)	
	2400 - 2499		(0.00)		2400 - 2499	84	(2.65)	
	2500 - 2599	5	(11.63)		2500 - 2599	134	(4.23)	
	2600 - 2699	1	(2.33)		2600 - 2699	151	(4.76)	
	2700 - 2799	3	(6.98)		2700 - 2799	229	(7.22)	
	2800 - 2899	4	(9.30)		2800 - 2899	253	(7.98)	
	2900 - 2999	6	(13.95)		2900 - 2999	270	(8.52)	
	3000 - 3099	3	(6.98)		3000 - 3099	289	(9.12)	
	3100 - 3199	1	(2.33)		3100 - 3199	294	(9.27)	
	3200 - 3299	4	(9.30)		3200 - 3299	278	(8.77)	
	3300 - 3399	3	(6.98)		3300 - 3399	236	(7.44)	
	3400 - 3499		(0.00)		3400 - 3499	193	(6.09)	
	3500 -	5	(11.63)		3500 -	429	(13.53)	
身長	身長 (cm) : 件数 (%)				身長 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 29		(0.00)		1 - 29	11	(0.37)	
	30 - 34		(0.00)		30 - 34	14	(0.46)	
	35 - 39		(0.00)		35 - 39	33	(1.10)	
	40 - 44	4	(10.53)		40 - 44	107	(3.55)	
	45 - 49	21	(55.26)		45 - 49	1582	(52.54)	
	50 - 54	13	(34.21)		50 - 54	1244	(41.32)	
	55 - 59		(0.00)		55 - 59	17	(0.56)	
	60 -		(0.00)		60 -	3	(0.10)	
頭圍	頭圍 (cm) : 件数 (%)				頭圍 (cm) : 件数 (%)			
	1 - 24	1	(2.70)		1 - 24	16	(0.54)	
	25 - 29	2	(5.41)		25 - 29	76	(2.58)	
	30 - 34	26	(70.27)		30 - 34	2397	(81.28)	
	35 - 39	7	(18.92)		35 - 39	458	(15.53)	
	40 - 44		(0.00)		40 - 44		(0.00)	
	45 - 49		(0.00)		45 - 49	1	(0.03)	
	50 -	1	(2.70)		50 -	1	(0.03)	
アプガースコア	1分	5分			1分	5分		
	スコア : 件数 (%)	件数 (%)			スコア : 件数 (%)	件数 (%)		
	1 : 1 (2.5)	1 (2.6)			1 : 15 (0.4)	2 (0.0)		
	2 : 1 (2.5)	(0.0)			2 : 14 (0.4)	2 (0.0)		
	3 : 1 (2.5)	(0.0)			3 : 27 (0.8)	3 (0.1)		
	4 : (0.0)	(0.0)			4 : 21 (0.6)	7 (0.2)		
	5 : 1 (2.5)	(0.0)			5 : 43 (1.3)	11 (0.4)		
	6 : 1 (2.5)	2 (5.7)			6 : 53 (1.7)	20 (0.8)		
	7 : 2 (5.0)	1 (2.8)			7 : 155 (4.9)	35 (1.4)		
	8 : 12 (30.0)	3 (8.5)			8 : 776 (24.8)	185 (7.5)		
	9 : 17 (42.5)	14 (40.0)			9 : 1795 (57.5)	1096 (44.9)		
	10 : 4 (10.0)	14 (40.0)			10 : 220 (7.0)	1080 (44.2)		

	新生児死亡の経験 : 有り					新生児死亡の経験 : 無し				
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
[分娩時所見]										
陣痛誘発		6	36	1	(14.29)	11	545	2611	8	(17.27)
陣痛促進		7	36		(16.28)	10	616	2537	12	(19.54)
吸引・鉗子分娩		1	42		(2.33)	8	307	2860		(9.69)
帝王切開 (予定)		9	34		(20.93)	8	232	2934	1	(7.33)
(緊急)		6	37		(13.95)	5	313	2856	1	(9.88)
輸血	1	2	40		(4.76)	4	33	3136	2	(1.04)
[分娩時の異常]										
微弱陣痛		4	39		(9.30)	17	460	2690	8	(14.60)
分娩遅延・中止		1	42		(2.33)	17	199	2953	6	(6.31)
軟産道強靱		1	42		(2.33)	16	113	3030	16	(3.60)
CPD・狭骨盤			43		(0.00)	19	64	3080	12	(2.04)
前期破水		4	39		(9.30)	16	520	2631	8	(16.50)
その他の異常	1	4	38		(9.52)	48	151	2971	5	(4.84)
[分娩時の母体異常]										
3度以上の会陰裂傷	1		42		(0.00)	10	14	3150	1	(0.44)
弛緩出血		1	42		(2.33)	9	179	2973	14	(5.68)
分娩時ショック		1	42		(2.33)	7	8	3159	1	(0.25)
羊水塞栓			43		(0.00)	7		3167	1	(0.00)
静脈瘤	1		42		(0.00)	7	9	3079	80	(0.29)
肺塞栓症			43		(0.00)	7		3167	1	(0.00)
母体死亡			43		(0.00)	7	1	3167		(0.03)
その他の母体異常		1	42		(2.33)	21	94	3057	3	(2.98)
[分娩時の胎児・胎児付属物の異常]										
羊水混濁		2	40	1	(4.76)	3	407	2720	45	(13.02)
分娩時胎児仮死		6	36	1	(14.29)	6	385	2774	10	(12.19)
死亡		2	41		(4.65)	3	31	3139	2	(0.98)
前置胎盤		1	42		(2.33)	3	29	3140	3	(0.92)
胎盤早期剥離		1	42		(2.33)	6	31	3132	6	(0.98)
その他の胎盤異常			43		(0.00)	12	71	3090	2	(2.25)
臍帯の異常	1	1	41		(2.38)	21	218	2934	2	(6.92)
[新生児の経過・処置]										
けいれん	1		40	2	(0.00)	11	5	3122	37	(0.16)
* 先天異常	2	3	37		(7.50)	18	75	3056	7	19(2.40)
気管内挿管	1	3	39		(7.14)	13	102	3004	56	(3.28)
入院	1	6	36		(14.29)	13	560	2592	10	(17.77)
NICUへの入院	1	8	34		(19.05)	16	264	2882	13	(8.39)
新生児死亡 (28日未満)	1	3	34	5	(8.11)	13	11	2866	285	(0.38)
** 死亡時期	39	2		2	(100.00)	3149	9	9	8	(50.00)
その他の異常経過	1	3	37	2	(7.50)	15	193	2924	43	(6.19)

[今回の妊娠経過]	新生児死亡の経験 : 有り					新生児死亡の経験 : 無し						
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
流早産の入院治療		11	31	1	(26.19)	15	477	2665	18	(15.18)		
流早産以外の入院	2	7	33	1	(17.50)	21	382	2757	15	(12.17)		
妊娠中毒症・軽症		1	42		(2.33)	11	258	2893	13	(8.19)		
・重傷		1	42		(2.33)	14	80	3064	17	(2.54)		
ヘマトクリット40%以上			36	7	(0.00)	27	37	2815	296	(1.30)		
妊娠中胎児仮死		5	36	2	(12.20)	43	101	2991	40	(3.27)		
子宮内胎児死亡	1	2	40		(4.76)	45	38	3086	6	(1.22)		
その他妊娠合併症	1	5	35	2	(12.50)	25	255	2834	61	(8.26)		
妊娠糖尿病		1	42		(2.33)	5	68	3071	31	(2.17)		
不規則性抗体陽性	1		26	16	(0.00)	55	21	1942	1157	(1.07)		
ヘモグロビン9g/dl以下	1	1	37	4	(2.63)	25	75	2847	228	(2.57)		
その他の妊娠偶発合併症		2	41		(4.65)	19	296	2836	24	(9.45)		
里帰り分娩		5	36	2	(12.20)	5	228	2886	56	(7.32)		
妊娠中の喫煙		3	28	12	(9.68)	4	94	2091	986	(4.30)		
*** 妊娠中の飲酒		1	3	24	15(25.00)	11	24	320	1449	1371(6.98)		
[出生前診断について]												
出生前診断の実施	1	7	31	4	(18.42)	5	175	2893	102	(5.70)		
染色体その他の異常の有無	3		30	10	(0.00)	87	14	2440	634	(0.57)		
[既往歴]												
	回 数	妊 娠	分 娩	自 然 流 産	早 期 産 産	後 期 死 産	回 数	妊 娠	分 娩	自 然 流 産	早 期 産 産	後 期 死 産
	1:	6	13	11	15	6	1:	1029	1130	502	99	23
	2:	10	15	4	6		2:	669	511	120	8	3
	3:	11	5				3:	377	88	40	2	
	4:	12					4:	142	19	8	1	
	5:	3					5:	56	4	4		
	6:						6:	23	1			
	7:						7:	8	1			
	8:						8:	4				
	9:						9:	2				
	10:						10:	2		1		
[既往の妊娠合併症および分娩時異常]												
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
頸管無力症		6	37		(13.95)	26	36	3063	30	(1.15)		
妊娠中毒症		5	38		(11.63)	22	116	3017	20	(3.70)		
吸引・鉗子分娩		5	38		(11.63)	26	177	2965	7	(5.63)		
帝王切開		13	30		(30.23)	23	257	2894	1	(8.16)		
分娩時異常出血		2	37	4	(5.13)	26	124	2946	79	(4.04)		
前置胎盤			42	1	(0.00)	26	10	3123	16	(0.32)		
常位胎盤早期剥離			43		(0.00)	25	6	3129	15	(0.19)		
その他の異常	1	5	36	1	(12.20)	33	269	2836	37	(8.66)		
[他科の疾患および妊娠偶発合併症の既往]												
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合		
腎炎			43		(0.00)	8	52	3110	5	(1.64)		
糖尿病			43		(0.00)	9	21	3141	4	(0.66)		
甲状腺疾患			43		(0.00)	9	51	3113	2	(1.61)		
本態性高血圧			43		(0.00)	10	26	3135	4	(0.82)		
子宮筋腫		1	42		(2.33)	10	73	3085	7	(2.31)		
不妊症			43		(0.00)	11	87	3074	3	(2.75)		
他の他科疾患・偶発合併症		3	40		(6.98)	15	335	2818	7	(10.62)		
*** コントロールの状態	39	2		2	(100.00)	2688	386	51	90	(87.77)		

	新生児死亡の経験 : 有り					新生児死亡の経験 : 無し				
	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合	無 記 入	あ り	無 し	不 明	有りの 割合
[新生児異常の既往]										
低体重児		27	15	1	(64.29)	2	225	2932	16	(7.13)
新生児死亡(生後1月以内)		43			(100.00)			3175		(0.00)
先天異常	2	16	22	3	(42.11)	7	69	3079	20	(2.19)
その他異常	3	2	36	2	(5.26)	62	57	3014	42	(1.86)
[総合的評価]										
[妊娠中の経過の総合的評価]	スコア: 件数 (%)		件数 (%)			スコア: 件数 (%)		件数 (%)		
順調であった			1 :	21 (48.84)			1 :	1816 (57.23)		
軽度の異常、治療は不要			2 :	2 (4.65)			2 :	365 (11.50)		
異常の為、生活制限と治療			3 :	5 (11.63)			3 :	361 (11.38)		
入院治療を要した			4 :	11 (25.58)			4 :	576 (18.15)		
妊娠中絶を要した			5 :	2 (4.65)			5 :	14 (0.44)		
その他			6 :	2 (4.65)			6 :	19 (0.60)		
不明			7 :	(0.00)			7 :	22 (0.69)		
[今回の分娩経過と子供の状態の評価]	スコア: 件数 (%)		件数 (%)			スコア: 件数 (%)		件数 (%)		
順調で問題無し			1 :	20 (46.51)			1 :	1949 (61.52)		
わずかな問題があった			2 :	11 (25.58)			2 :	761 (24.02)		
かなりの問題があった			3 :	6 (13.95)			3 :	335 (10.57)		
子供の健康にかなりの障害			4 :	1 (2.33)			4 :	28 (0.88)		
周産期死亡 重篤な結果			5 :	3 (6.98)			5 :	48 (1.52)		
その他			6 :	(0.00)			6 :	18 (0.57)		
不明			7 :	2 (4.65)			7 :	29 (0.92)		
[長期的に見た母体の産後の健康状態評価]	スコア: 件数 (%)		件数 (%)			スコア: 件数 (%)		件数 (%)		
妊娠前と変わらない			1 :	36 (83.72)			1 :	2791 (68.07)		
少し健康状態が悪化した			2 :	4 (9.30)			2 :	263 (8.30)		
かなり健康状態が悪化した			3 :	(0.00)			3 :	23 (0.73)		
重篤な健康障害が発生			4 :	1 (2.33)			4 :	(0.00)		
死亡した			5 :	(0.00)			5 :	1 (0.03)		
その他			6 :	(0.00)			6 :	9 (0.28)		
不明			7 :	2 (4.65)			7 :	82 (2.59)		



検索用テキスト OCR(光学的文字認識)ソフト使用

論文の一部ですが、認識率の関係で誤字が含まれる場合があります



1.はじめに [問題の把握と今年度の課題]

統計学的な分析によれば高年妊娠、高年出産での合併症の発生率は高く、年齢が妊娠でのハイリスク要因の一つとして挙げられている。しかし、胎勢回旋異常など年齢依存性が証明されていないリスク要因も多い。これらの分析の多くは、個々の疾患に対してリスク要因がどのように寄与しているかといった詳細ではあるが“スタティック”なものである。ところで我が国では、昭和49年を境にして生産率が低下傾向に転じ、その後一貫して減少してきた。また、純再生産率も、昭和49年に初めて1を割り、平成元年度には0.756までに落込んでいる。理由の一つに女性の社会進出の拡大と、出産適齢期層の未婚率の上昇が有る。結果的に晩婚化が進み、高齢妊娠、高齢出産の問題が高齢社会に於ける人口問題に関する社会的重要な課題へと繋がっている。

高齢化によるリスク増大はある程度やむを得ない。それが避けられないリスクであるとするならば、本研究もまた、重篤な結果にならない為に何が必要となるのかということを経験視する必要があるであろう。その結果は、社会基盤の拡充に向けて具体的な施策へと反映されることを念頭に置いておく必要がある。この場合のリスクの分析では、リスク因子とそれによって生じる結果の時間的關係が重要となる。個々の疾患をターゲットにし、それに関連する因子を詳細に分析する従来の方法に対して、分娩結果や予後といった数量化が比較的困難な内容をターゲットにし、妊娠期間中に発生したいろいろなリスク要因がこれらのターゲット及ぼす影響の分析、さらに患者の満足度など感覚的な内容を加味した分析、など、妊娠前の状態、妊娠期間中のエピソード、分娩後の状態と幅広い期間を取り扱った“ダイナミック”な分析も重要となる。ところで、これらのダイナミックな分析に共通して言えることは、無作為に抽出された被検者について妊娠の初期から分娩後までの長期に渡っての経過情報が必要となること、個々の過程での経過情報がそれぞれの過程を代表しかつ分析に耐えるほど十分簡素であること、評価方法についてもまだ確立していないこと、などである。また、分析のためには多大のデータ量が必要となり作業量も大きい。さらに、集められる情報が分娩結果などによって影響を受けない為にも、個々の経過情報はそれが発生した時点で集められることが望ましい。理想的にはProspectiveな研究とならざるを得ない。しかし短い期間に十分な量のデータを収集し分析することは不可能に近い。また、調査項目が分析に耐え得るほど十分簡素でかつ代表的であることを検証する意味も有って、Prospectiveな研究と並行して過去のデータを使ったRetrospectiveな調査も行った。本稿は、Retrospectiveな調査に関するものである。来年度に本格化するProspective Studyを補佐し、集められる情報の質などに関する問題点などを明らかにし、Prospective Study成功の可能性を予測することが今年度の主な課題である。